四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

四庫未收書輯刊

捌輯·拾册

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

捌輯・拾册目錄

本草方藥參要九卷・之二　〔清〕戴鳴皋撰　一

〔清〕戴鳴皋撰

本草方藥參要

九卷·之二

清鈔本

本草方藥察要卷四目録

高良薑 紅豆蔻　蓽茇　金銀藤

蒲公英　紫花地丁　山豆根

牛蒡子 根莖　山慈姑　漏蘆

飛廉　苦芺　貫衆

射干 鳶尾　蚤休　馬藺子

蓖麻子　續隨子　狼毒

防葵　木鼈子 番木鼈　白頭翁

王瓜 子　王不留行　葵 根 苗子 冬葵 蜀葵 黃蜀葵 菟葵

酸漿 苗葉莖根子　敗醬　白蘚皮

萆薢　菝葜　土茯苓

白斂 赤斂　預知子　旱蓮草

罌粟 殼末鴉片　劉寄奴　馬鞭草

穀精草 花　青葙 草決明　鷄冠

決明子 即馬蹄決明　蓼子 苗葉水蓼馬蓼水葒　虎杖

馬勃　茯苓　茯神

琥珀　松 節脂毛花　側柏葉 枝節脂

柏子仁　肉桂 桂心　桂枝

枸杞子 苗葉 地骨皮　山茱萸　酸棗仁

杜仲　女貞子 葉 枝 根皮　楮實 白皮

蕤仁　柘　桑白皮 皮中白汁 桑椹 葉 枝 瀝

桑柴灰　桑寄生　石南

巵子　猪苓　黄蘗

捌輯 10－5

〔元素曰〕入足太陰脾陽明胃經

本草方藥纂要卷四

如臯戴鳴皋著

高良薑

又名蠻薑 綱目 子名紅豆蔻 〔時珍〕言此出高良郡故名按高良即今高州漢為高涼縣吳改為郡則高良應作高涼也

集解〔時珍曰〕出高良郡二三月采根形氣與杜若相似而葉如山薑〔恭曰〕出嶺南者形大虛軟生江左者細紫亦不甚辛其實一也今人呼細者為杜若大者為——亦非也〔頌曰〕今嶺南及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫如山薑花〔時珍曰〕范成大桂海志云紅豆蔻花叢生葉瘦如碧蘆春末始發初開花抽一幹有大籜包之籜拆花見一穗數十蕊淡紅鮮妍如桃杏花色蕊重則下垂如葡萄又如火齊瓔珞及剪彩鸞枝之狀每蕊有心兩瓣人比之連理也其子

紅豆蔻亦似草豆蔻

希雍曰｜｜｜入足陽明太陰二經為客寒所犯則逆冷霍乱腹痛諸病生焉辛温煖脾胃而逐寒邪則胃中冷逆自除霍乱腹痛自愈矣又曰｜｜｜辛温大熱惟客寒犯胃嘔逆及傷生冷致成霍乱吐瀉之要藥如胃火作嘔傷暑霍乱火熱注瀉心虚作痛咸忌之

汪昂曰肺胃熱者忌之

根辛大温〔志曰〕辛苦大熱〔元素曰〕辛熱 治暴冷胃中冷逆霍亂腹痛別録 下氣益聲止痢蔵器 治風破氣腹内久冷氣痛去風冷痹弱甄權 轉筋瀉痢反胃解酒毒消宿食大明 含塊嚥津治忽然惡心嘔清水逡巡即瘥蘇頌 健脾胃寬噎膈破冷癖除瘴瘧時珍 〔時珍曰〕｜｜｜紅豆蔻並宜炒過入藥亦有以薑同吴茱萸東壁土炒過入藥用者

發明〔楊士瀛曰〕噫逆胃寒者｜｜｜為要藥人參茯苓佐之為其温胃解散胃中風邪也〔時珍曰〕千金方言心脾冷痛用｜｜｜細切炒剉為末米飲服一錢立止又樾跡佛有治心口痛方云凡男心口一點痛者乃胃脘有滞或有虫也多因怒及受寒而起遂致終身俗言心氣痛者非也用｜｜｜酒洗七次

焙研木香附以醋洗七次焙研末各記収之病因寒
得用薑末二錢附末一錢因怒得用附末二錢薑末
一錢寒怒兼有各一錢半以米飲加入生薑一
匙盐一捻服之立止韓飛霞醫通亦稱其功云
方 中惡腹痛 ｜｜｜炙焦五兩酒一
升煮三四沸服 外臺 霍亂腹痛｜｜
｜一兩剉以水三大盞煎二盞 不止｜｜
半去滓入粳米煮粥食 聖惠 霍亂嘔甚｜生剉二
錢大枣一枚水煎冷服 蘊茶曰凡患脚氣
立定名玉壺湯 普濟 脚氣欲吐 人每旦飽食午後
少食日晩不食若飢可食豉粥若覺不消欲致霍亂
者即以｜｜｜一兩水三升煮一升頓服即消若卒
無者以母薑一兩代之清酒煎 心脾冷痛｜｜｜丸
服雖不及｜｜｜亦甚效也 用｜｜｜
四兩切片分四分一分用陳倉米炒一分用東壁土
炒一分用巴豆三十四粒炒一分用斑蝥三十四固
炒檢去米土豆蝥呉茱萸一兩酒浸一宿同炒為末
以浸茱萸酒打糊丸桐子大每空心薑湯下五十丸
高良薑紅豆蔻

二

○永類方用｜｜｜三錢五靈脂六錢為末每服三錢醋湯調下

脾虛寒瘧 寒多熱少飲食不思｜｜｜麻油炒乾薑炮各一兩為末猪胆汁和丸臨發時酒下四十丸吳内翰居全椒歲瘧大作用此救人以百計大抵寒發於胆用胆汁引二薑入胆去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制所以有效也一方用二薑半生半炮各半兩穿山甲三錢炙為末每服二錢以猪腎煮酒下 朱氏集驗

制以胆汁有至理存焉治瘧者可思其義

妊娠瘧疾 先因傷寒變成者｜｜｜三錢切以猪胆汁浸一宿東壁土炒黑去土以肥棗肉十五枚同焙為末每用三錢水煎將發時服神妙 永類

風虫牙痛 ｜｜｜二寸全蝎一箇焙擦之以鹽湯漱口甚效

百一選方

紅豆蔻辛溫 時珍曰 辛熱 治腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒 藏器 冷氣腹痛消瘴霧毒氣去宿食溫

時珍曰入手足陽明大腸胃經
介賓曰入手足陽明經亦入肝腎

腸腹止吐瀉痢疾甄權治噎膈反胃虛瘧寒脹燥濕散寒時珍

發明時珍曰｜｜｜東垣脾胃藥中常用之亦取其
辛熱芳香能醒脾溫肺散寒燥濕消食之功耳
若脾胃素有伏火者切不宜用生〻編云最能動火
傷目致衄食料不宜用之權曰多食令人舌粗不思
飲食

蓽茇 又名蓽撥 時珍曰陳藏器本草作畢
勃扶南傳作逼撥大明會典作畢蕟

集解 恭曰｜｜生波斯國叢生莖葉似蒟醬其子緊
細味辛烈於蒟醬彼人入食味用藏器曰其
根名畢勃沒似柴胡而黑硬頌曰今嶺南有之多
生竹林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筋葉
青圓如蕺菜闊二三寸如桑葉面光而厚三月開
花白色七月結子如小指大長二寸許青黑色類

昇曰牙痛因寒者宜乾薑丨丨細辛因熱
者宜石膏牙硝因風者宜皂角僵蚕蜂房
二烏因虫者宜石灰雄黃
介賓曰其味大辛須同參朮歸地諸甘溫
補藥用之尤效
鳴皋曰丨丨之性下行大腸而下氣故治
氣痢凡痢總屬大腸之滯或有形之滯或
血滯或氣滯故名滯下也觀寇氏云多服
走真氣令人腸虛下重則能通大腸之氣
可知也

椹子而長九月收米晒乾南人愛其辛香
或取葉生茹之復有番舶上來者更辛香
辛大溫時珍曰氣熱味辛 主溫中下氣補腰脚消食除胃冷
陰疝痃癖藏器霍亂冷氣心痛血氣大明水瀉虛痢嘔逆醋
心產後瀉痢與阿魏和合良得訶子人參桂心乾薑
治臟腑虛冷腸鳴神效李珣治頭痛鼻淵牙痛時珍
斅曰去梗用頭以醋浸一宿焙乾以刀刮
去皮粟子令淨乃用免傷人肺令人上氣
發明宗奭曰丨丨走腸胃冷氣嘔吐心腹滿痛者宜
之多服走泄真氣令人腸虛下重頌曰唐太宗
實錄云貞觀中上以氣痢久未痊服名醫藥不應因
詔訪求其方有衛士進黃牛乳煎丨丨方用之有效
劉禹錫云屢試於虛冷者必效時珍曰牛乳煎詳見
獸部牛乳下丨丨為頭痛鼻淵牙痛要藥取其辛熱

能入陽明經散浮熱也〔又曰〕氣熱味辛陽也浮也入
手足陽經然辛熱耗散能動脾肺之火多用令人目
昏食料尤
不宜之

方

冷痰惡心｜｜為末食前用米飲服半錢　聖惠

胃冷口酸流清水心下連臍痛用｜｜半兩薑製厚朴一兩為末入熟鯽魚肉研和丸綠豆大每米飲下二十丸立效　選奇

癃氣成塊在腹不散｜｜一兩大黄一兩並生為末入射香少許蜜丸桐子大每冷酒服三十丸

婦人血氣作痛及下血無時月水不調用｜｜盐水炒蒲黄炒等分為末以鍊蜜丸桐子大每空心酒下三十丸名二神丸　陳氏方　永類

偏頭痛｜｜為末令患者口含温水隨左右痛以左右鼻嗅一字甚有效　經驗

風虫牙痛｜｜末揩之煎蒼耳湯漱去涎〇聖濟總錄用｜｜胡椒等分為末蠟丸麻子大塞虫孔中

鼻流清涕｜｜為末嗅之效　衛生易簡方

昂曰甘寒入肺 鳴皋曰覩其治腸澼血痢亦大腸藥

介賓曰甘平微寒善化毒故治癰疽惡瘡風濕諸毒誠為要藥但性緩用須加倍或酒煮或擣汁和酒頓飲

中梓曰甘微寒主脹滿下利消癰散毒補虛療風世人但知其消毒之功昧其脹利風虛之用予于諸症中用之屢屢見效

子接曰——得當歸治熱毒血痢

鳴皋曰得酒良

希雍曰同甘菊花紫花地丁夏枯草白芨白斂貝母連翹鼠粘子治一切腫毒 君地榆芍藥川連甘草升麻治血痢

金銀藤 又名忍冬別錄 鴛鴦藤綱目 鷺鷥藤同上 老翁鬚同上 左纏藤同上 金釵股同上 通靈草土宿 蜜桶藤同上

甘溫 藏器曰小寒云溫者非也 治寒熱身腫別錄 治腹脹滿能止氣下澼甄權 熱毒血痢水痢濃煎服藏器 治飛尸遁尸風尸沉尸尸疰鬼擊一切風濕氣及諸腫毒癰疽疥癬楊梅諸惡瘡散熱解毒時珍

發明 弘景曰忍冬煮汁釀酒飲補虛療風長年益壽可常服 時珍曰——莖葉及花功用皆同昔人稱其治風除脹解痢逐尸為要藥而後世不知用後世稱其消腫散毒治瘡為要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一徹論也按陳自明外科精要云忍冬酒治癰疽發背初發便當服此其

效甚奇勝於紅内消洪邁沈括所載諸方甚詳如瘍醫丹陽僧江西僧鑒清金陵王琪王尉子駿海州劉秀才純臣等所載療癰疽發背皆是此物故張相公云誰知至賤之中乃有殊常之效

方

忍冬酒 治癰疽發背不問發在何處或頭面或手足或腰脇或乳皆有奇效但虔心服之俟其疽破仍以神異膏貼之妙甚用鮮忍冬一把以葉入石器内研爛入生餅子酒少許稀稠得所塗於四圍中留一口洩氣其藤只用五兩木槌打碎不可犯鉄甘草節生用一兩同將沙沙器慢煎至一椀入無灰酒一椀再煎數沸去渣分三服一日一夜吃盡病勢重者一日二劑服至大小腸通利則藥力到無鮮者用乾者然力不及鮮者 外科精義

忍冬丸 治消渴愈後預防發癰疽先宜服此忍冬根花葉皆可用入瓶内以好酒浸以糠火煨一夜取出晒乾入甘草少許研細末以浸藥酒打糊丸桐子大每服四五十丸或百丸湯酒任下此丸亦大能止渴 同上

一切腫毒 已潰未潰初起皆治

丨丨丨連莖葉搗自然汁一椀煎八分温服以渣敷上敗毒托裏散氣和血其功獨勝　丁瘡便毒方同上　喉痺乳蛾方同上俱表積善堂方　癰疽托裏發背腸癰乳癰無名腫毒焮痛實熱狀類傷寒不問虛實服之未成者內消已成者即潰忍冬葉黃芪各五兩當歸一兩甘草八錢為細末每服二錢酒一盞半煎一盞隨病上下服日再服渣敷之和劑　瘡久成漏忍冬酒常服見戴原禮要訣　熱毒血痢丨丨丨濃煎飲聖惠方　五種尸注飛尸者遊走皮膚洞穿臟腑每發刺痛變動不常也遁尸者附骨入肉攻鑿血脈每發不可見死尸聞哀哭便作也風尸者淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得風雪便作也沉尸者纏結臟腑冲引心脇每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則大作也並是身中尸鬼接引外邪宜用丨丨丨莖葉熬膏每鷄子大許温酒化下日二三服肘後　鬼擊身青作痛丨丨丨一兩煎

〔昂曰〕｜｜｜足少陰腎經〔君舉震亨曰〕入陽明太陰經〔希雍曰〕當是入肝胃解熱涼血之藥

飲 李樓怪症奇方

脚氣作痛 筋骨引痛｜｜｜為末每溫酒服二錢 衛生易簡

中野菌毒 急采｜｜｜啖之 夷堅志

忍冬膏 治諸般腫痛金傷瘡惡瘡用｜｜｜四兩吸鐵石三錢香油一斤煎枯去渣入黃丹八兩熬至滴水不散攤貼 乾坤秘韞

蒲公英

又名黃花地丁 金簪草 綱目 〔時珍曰〕千金方作鳧公英圖經作僕公罌庚辛玉冊作鵓鴿英

集解 〔保昇曰〕｜｜｜莖葉似苦苣斷之有白汁堪生啖花如單菊而大〔頌曰〕處處有之初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出一花色黃如金錢俗訛為僕公罌是也〔宗奭曰〕即地丁也四時有花花罷飛絮絮中有子落處即生〔時珍曰〕地丁江之南北頗多他處亦有之嶺南絕無小科布地四散而生莖葉花絮並似苦苣但小耳嫩苗可食庚辛玉冊云地丁葉似小萵苣花似大旋蒿一

〔希雍曰〕入肝胃解熱凉血之要藥乳癰屬肝經婦人經行後肝經主事故治之宜生噉之良

〔杲曰〕乳頭屬厥陰乳房屬陽明故專治乳癰〔旻曰〕亦爲通淋妙品諸家不言試之甚效

〔鳴皋曰〕入肝腎二經故爲通淋妙品

〔杲曰〕凡螳螂諸虫盛夏孕育游諸物上必遺精汁乾久則有毒人手觸之成疾名狐尿刺慘痛不眠百治不效取汁厚塗即愈

〔希雍曰〕得夏枯草貝母連翹白芷栝樓根橘葉甘草頭垢牡鼠糞山豆根山慈姑治一切乳癰乳岩爲上藥

莖聳上三四寸斷之有白汁二月采花三月采根可制汞伏三黄

苗甘平〔杲曰〕苦寒 治婦人乳癰腫水煮汁飲及封之立消藕恭 解食毒散滯氣化熱毒消惡腫結核丁腫震亨 擦牙固齒烏鬚髮壯筋骨時珍 白汁塗惡刺狐尿瘡即愈藕頌

發明〔杲曰〕—— 苦寒足少陰腎經君藥也本經必用之〔震亨曰〕此草屬土開黄花味甘解食毒散滯氣可入陽明太陰經化熱毒消腫毒有奇功同忍冬藤煎湯入少酒佐之治乳癰服罷欲睡是其功也睡覺微汗病即安矣〔頌曰〕治惡刺方出千金方其序云余以貞觀五年七月十五以左手中指觸庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色常聞此方遂試之手下則愈痛除瘡即瘥故楊炎南行方亦着其效云〔時珍曰〕薩謙齋瑞竹堂方有擦牙烏鬚髮還少丹甚言此草之功盖取其能通

腎也故東垣李氏言其為少陰本經必用之藥而著本草者不知此義

方　還少丹　此方極能固齒壯筋骨生腎水服之鬚髮返黑齒落更生年少服之至老不衰

一一一連根帶葉取一斤洗勿令見天日陰乾入斗子觧塩一兩香附五錢二味為細末入一一一內淹一宿分為二十團用皮紙包裹三四層扎定用蚯蚓糞如法固濟入竈內焙乾乃以武火煆通紅為度冷定去泥為末早晚擦牙漱之吐嚥任便久〻方效　瑞竹堂

乳癰紅腫　一一一一兩忍冬藤二兩搗爛水二鍾煎一鍾服睡覺病去矣　積德堂

疳瘡丁瘡　一一一搗傳之別搗汁和酒煎服取汗

多年惡瘡　一一一搗貼　唐氏救急方

蛇螫　方同上

紫花地丁　又名箭頭草　綱目　獨行虎　同上　羊角子　秘韞米布袋

集解　時珍曰葉似柳而微細夏開紫花結角平地者起莖溝壑邊生者起蔓普濟方云鄉村籬

蒲公英　紫花地丁　七

落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似
木香之葉此與紫花者相戾恐別是一種

苦辛寒治一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡

時珍

方　黃疸內熱　地丁末酒服三錢　乾坤秘韞　稻粘咽　不得出者箭頭草嚼嚥下　方同上

癰疽惡瘡　||||連根同蒼耳葉等分搗爛酒一鐘攪汁服　楊誠經驗方

癰疽發背　無名諸腫貼之如神||||三伏時收以白麪和成盤醋浸一夜貼之　孫天仁集效方

丁腫　千金用||||搗汁服雖極危者亦效　楊氏用||||葱頭生蜜共搗貼之　若瘤瘡加新黑牛屎

瘰癧發背　丁瘡諸腫||||根去粗皮同白蒺藜為末油和塗神效　乾坤秘韞

喉痺腫痛　||||草葉入醬少許研膏點入取吐　普濟

熏瘡法　||

昂曰瀉心火以保肺金去肺大腸之風熱
又曰心火降則不灼肺而金清肺與大腸相表裏肺金清則大腸亦清
介賓曰大苦大寒
昂曰急黄乃血熱極所致
希雍曰爲解毒清熱之上藥凡痛必因於熱毒解熱散則痛自止瘡腫自消急黄乃血熱極所發故必發熱〻氣上熏則發咳嗽諸虫亦濕熱所化故悉主之而多獲奇效也又曰虚寒者勿服
子接曰｜｜｜專解咽喉腫毒
希雍曰｜｜｜入散乳藥中能消乳岩

｜｜根日乾以罐盛燒烟對瘡口熏之出盡黄水愈 易簡方

山豆根 又名解毒 綱目 黄結 同上 中藥

集解 頌曰｜｜｜生劍南及宜州果州山谷今廣西亦有以忠州萬州者佳苗蔓如豆葉青經冬不凋八月採根廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕鼠取腸胃晒乾解毒攻熱亦效

甘寒 時珍曰沈括筆談云味極苦云甘誤矣 解諸藥毒止痛消瘡腫發熱欬嗽治人及馬急黄殺小蟲 開寳 含之嚥汁解喉痺腫毒極妙 蘇頌 研末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣腹脹又下寸白諸虫丸服止下痢磨汁服止卒患熱厥心腹痛五種痔痛研汁塗諸熱腫

〔駕峯曰〕卒患總屬邪熱必卒患者方可用此方

〔布雍曰〕入手太陰足陽明肺胃經

禿瘡蛇犬蜘蛛傷 時珍

方 解蠱毒 蜜取｜｜｜和水研服少許末定再服已禁聲者亦愈 急黃｜｜｜水服二錢若帶蠱氣以酒下 霍亂吐利｜｜｜末橘皮湯下三錢效 赤白痢｜｜｜末蜜丸白湯下 水蠱腹大有聲而皮色黑者｜｜｜末酒下二錢 聖惠方 以上俱備急方

卒患腹痛｜｜｜水研半盞服入口即定 頭風油調末塗兩太陽 頭生白屑油浸塗之 牙齦痛腫｜｜｜一片含於痛所 以上俱備急方 喉中發瘡｜｜｜醋磨嚥之追涎即愈 永類鈐方 疥癬虫瘡臘猪脂調塗 備急 喉痺急症牙關緊閉水米不下｜｜｜白藥等分水煎嚥之嚥下二三口即愈 楊清叟外科方

牛蒡子 又名惡實別錄 鼠粘子同上 大力子綱目 蒡翁菜同上 便牽牛同上 蝙蝠刺

〔希雍曰〕入手太陰足陽明為散風除熱解毒之要藥辛能散結苦能泄熱熱結散則臓氣清明故明目而補中風之所傷衛氣必壅壅則發熱辛凉解散則表氣和風無所留矣故除風傷藏器主風毒腫諸瘻元素主潤肺散結氣利咽膈去皮膚風通十二經者悉此意耳故用以治瘡疹尤獲奇效

〔中梓曰〕辛温入肺達肺氣利咽喉〔又曰〕——本入肺理風之劑兼理腰膝凝滯者一則金為水母一則清肅下輸或謂兼入腎者非其升浮之用也

〔希雍曰〕升多于降〔介賓曰〕降中有升治風毒斑疹散瘡瘍腫毒喉痺及腰膝凝寒痺滞之氣以其善走十二經而解中有散也

〔希雍曰〕性冷滑痘家惟宜于血熱便閉之症若氣虛色白大便利或泄瀉者慎勿服沙疹不忌泄瀉故用之無妨

〔昂曰〕性冷而滑利痘虛寒泄瀉者忌之

〔鳴皋曰〕按九牛二虎丸治中風多年手足

集解

〔頌曰〕——子處處有之葉大如芋葉而長實似葡萄核而褐色外殼似栗梂而小如指頭多刺根有極大者作菜茹益人秋後采子入藥〔時珍曰〕牛蒡古人剪苗汋淘為蔬取根煮為脯云甚益人今人罕食之三月生苗起莖高者三四尺四月開花成叢淡紫色結實如楓梂而小萼上細刺百十攢之一梂有子數十顆其根大者如臂長者近尺色灰黷七月采子十月采根

辛平〔藏器曰〕苦〔元素曰〕温　明目補中除風傷〔別錄〕風毒腫諸瘻〔藏器〕研末浸酒每日服三二盞除諸風去丹石毒利腰脚又食前熟挼三枚吞之散諸節結筋骨煩熱毒〔甄權〕吞一枚出癰疽頭〔蘓恭〕炒研煎飲通利小便〔孟洗〕潤肺散氣利咽膈去皮膚風通十二經〔元素〕消斑疹毒〔時珍〕

牛蒡子　九

不仁腰不能轉側用虎前左掌二个酥炙
牛左脇第三根骨九根酥炙黄茋五兩生
犡牛旁子二十兩生研當歸五兩酒炒牛
夕五兩盐水炒小川芎二兩半酒炒沙苑
子十兩生研雲苓五兩乳蒸白蒺二十兩
炒去刺外用雄烏骨鷄一隻將繩勒死乾
去毛雜頭足煮爛連骨一齊搗爛焙乾研
末同前藥煉蜜為丸此方不知何出見有
服之神效者然則牛蒡果有利腰膝凝滯
之功今人知用之者少耳
[希雍曰]同紫草犀角生地治天行痘瘡血
熱粘乾不得出有神功

[斅曰]酒拌蒸待有白
霜出拭去焙擣用
發明[杲曰]｜｜｜其用有四治風濕癮疹咽喉風熱
能散諸腫瘡瘍之毒利凝滯腰膝之氣是也
方　風水身腫欲裂｜｜｜二兩炒研為末每
溫水服二錢日三服　聖惠方　風熱
浮腫咽喉閉塞｜｜｜一合半生半
熟為末熱酒服方寸匕　經驗　痰厥頭疼｜｜臘
茶為末旋覆花石膏等分為末
湯下　聖惠　頭痛連睛｜｜｜茶清調服　醫方摘要　咽
膈不利疎風壅涎唾｜｜｜微炒荊芥穗一兩炙草
半兩為末食後湯服二錢緩緩取效　錢氏
本草衍義　懸癰喉痛風熱上搏也｜｜｜生甘草等
分煎含嚥名啓關散　普濟方　咽喉
痘疹｜｜｜二錢桔梗一錢半甘草　風熱癮疹｜｜炒
節七分水煎服　痘疹要訣
浮萍等分以薄荷湯服二
錢日二　初虞世録驗　痘瘡不快壯熱煩躁咽膈
壅塞大便秘｜

｜｜炒一錢二分荊穗二分甘草四分水一盞煎七分已出亦可服名必勝散若大便滑勿服亦治咽腫痛 和劑

婦人吹乳｜｜｜一錢射香少許温酒細吞 袖珍

便癰腫痛｜｜｜二錢炒研末入蜜一匙芒硝一匙空心酒服 同上

蛇蝎蠱毒｜｜｜煮汁水服 易簡

蠱腹大｜｜｜微炒一兩為末麪糊丸梧桐子大米飲酌下 張文仲

歷節腫痛 風熱攻手指赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱則大便秘｜｜｜三兩新豆豉炒羌活各一兩為末每服二錢 本事

根莖苦寒 甘平［權曰］治傷寒〻熱汗出中風面腫消渴熱中逐水 別錄 根主牙齒痛勞瘧諸風脚緩弱風毒癰疽咳嗽傷肺〻壅疝瘕冷氣積血 蘇恭 根浸酒服去風及

牛蒡子 根莖 十

悪瘡和葉搗爛傅杖瘡金瘡永不畏風蔵器主四肢不
健通十二經脉甄權切根拌豆麪作飯食消瘇脹莖葉
煮汁作浴湯去皮間習習如虫行入鹽生搗塗一切
腫毒孟詵―〔蔵器曰〕根須蒸熟日乾用不爾令人吐
發明〔頌曰〕根作脯食甚良莖葉宜釀酒服冬采根蒸曬入藥劉禹錫傳信方治暴中風用緊細―
―根取時避風以竹刀刮去土搗汁一大升和蜜四
大合温分二服得汗出即愈此方得之岳鄂鄭中丞
鄭因食熱肉一頓便中
暴風得此方服立瘥
方　時氣餘熱不退煩躁發渴四支無力不能飲食用牛蒡根搗汁服一小盞　聖惠方
一切風疾十年二十年者牛蒡根切一升地黄甘杞牛膝各三升用袋盛藥浸好酒内任意飲

外臺方

老人風濕久痺筋骨拘攣服此壯腎潤皮毛益氣力牛蒡根一升切生地一升切大黑豆二升炒袋盛浸好酒五六日隨量温飲　集驗方

頭面忽腫熱毒風氣內攻或連手足赤腫觸着痛者牛蒡根搗爛酒煎成膏貼患處仍以酒化服一二匙甚佳　斗門方

頭風掣痛不可禁者摩膏主之牛蒡莖葉搗汁二升酒一升盐花一匙熬成膏以摩痛處風毒自散摩時須用力令熱乃效　見篋中方

頭風白屑牛蒡葉熬膏塗之至明皂莢水洗去

喉中熱腫牛蒡根一升水五升煎一升分三服○又方牛蒡根搗汁細嚥　延年方

熱毒牙痛不可忍牛蒡根搗汁入盐花少許熬膏塗齦上重者不過三次瘥　聖惠

項下癭疾根一升水三升煮一升半分三服或蜜丸常服之亦可　救急方

諸瘡毒牛蒡三莖洗煮爛搗汁入米煮粥食一椀甚良　普濟方

反花瘡積年不瘥者搗根和臘猪脂封之　千金

小便不通臍腹急痛葉汁

〔昂曰〕廣州筆記云出處州遂昌縣洪山無毛以真者有毛誤也

〔昂曰〕功專清熱散結

〔希雍曰〕亦入乳岩乳毒方中用之相宜

生地汁各一合入蜜二合每用一合入水半盞煎三五沸調滑石末一錢服 聖濟搃錄 月水不通結成癥塊腹脇脹大欲死根二斤切蒸三次酒三斗浸五日每溫服一盞 普濟

山慈姑 又名金燈 拾遺 鬼燈檠 綱目 朱姑 同上 鹿蹄草 同上 無義草

集解 〔藏器曰〕｜｜｜生山中濕地葉似車前根如慈姑〔時珍曰〕｜｜｜處處有之冬月生葉如水仙花之葉而狹二月中出一莖如箭簳高尺許莖端開花白色亦有紅黃色者上有黑點其花乃衆花簇成一朶如絲紐成可愛三月結子有三稜四月苗枯即掘取其根狀如慈姑及小蒜遲則苗腐難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉根無毛｜｜｜有毛殼包裹為異用之去毛殼

根甘微辛有小毒治癰腫瘡瘻瘰癧結核等症醋磨塗之亦剝人面皮除皯䵟 藏器 **主**疔腫攻毒破皮解諸

毒蠱毒蛇虫狂犬傷 時珍

方　面點丨丨丨末夜塗 旦洗　普濟　瘧疸疔腫及黃疸丨丨丨 連根同蒼耳草

等分搗爛好酒一盞濾汁

溫服或末服　乾坤生意　風痰癎疾丨丨丨根似蒜 者一个以茶清

研如泥日中時以茶調下即臥日中良久吐出鴉

子大物永不發不吐以熱茶投之　奇效良方

萬應解毒丸 一名太乙紫金丹一名玉樞丹解諸毒療 諸瘡利關節治百病行路者宜携此丨丨

丨去皮焙二兩五倍子二兩焙千金子仁白者研壓

去油一兩紅牙大戟去蘆去骨洗焙一兩半射香三

錢為末重羅令勻糯米濃汁和之木杵石臼搗千下

作一錢一錠病甚者連服取利一二行用溫粥補之

凡一切飲食藥毒蠱毒瘴氣河豚土菌死牛馬毒並

用水磨服一錠吐利即愈一切惡瘡及楊梅等毒並

用水磨或酒磨塗日數次立消傷寒狂乱瘟疫喉痺

並用冷水入薄荷汁化下瀉痢霍乱絞腸沙薄荷湯

山慈姑　漏蘆

【杲曰】足陽明本經藥胃

【昂曰】入胃大腸通肺小腸

【希雍曰】亦入足少陽

下中風中氣口噤眼斜癲癇鬼邪並暖酒下傳尸勞瘵涼水化服取下惡物出積為妙久近瘧疾將發時東流水煎桃枝湯服小兒驚風痢疾薄荷湯下頭風頭痛酒研塗太陽牙痛及一切湯火蟲獸諸傷並磨塗仍服少許

一百一

漏盧

又名野蘭本經　莢蒿蘇恭　鬼油麻日華

【時珍曰】唐韻作蘆

集解　【弘景曰】近道亦有市人取苗用之俗中取根名鹿驪根苦酒摩以治瘡疥【恭曰】俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃生莢長似細麻之莢大如筯許有四五瓣七八月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其莖及葉子未見用根其鹿驪山南謂之木黎蘆有毒非｜｜也｜｜也今人以馬薊似苦芺者為｜｜亦非也【志曰】別本言｜｜莖大如筯高四五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶云鹿驪蘇云木黎蘆亦非也｜｜自別【藏器曰】南人用苗北土用根乃樹生如茱萸

樹高二三尺有毒殺虫山人以洗瘡疥〔保昇曰〕葉
似角蒿今曹　下濕處最多六七月采莖日乾黑
於衆草〔大明曰〕花苗並可用形與氣味似乾牛蒡
頭上有白花子〔頌曰〕今汴東州郡及秦州海州皆
有舊說莖葉似白蒿花黃白莢莖若筯大房類油
麻而小今惟單州所圖上者差相類沂州者花葉
頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同
一幹海州者花紫碧如單葉蓮花〻葉下及根旁
有白茸裹之根如蔓菁而細又類葱本黑色淮甸
人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但
秦州海州者葉更有鉅齒一物而殊類如此醫家
何所適從當依舊說以單州出者為勝又本草飛
廉一名｜｜云與苦芺相類其根生則肉白皮黑
乾則黑如元參七八月采花陰乾用所說與秦州
海所圖｜｜花葉及根頗相近然彼人但名｜｜
不曰飛廉也〔時珍曰〕沈存中筆談云今方家所用
｜｜乃飛廉也飛廉一名｜｜苗似苦芺根如牛
蒡綿頭者是也采時用根今閩中所謂｜｜莖如

〔昂曰〕鹹軟堅苦下泄寒勝熱
〔希雍曰〕苦能下泄鹹能軟堅寒能除熱入
足陽明少陽太陽手太陰陽明寒而通利
之藥也故主皮膚熱患瘡疖痔瘻痺下乳
汁止遺溺本經謂聡明耳目亦指熱散病
除之效也

油麻高六七尺秋深枯黑如
漆采時用苗乃眞｜｜也
根苗鹹寒無毒〔別錄曰〕大寒〔藏器曰〕有毒〔李杲曰〕無毒　治皮膚熱毒惡
瘡疽痔瘻痺下乳汁聰明耳目〔本經〕止遺溺熱氣瘡痒
如麻豆可作浴湯〔別錄〕通小腸治泄精尿血腸風〻赤
眼小兒壯熱撲損續筋骨治乳癰瘰癧金瘡止血排
膿補血長肉通經脉〔大明〕
〔之才曰〕連翹爲之使〔斅
曰〕生甘草對拌蒸晒用
發明〔時珍曰〕｜｜下乳汁消熱毒排膿止血生肌殺
虫故東垣以爲手足陽明藥而古方治癰疽發
背以｜｜湯爲首稱也龐安常傷寒論治癰疽及預
辟時行瘟疹熱用｜｜葉云無則以山巵子代之亦

希雍曰||同貝母連翹甘草銀花橘葉
鼠黏白芷山豆根山慈姑夏枯草治乳癌
乳岩　同連翹甘草菊花紫花地丁貝母
銀花夏枯草治發背瘰癧排膿止痛　同
黄芪人參排膿長肉　加狗蹄猪蹄汁能下
乳

取其寒能解熱蓋不知
其能入陽明之故也
方　腹中蚘虫||為末以餅臛和服　外臺秘要　小兒無辜疳病肚脹或時
瀉痢冷熱不調以||一兩杵散每服一錢
以猪肝一兩入鹽少許同煮頓食之　聖惠　冷勞泄
痢||一兩艾葉炒四兩為末米醋三升入藥末一
半同熬成膏入後末和丸梧子大每湯服三十丸
聖濟方　産後帶下　方同上　乳汁不下　乃氣脉壅塞也又治經絡凝滯乳內脹痛
耶畜成癰服之自然內消||二兩半蛇蛻十條炙
焦瓜蔞十箇燒存性為末每服二錢温酒調下良久
以熱湯投之以
通為度　和劑　歷節風痛　筋骨拘攣古聖散用||麩炒半兩地龍焙半兩為
末生薑二兩取汁密三兩同煎三五沸入好酒
五合盛之每以二杯調末一錢温服　聖濟　一切
癰疽　發背初發二日但有熱證便宜服||湯退毒下膿乃宣熱拔毒之劑熱退即住服||用有
漏盧　飛廉　十四

白茸者連翹生黄芪沉香各一兩半粉甘草半兩大黄微炒一兩為細末每服三錢薑棗湯下　李迅癰疽集驗方

飛廉 亦名漏盧 別錄 飛雉 同上 木禾 同上 伏兔 同上 伏猪 同上 天薺 同上

集解 弘景曰處處有之極似苦芺惟葉多刻鈌葉下附莖，，有皮起似箭羽其花紫色今既別有漏盧則此漏盧乃別名耳 恭曰此有兩種一種平澤中是陶所說者一種生山岡上葉相似而無刻鈌且多毛其莖赤無羽其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如元参用莖葉及根治疳蝕殺虫與平澤者俱有驗 保昇曰葉似苦芺莖似軟羽花紫色子毛白所在平澤皆有 斅曰赤脂蔓與｜｜相似只赤脂蔓見酒則色便如血以此可表識之 頌曰今秦州所圖漏盧花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹海州所圖漏盧花紫碧色如單葉蓮花，，萼下及根旁有白茸裹之根

黑色如蔓菁而細又類葱本與陶蘇所説｜｜相近然彼但謂之漏蘆今醫家罕有用｜｜者不能的識〔時珍曰〕｜｜蒿類也蘇頌圖經疑海州所圖之漏盧是｜｜沈存中筆談亦言｜｜根如牛蒡而綿頭古方漏盧散下云用有白茸者則是有白茸者｜｜無疑矣今考二物功用氣味俱不相遠似可通用豈或一類數種而古今名稱各處不同乎

根及花苦平無毒〔權曰苦鹹有毒〕治骨節熱脛重酸痛久服輕身〔本經〕頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔疾濕痺止風邪欬嗽下乳汁久服益氣明目〔別錄〕主留血療疳蝕殺虫〔蘇恭〕小兒疳痢為散水㵾服大效〔蕭炳〕治頭風旋運〔時珍〕

飛廉　苦芺

〔之才曰〕得烏頭良忌麻黄〔斅曰〕刮去粗皮杵碎苦酒拌一夜漉出日乾用

發明 時珍曰抱朴子言｜｜單服可輕身延年又言服｜｜煎可遠涉疾行力倍於常本經別録所列亦是良藥而後人不知用之何哉

方 痔䘌蝕口及下部｜｜蒿焼灰擣篩以兩錢匕著痛處其痛則忍之若不痛非痔也下部出如馬尾大相纒出無數十日瘥二十日平復 千金翼

苦芺 音襖 又名鉤芺 爾雅 苦板

集解 〔保昇曰〕所在下濕地有之莖圓無剌可生噉子若貓薊五月采苗晒乾用〔時珍曰〕芺大如拇指中空莖頭有薹似薊初生可食許氏説文言江南人食之下氣今浙東人清明節采嫩苗食之云一年不生瘡疥亦擣汁和米為食其色清久留不敗造化指南云｜｜大者名苦藉葉如地黄味

苦初生有白毛入夏抽莖有毛開白花甚繁結細實其無花實者名地胆草汁苦如胆處處濕地有之入爐火家用

苗苦微寒治面目通身漆瘡燒灰傅之亦可生食(別錄)

燒灰治金瘡極驗(弘景)治丹毒(大明)煎湯洗痔甚效(汪穎)下氣解熱(時珍)

貫衆又名貫節(本經)貫渠(同上)百頭(同上)又名虎卷(扁府)草鴟頭(別錄)黑狗脊(綱目)鳳尾草(圖經)貫中(吳普)

集解[普曰]葉青黃色兩兩相對莖有黑毛叢生冬夏不死四月花白七月實黑聚相連卷旁生三八月采根五月采葉[頌曰]今陝西河東及荊襄多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三

稜葉綠色似鶴翎又名鳳尾草其根紫黑色形如大爪下有一黑鬚毛又似老鴟爾雅注云葉圓銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是矣[時珍曰]多生山陰近水處數根叢生一根數莖莖大如筋其涎滑其葉兩兩相對生如狗脊之葉而無鋸齒青黃色面深背淺其根曲而有尖觜黑鬚叢簇亦似狗脊根而大狀如伏鴟

根苦微寒有毒治腹中邪熱氣諸毒殺三虫本經 去寸白破癥瘕除頭風止金瘡別錄 為末水服一錢止鼻血有效甄權 止下血崩中帶下產後血氣腹痛斑疹毒漆毒骨鯁解猪病時珍

[之才曰]雚菌赤小豆為之使伏石鍾乳

[希雍曰]味苦微寒故主腹中邪熱氣諸毒虫由濕熱所生苦寒除濕故殺三虫苦以泄之亦兼有散之之義故破癥結金瘡出血後必發熱泄熱散結則金瘡自止

[鴻泉曰]一一雖寒而入氣分本經主腹中邪熱氣氣字當玩故又能破癥結治產後血氣腹痛之因熱者也又入血分故治衂止血及崩帶

發明〔時珍曰〕||大治婦人血氣根汁能制三黃化
五金伏鍾乳結砂制汞且能解毒軟堅王海藏
治夏月豆出不快々斑散用之云||有毒而能解
腹中邪熱之毒病因內感而發之於外者多效非古
法之分經也王璆百一選方言滁州蔣教授因食鯉
魚玉蟬羹為肋肉所鯁百藥不效或令以||濃煎
汁一盞分三服連進至夜一路而出亦可為末
水服一錢觀此可知軟堅之功不止治血治瘡

方
衂血不止||根末水服一錢 普濟
諸般下血 黑||黃者不用酒煎
內肉赤色者去皮毛焙為極細末每空心米飲下二錢 同上
血崩||半兩酒煎服立止 集簡
產後亡血過多心腹徹痛者||一箇全用以好醋浸炙令香熟為末空心米飲下三錢甚效
婦人良方
赤白帶下 年深諸藥不效者用上方治年深之名獨聖散甚效 同上
咳嗽出血及膿||||蘓木等分每服三錢水一盞煎入生薑三片。久嗽成勞瘵||炙為末用魚
貫衆射干

十七

〔丹溪曰〕行太陰肺脾厥陰心包肝經
〔鳴皋曰〕觀其通經閉治瘧自係肝胆主藥
〔希雍曰〕亦入手少陽

鮓蘸食之聖惠方 **痘瘡不快** ｜｜赤芍各一錢升麻甘草各五分淡竹葉三片水煎服王海藏 **漆瘡作痒** 油調塗之千金方 **鳴魚骨鯁** 見發明 **解輕粉毒** 牙縫出血而臭腫｜｜黃連各半兩研入氷片少許漱之積德堂 **血痢不止** ｜｜五錢酒煎服集簡方 **便毒腫痛** ｜｜酒服二錢良多能鄙事

射干

一名烏扇本經 烏蒲同上 烏翣別錄 烏吹同上 草薑同上 鳳翼拾遺 鬼扇土宿 仙人掌同上 扁竹綱目 野萱花同上 紫金牛土宿 黃遠吳普

集解 〔弘景曰〕｜｜是烏翣根黃色庭臺多種之人言其葉是鳶尾而復有鳶頭此若相似耳恐非烏翣也〔恭曰〕鳶尾葉都似｜｜而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白名鳶頭〔保昇曰〕｜｜高二三尺花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤所在皆有〔藏器曰〕｜｜鳶尾二物相似人多不分｜｜

即人間所種為花草名鳳翼者葉如烏翅秋生紅
花赤點鳶尾亦人間所種苗低下於射干狀如鳶
尾夏生紫碧花者是也〔大明曰〕｜｜根潤形似高
良薑大小黃色淡硬〔頌曰〕處處有之春生苗高一
二尺葉大類蠻薑而狹長橫䟽如翅羽狀故名烏
翣葉中抽莖似萱草莖而強硬六月開花黃紅色
瓣上有細紋秋結實作房房中子黑色〔震亨曰〕根
為｜｜葉為烏翣紫花者是紅花者非〔機曰〕諸註
｜｜非一種有花白花黃花紅花紫者丹溪獨取
紫花者必曾試驗也〔時珍曰〕｜｜即今扁竹也今
人所種多是紫花者呼為紫蝴蝶其花三四月開
六出大如萱花結房大如拇指一房四隔一隔十
餘子子大如楜椒而色紫極硬咬之不破七月始
枯陶弘景謂｜｜鳶尾是一種蘇恭陳藏器謂紫
碧者是鳶尾紅花者是｜｜韓保昇謂黃花者是
｜｜蘇頌謂花紅者是｜｜朱丹溪謂紫花者是
紅花者非各執一説何所憑依按張揖廣雅云鳶
尾｜｜也易通卦驗云冬至｜｜生土宿真君本

〔希雍曰〕苦能下泄故善降兼辛故善散故主咳逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣胸中邪逆既降且散益以微寒故主飲食大熱丹溪主大陰厥陰之積痰消結核又治足厥陰濕氣下流因勞而發為便毒皆取其泄熱散結之力耳

〔又曰〕——雖能降手少陽厥陰相火泄熱散結消腫痛然無益陰之性凡脾胃薄弱臟寒氣血虛無實熱者禁用

草云——即扁竹葉扁生如側手掌形莖亦如之青綠色一種紫花一種黃花一種碧花多生江南湖廣川浙平陸間八月取汁煮雄黃伏雌黃制丹砂能拒火據此則鳶尾——本是一類矣但花色不同正如牡丹菊花芍藥其色各異大抵功不相遠

根苦平有毒〔保昇曰〕微寒〔權曰〕有小毒〔時珍曰〕寒多服瀉人 治欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱 本經 治老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣 別錄 醋磨塗毒腫 弘景 治疰氣消瘀血通女人月閉 甄權 消痰破癥結胸膈滿腹脹氣欬痃癖開胃下食鎮肝明目 大明 治肺氣喉痺為佳 宗奭 去胃中癰瘡 元素 利積痰疝毒消結

核震亨降實火利大腸治瘧毋時珍

斅曰以米泔水浸一夜漉出以篁竹葉煮之日乾用

發明 震亨曰｜｜行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷又治便毒此足厥陰濕氣因疲勞而發取｜｜三寸與生薑同煎食前服利三兩行甚效 時珍曰｜｜能降火故古方治喉痹咽痛為要孫真人千金方治喉痹有烏扇膏金匱玉函治欬而上氣喉中作水有｜｜麻黄湯又治瘧毋鼈甲煎丸亦用烏扇燒過皆取其降厥陽相火也火降則血散腫消而淡結自解癥瘕自除矣

方 咽喉腫痛｜｜花根山豆根陰乾為末吹之如神 袖珍 傷寒咽閉腫痛用生｜｜猪脂各四兩合煎令焦去渣每含棗許取瘥 龐安常傷寒論 喉痹不通水漿不入者外臺用｜｜含之嚥汁○醫方大成用｜｜擣汁細細嚥之大腑動即解○便民方用｜｜一錢黄芩

射干 鳶尾 十九

甘草各五分末服立愈

二便不通 諸藥不效紫花｜｜生水邊者佳研汁一椀服之立通 普濟

大腹水蠱 搖動有聲皮膚黑方同上極效 肘後

陰疝刺痛 發時腫痛如刺生｜｜擣汁服取便亦可丸服 肘後

乳癰初腫 ｜｜根如僵蚕者同萱草根為末蜜調傳之神效 永類

中射工毒 生瘡者｜｜升麻各二兩水煎温服滓傳之 姚僧坦集驗方

鳶尾 根名鳶頭

集解〔弘景曰〕方家言是射干苗而主治亦是當別是一種方用鳶頭當是其根療體相似而本草不題〔恭曰〕所在有之葉似射干而濶短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白嚼之戟人喉與射干全別射干花紅抽莖長根黃有白〔保昇曰〕草名鳶尾根名鳶頭葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數箇相連〔時珍曰〕此即射干之苗非別一種也肥地莖長根粗瘠地莖短根瘦其花自

時珍曰足厥陰肝經藥

有數色諸家皆是強分

苦平有小毒治蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去水下三蟲本經殺鬼魅治頭眩別錄

蚤休

又名紫河車圖經重臺唐本重樓金線同上草甘遂同上蚤休別錄螫休日華三層草綱目七葉一枝花蒙筌白甘遂

集解〔恭曰〕今謂金線重樓者是也南人名為甘遂一莖六七葉似王孫鬼臼蓖麻輩葉有二三層根如肥大菖蒲細肌脆白〔保昇曰〕年久者二三重根如紫參皮黃肉白五月采根〔大明曰〕根如尺二蜈蚣大如肥紫菖蒲頌曰即紫河車也今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蕊赤黃色上有金絲垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉白〔宗奭曰〕||

無旁枝止一莖挺生高尺餘顚有四五葉〻有歧
似芍枝中心又起一莖亦如是生葉惟根入藥時
珍曰重樓金線處〻有之生於深山陰濕之地一
莖獨上莖當葉心葉綠色似芍藥凡二三層每層
七葉莖頭夏月開花一花七瓣有金絲蕊長三四
寸王屋山産者至五七層根如鬼臼蒼术狀外紫
中白有粘糯二種外丹家采制三黄砂汞諺云七
葉一枝花深山是我家癰疽如遇此一似手拈拿
是也

根苦微寒有毒大明曰冷無毒治驚癇搖頭弄舌熱氣在腹
中本經癲疾癰瘡除蝕下三虫去蛇毒別錄生食一升利
水唐本治胎風手足搐能吐濕瘰癧大明去瘧疾寒熱時珍

時珍曰入藥
洗切焙用

發明〔恭曰〕醋磨傳癰腫蛇毒甚有效〔時珍曰〕||足厥陰藥也凡本經驚癇痙疾瘰癧癰腫者宜之

方 小兒胎風手足搐搦用||為細末每服半錢冷水下　易簡慢驚抽搐帶陽症者白甘遂末即||一錢天花粉末二錢同於慢火上炒焦黃研勻每服一字煎射香薄荷湯下錢乙方

馬藺子

又名蠡實本經荔實別錄馬楝子圖經馬薤禮記註馬帚爾雅鉄掃帚救荒草本經旱蒲禮記豕首本經三堅

集解〔頌曰〕陝西諸郡及澧州亦有之近汴尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷五月采實許慎說文云荔似蒲而小根可為刷高誘云河北平澤多生之江東亦多種於階庭呼為旱蒲不知即馬薤也〔時珍曰〕||生荒野中

馬藺子　三十一

就地叢生一本二三十莖苗高三四尺葉中抽莖開花結子○〔宗奭曰〕陶隱居言方藥不用無識者本草諸家所註不相應若蠡實果是馬藺則日華不當言可為蔬蓋馬藺葉硬又無味牛馬皆不食豈堪人食不敢以蠡實為馬藺更俟博識〔時珍曰〕別錄蠡實亦名荔實則蠡乃荔之訛也張揖廣雅云荔又名馬藺其説已明又救荒本草言其嫩苗苦味爍熟換水浸去苦味油盐調食則馬藺亦可作菜矣寇氏據陶説疑之欠考矣

甘平無毒〔保昇曰〕寒〔頌曰〕山人服之云大溫 治皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜食本經 止心煩滿利大小便長肌肉別錄 治金瘡血內流及癰腫有效藏器 婦人血氣煩悶產後血運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤

止鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃病殺蕈毒傳蛇蟲咬毒 大明 治小腹疝痛腹內冷積水痢諸病 時珍

時珍曰入藥炒過用 治疝則醋拌炒之

方 諸冷極病 醫所不治者|||九升洗淨空腹服一合酒下日三服 千金

寒疝諸疾 寒疝不能食及腹內一切諸疾消食肥肌|||一升每日取一把麪拌煮吞之服盡愈 姚僧坦集驗

喉痺腫痛 衛生易簡用蠡實一合升麻五分水一升煎三合入少蜜攪勻細呷大驗○聖惠用|||二升升麻一兩為末蜜丸水服一錢○又|||八錢牛蒡子六錢為末溫水服方寸

水痢 張文仲備急方用|||以六月六日麪匕炒等分為末空心米飲服方寸匕常麪亦可牛骨灰亦可○又方|||乾薑川連各等分為散熱湯服二方寸匕入腹即斷也冷熱皆治常用神

馬藺子 蓖麻子

千三

〔昂曰〕能利氣故治水癥浮腫

驗不得輕之
忌猪肉冷水　腸風下血｜｜｜一斤研破酒浸夏三冬七日晒乾何首烏半斤雄黄雌黄各四兩為末以浸藥酒打糊丸桐子大每服三十丸溫酒下日三服甚效　普濟方

蓖麻子

〔集解〕〔時珍曰〕其莖有赤有白其葉大如瓠葉每葉凡五尖夏秋間椏裏抽出花穗纍纍黄色每枝結實數十顆上有刺攢簇如蝟毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點其狀如牛蜱殼中仁白如續隨子仁壓油可作印色子無刺良有刺者毒

甘辛平有小毒治水癥以水研二十枚服之吐惡沫至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體瘡痒浮腫尸疰惡氣取油塗之　唐本

研傅瘡痍疥癩塗手

足心催生大明治瘰癧取子炒熟去皮每卧時嚼服二
三枚漸加至十數枚有效宗奭主偏風不遂口眼喎邪
失音口噤頭風耳聾舌脹喉痺鼽欬脚氣毒腫丹瘤
湯火傷針刺入肉女人胎衣不下子腸挺出開通關
竅經絡能止諸痛消腫追膿拔毒時珍

發明震亨曰｜｜｜屬陰其性善收能追膿取毒外
科要藥能出有形之滯物故取胎產胎衣剩骨
膠血者用之時珍曰｜｜｜甘辛有毒熱氣味頗近
巴豆亦能利人故下水氣其性善走能開通諸竅經
絡故能治偏風失音口噤口目喎斜頭風七竅諸病
不止於出有形之物而已蓋鵜鶘油能引藥氣入內
｜｜｜油能拔病氣出外故諸膏多用之一人病偏
風手足不舉時珍用此油同羊脂射香穿山甲等藥

煎作摩膏日摩数次月餘漸復兼服捜風化痰養血
之劑三月而愈一人病手臂一塊腫痛亦用丨丨丨
搗膏貼之一夜而愈一人病氣欝偏頭痛用此同乳
香食盐搗貼太陽穴一夜痛止一婦産後子腸不收
搗仁貼其丹田一夜而上此藥外用屢奏奇功但内
服不可輕率耳或言搗膏以筋點于鵞鴨六畜舌下
即不能食有
毒可知矣

方　口眼喎邪　搗貼左貼右〻貼左即止〇婦人良
方用丨丨丨匕〻粒搗餅右喎安左
手心左喎安右手心以銅盂盛熱水坐藥上冷即換
五六次即正也〇一方用丨丨丨匕〻蓖巴豆十九
蓖射香五分

風氣頭痛　不可忍者乳香丨丨丨等分
研如上用法　研餅隨左右貼太陽穴觧髮
出氣

八種頭風　丨丨丨巴豆各四十九粒去殼川芎
甚效　一大塊搗如泥糊丸彈子大線穿掛
風處陰乾用時先將好茶末調成膏塗碗内火燒煎
藥烟起覆盞薫之待烟盡以百沸葱湯點碗茶末服

之以被褁頭卧取　｜｜｜三五粒大棗一
汗避風　袖珍　鼻窒不通　枚去皮搗匀綿褁塞之
一日一易　小兒痀疾及諸病後天柱骨倒
聖濟　天柱骨倒　乃體虛所致宜生筋散貼之木
鱉子六箇去殼｜｜｜六十粒去殼研匀先將
包頭擦頂上令熱以津調藥貼之　鄭氏小兒　舌上
｜｜｜油醮紙撚燒烟　｜｜｜四十
出血　熏鼻中自止　摘元方　舌脹滿口　九粒去殼研
油作紙撚燒烟熏之未退再熏有　急喉痹塞　牙関緊
人舌腫出口用此而愈　經驗　急不通
用此即破研｜｜｜紙捲作筩　水氣脹滿｜｜仁
燒烟熏吸之即通名聖烟筩　研水觧得
三合清旦一頓服盡日中當下青黃　｜｜
水也或云壯人只可五粒　外臺　催生下胎　｜七
齒研塗足心若胎及衣下速洗去恐子腸挺出若子
腸挺出即以此塗頂心則腸自入也　崔元亮海上
方。或以｜｜｜二粒巴豆二　痛不可忍
粒射香一分研貼臍中並足心　一切腫毒｜｜｜搗
蓖麻子

傳即止　手指攣曲節間痛不可忍漸至脫
肘後　癘風鼻塌　落用｜｜｜一兩去皮川連一兩
剉豆大以小瓶子入水一升同浸春夏三日秋冬五
日取｜｜｜一枚劈破以浸藥水存之漸加至四五
粒微利不妨瓶中水盡更添兩月後吃大蒜猪肉試
之如不發是效也若發動再服　不發乃止　杜
壬方　瘰癧結核　｜｜｜炒去皮臥時服一二枚取效一
生不可吃炒豆犯之脹死　阮氏方
耳卒聾閉　｜｜｜百粒去殼大棗十五枚搗爛入乳
小兒乳汁和丸作鋌綿裹一枚塞之覺耳
內熱為度日一易二　針刺入肉　｜｜｜搗爛先以帛
十日效　千金方　襯傷處傅之頻看若
刺出即拔去恐努出好肉或加｜｜｜仁
白梅肉同研更妙　衛生易簡　魚骨鯁　研爛入百
藥煎研丸彈子大井　｜｜｜五十粒研膏
花水化下半丸即下　惡犬咬傷　先以鹽水洗咬處乃
貼此膏　小兒丹瘤　｜｜｜五枚研入麪一匙
見袖珍方　塗之甚效　修真秘旨

希雍曰病人元氣虚弱者禁用

鴻臯曰王樞丹中用之見山慈姑下

續隨子 又名千金子 開寶 千兩金 日華 菩薩豆 同上

拒冬 開寶 聯步

集解 志曰———生蜀郡處處有之苗如大戟 頌曰今南中多有北土産少苗如大戟初生一莖莖端生葉葉中復出葉花亦類大戟自葉中抽幹而生實青有殼人家園中多種以為飾秋種冬長春秀秋實 時珍曰莖中亦有白汁可結水銀

辛温有毒治婦人血結月閉瘀血癥瘕疾癖除蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下悪物滯物 開寶 積聚痰飲不下食嘔逆及腹内諸疾碎研酒服不過三粒當下悪物 蜀本 宣一切宿滯治肺氣水氣日服十粒瀉多以酸漿水或薄醋粥吃即止又塗疥癬瘡 大明

時珍曰去殼取色白者
以紙壓去油取霜用

發明 頌曰｜｜｜下水最速然有毒損人不可過多
時珍曰｜｜｜與大戟澤漆甘遂葶藶相似主
治亦同其功皆長於利水惟
在用之得法亦皆要藥也

方 小便不通 臍腹脹痛不可忍諸藥不效者不過
再服｜｜｜去皮二兩鉛丹半兩蜜
搗作團瓶盛埋陰處臘月至春末取出研蜜丸梧子
大每服二三十丸木通湯下化破尤妙急用亦可旋
合 聖
濟總錄 水氣腫脹 一兩去殼研壓去油重研分
作七服每治一人用一服丈夫酒
下婦人荊芥湯下五更服之當下利至曉自止後
陽
以厚朴湯補之忌鹽醋百日乃不復作 斗門
水腫脹｜｜｜炒去油二兩大黄一兩為末水
丸綠豆大每白湯下五十丸 摘元方

狼毒

集解〔別録曰〕｜｜生秦亭山谷及奉高陳而沉水者良〔弘景曰〕宕昌亦出之或言止有數畝地生蝮蛇食其根故為難得亦用太山者今用者出漢中及建平云與防葵同根但沉水者是｜｜浮者是防葵俗用亦稀為療腹内要藥耳〔恭曰〕今出秦州成州秦亭原在二州之界此物與防葵都不同類生處又別太山漢中亦不聞有陶説謬矣〔志曰〕｜｜葉似商陸及大黄莖葉上有毛根皮黄肉白以實重者良輕虚者劣秦亭在隴西奉高是太山下縣陶云沉者是｜｜浮者是防葵此不足為信假使防葵秋冬采者堅實見水皆沉｜｜春夏采者輕虚得水亦浮且二物全別不可比類此與麻黄橘皮半夏吳茱萸為六陳也〔保昇曰〕根似元参虚浮者劣〔頌曰〕今陝西州郡及遼石州亦有之狀如馬志所説〔時珍曰〕｜｜出秦晋地今人往〻以草䕡茹為之誤矣説見䕡茹

根辛平有大毒〔大明曰〕苦辛 治欬逆上氣破積聚飲食寒

熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸本經除

胸下積僻別錄治痰飲癥瘕殺鼠大明合野葛納耳中治

聾抱朴子

之才曰大豆為之使宜醋炒

惡麥句薑畏占斯蜜陀僧

方

心腹連痛作脹用一一二兩附子半兩擣篩蜜丸梧子大一日服一丸二日二丸三日三丸止又從一丸起至三丸止以瘥為度　肘後

九種心痛一蟲二疰三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等症九痛丸用一一炙香吳茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各一兩附子炮去皮三兩為末蜜丸桐子大每空心溫酒下一丸　和劑局方

腹中冷痛水穀陰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食用一一三兩附子一兩旋

覆花三兩搗末蜜丸梧子大每服丸縮入三丸食前白湯下日三服　肘後

陰疝欲死腹急痛欲死狼毒四兩防風二兩附子三兩燒以蜜丸梧子大每服三丸日夜三度白湯下　肘後方

兩脇氣結方同腹中冷痛方

一切蟲病｜｜末一錢餳一皂子大沙糖少許水化開臥時空腹服之次早蟲下　集效

乾濕蟲疥｜｜搗爛以猪油馬油調搽方睡勿以被蒙頭臥恐藥氣傷面也　藺氏經驗方

積年乾癬搽之黃水出｜｜末塗之　聖惠

惡疾風瘡｜｜秦艽等分為末每服方寸匕溫酒下日一二服　千金

積年疥癩｜｜一兩半生半炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化為末以清油浸藥高一寸三日待藥沉油清遇夜不見灯火蘸油塗瘡上仍以口鼻於藥盞上吸藥氣取效　永類鈐方

防葵

又名房苑 別錄 梨蓋 本經 利茹 吳普

集解〔恭曰〕根葉似葵花子根香味似防風故名丨
丨此物亦稀有襄　楚山東及興州西方有
之興州者勝〔頌曰〕今惟出襄陽地他郡不聞也葉
似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花
如葱花景天輩而色白六月開花即結子根似防
風香味亦如之依時采者乃沉水今多用枯朽狼
毒當之誤矣〔時珍曰〕唐時隴西成州貢之蘓頌所
說詳明可據○〔弘景曰〕丨丨今用建平者本與狼
毒同根猶如三建其形亦相似但不沉水耳而狼
毒陳久者亦不沉水矣〔斅曰〕凡使丨丨勿誤用狼
毒真相似須審之恐誤人疾丨丨生葵州沙土中
采得二十日便生蚛用之惟輕為妙〔恭曰〕丨丨與
狼毒都不同類生處亦別〔藏器曰〕二物一是上品
一是下品形質又別陶氏以浮沉為別後人因而
用之將以丨丨破堅積為下品之物
與狼毒同功古今因循殊為謬誤

根辛寒無毒〔別録曰〕甘苦〔權曰〕有小毒 治疝瘕腸洩膀胱熱結溺

不下欬逆濕痞癲癇驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕

身（本經）療五臟虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪强志

中火者不可服令人恍惚見鬼（別録）久服主邪氣驚狂

（蘇恭）治痓癖氣塊膀胱宿水血氣疣大如盌者悉能消

散治鬼疰百邪鬼魅精怪通氣（甄權）

［斆曰］揀去蚌末甘草湯浸一宿暴乾

用黃精汁拌　土器中炒至汁乾用

發明［時珍曰］｜｜乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷

公扁鵲吳普皆言無毒獨別録言中火者服之

恍惚見鬼陳延之小品方云｜｜多服令人迷惑恍

惚如狂按難經云重陽者狂脫陽者見鬼是豈上品

養性者所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及

蘇恭所列者是｜｜功用而別録所列乃似｜｜之

防葵　木蠹子

二十八

常曰尚入外科

狼毒之功用非｜｜也狼毒之乱｜｜其来已遠不可不辨古方治蛇瘕鱉瘕大方中多用｜｜皆是狼毒也

木鼈子 又名木蠏

集解 志曰出朗州及南中 頌曰今湖廣諸州及杭越皆有之春生苗作藤生葉有五椏狀如山藥青色面光四月生黄花六月結子似栝樓而極大生青熟紅黄色肉上有軟刺每一實有核三四十枚其狀扁而如鼈嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食 宗奭曰｜｜子蔓歲一枯但根不死春旋生葉苗如葡萄其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻縛定及生去雄者方結實 時珍曰核形扁大如圍碁子仁青緑色去油者

仁甘温無毒 時珍曰苦微甘有小毒 治折傷消結腫悪瘡生肌

【希雍曰】為散血熱除癰毒之要藥夫結腫惡瘡痔痛乳癰等症皆血熱所致折傷則血亦瘀而發熱甘溫能通行經絡則血熱散而諸症愈矣其止腰痛者指濕熱客於下部所致而非腎虛為病之比也用者詳之

主治耳卒熱腫｜｜｜一兩赤小豆大黃各半兩為末每以少許生油調搽

止腰痛除粉刺䵟黷婦人乳癰肛門腫痛 開寶 醋磨消腫毒 大明 治痃積痞塊利大腸瀉痢痔疣瘰癧 時珍

發明 【機曰】按劉績霏雪錄云｜｜｜有毒不可食有人生二子恣食成痞其父得一方以｜｜｜煮猪肉食之其長子當夜死次子明日死因著以為戒 【時珍曰】南人取其嫩苗及實作蔬食無恙則其毒未應至此或者與猪肉不相得或犯他物而然不可盡咎｜｜｜也

方 陰疝偏墜痛甚者｜｜｜一箇醋磨調黃柏芙蓉末傅之即愈 壽域神方 久瘧有母｜｜｜穿山甲炙等分為末每服三錢空心酒下 摘要 腹中痞塊｜｜｜仁五兩獖猪腰子一付批開入藥在内 定煨熟搗爛入黃連細末三錢蒸餅丸綠豆大每服三十丸 醫方集 小兒疳疾｜｜｜仁使君子仁等分研泥米飲成丸芥子大每服五分米飲下 集效

木鼈子 番木鼈

二十九

肛門痔痛 孫氏秘寶方用｜｜｜仁三枚研如泥入百沸湯一盌乘熱先熏後洗日用三次仍塗少許○瀕湖集簡方用｜｜｜仁帶潤者雌雄各五枚乳細作七丸盌覆濕處勿令乾每以一丸唾化開貼痔上其痛卽止一夜一丸自消也嘗用此方治人屢有效驗

瘰癧經年 ｜｜｜二箇去油研以　子白和入瓶內安瓶中蒸熟食後食之每日一服半月後必效

小兒丹瘤 ｜｜｜仁研泥醋調塗之日三五上效 外科精義

風牙腫痛 ｜｜｜仁磨醋搽之 普濟

番木鱉 又名馬錢子 綱目

集解 時珍曰｜｜｜生回回國今西土卭州諸處皆有蔓生夏開黃花七八月結實如栝樓生青熟赤亦如木鱉其核小於木鱉而色白彼人言治百二十種病每證各有湯引或云以豆腐制過用之

良

東垣曰苦堅腎須日補下焦嗚皋曰觀其治痢及疝是肝腎二經藥也
昂曰入陽明二經血分大腸胃
嗚皋曰或云近藥肆中所市者皆防風根俟考察

仁苦寒無毒治傷寒熱病咽喉痹痛消瘡塊並含嚥汁或磨水嚥嚥能毒犬 時珍

方 喉痹作痛｜｜｜青木香山豆根等分為末吹之 醫方摘要 纏喉風｜｜仁一箇木香三分同磨水調熊胆三分胆礬五分以鵝毛掃患處取效 唐瑶經驗方

白頭翁

一名野丈人 本經 胡王使者 同上 奈何草 別錄

集解 弘景曰處處有之近根處有白茸狀似白頭老翁故名 恭曰葉似芍藥而大抽一莖莖頭開花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸許皆披下似纛頭正如白頭老翁故名陶言近根有白茸似不識也太常所貯蔓生者乃是女萎｜｜｜根似續斷而扁 保昇曰所在有之有細毛不滑澤花蕊黃二月采花四月采實八月采根 頌曰處處有之正月生苗作叢生狀似白微而柔細稍長葉

昂曰涼血

希雍曰本經味苦溫吳綬益以辛寒詳其所主似為得之東垣謂其氣厚味薄既能入血主血塵云氣味俱厚可升可降陰中陽也入手足陽明經血分暑伏足陽明經則發溫瘧伏手陽明經則病毒痢滯下純血狂易鼻衂者血熱也寒熱者血瘀也癥瘕積聚癭氣靡不由血凝而成金瘡血涼則痛自止苦能下泄辛能解散涼能除熱

生莖頭如杏葉上有細白毛而不滑澤近根處有白茸根紫色深如蔓菁其苗有風則靜無風自搖與天麻獨活同也陶註未述莖葉蘇恭言葉似芍藥實如鴉子白毛寸餘者誤矣 宗奭曰丨丨丨生河南洛陽界其新安山野中嘗見之正如蘇恭所說山中人賣丨丨丨丸言服之壽考不失古人命名之義陶氏所說失於不審宜其排叱也 機曰寇氏以蘇氏為是蘇頌以陶說為是大抵此物用根命名取像當以蘇頌圖經為准恭說恐別是一物也

根苦溫無毒 別錄曰有毒 吳綬曰苦辛寒 權曰甘苦有小毒 主治溫瘧狂易寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止腹痛療金瘡 本經 鼻衂 別錄 止毒痢 弘景 赤痢腹痛齒痛百節骨痛項下瘤癧 甄權 一切風氣暖腰膝明目消疣贅 大明

涼血殆散熱涼血行瘀之要藥歟
〔子接曰〕得秦皮連栢治厥陰熱痢

北京人謂之赤土音讀如恥包兒

〔權曰〕豚實爲之使〔大明曰〕得酒良花子莖葉同功

發明〔頌曰〕俗醫合補下藥甚驗〔杲曰〕氣厚味薄可升可降陰中陽也仲景治熱痢下重用丨丨丨湯主之蓋腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之男子陰疝偏墜小兒頭禿羶腥及鼻衄無此不效毒痢有此獲功〔緩曰〕毒痢紫血鮮血宜之

方 白頭翁湯治熱痢下重用丨丨丨二兩川連黃栢秦皮各三兩水七升煮二升每服一升婦人產後痢虛極者加甘草阿膠各二兩金匱玉函方

下痢咽痛 春夏病此宜丨丨丨川連各一兩木香二兩水五升煎一升半分三服聖惠

陰癩偏腫 丨丨丨根生搗敷當作瘡愈外臺

外痔 丨丨丨根搗敷逐血止痔易簡

小兒禿瘡 方同上肘後

王瓜 又名土瓜本經 老鴉瓜圖經 赤雹子衍義 野甜瓜綱目 師姑草土宿 馬𤬪瓜 公公鬚

昂曰通乳藥多用之
文曰經疏云能除濕熱〻毒略同栝樓但此則入血分諸病為多耳傷寒症發斑用〡〡根搗汁和伏龍肝末服之甚效

集解 弘景曰土瓜生蘿院間子熟時赤如彈丸鄭康成註月令王瓜生以為菝葜殊謬矣 恭曰葉似栝樓葉但無叉缺有細毛刺五月開黄花花下結實如彈丸生青熟赤根似葛而細北方者其子纍〻相連大如棗皮黄肉白苗子相似根狀不同若治黄疸破血南者大勝 宗奭曰〡〡其殼經寸長二寸許上微圓下尖長七八月熟時紅赤色殼中子如螳螂頭者今人謂之赤雹子其根即土瓜根也 時珍曰〡〡三月生苗其蔓多鬚嫩時可茹其葉圓如馬蹄而有尖面青背淡澀而不光六七月開五出小黄花成簇結子纍〻熟時有紅黄二色皮亦粗澀根不似葛但似栝樓根之小者江西人栽之沃土取根作蔬味如山藥

根苦寒 權曰平 藏器曰有小毒能吐下人

治消渴内痺瘀血月閉寒熱酸痛益氣愈聾 本經 療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留

血婦人帶下不通下乳汁止小便数不禁逐四肢骨
節中水治馬骨刺人瘡別錄天行熱疾酒黃病壯熱心
煩悶熱勞排膿撲損瘀血破癥癖落胎大明主蠱毒小
兒閃癖痞滿痰瘧并取根及葉擣汁少〻服當吐下
藏器利大小便治面黑面瘡時珍

方 小兒發黃||根生擣汁三合與服不過三次蘓頌圖經 黃疸變黑醫不能治用||根汁平旦溫服一小升午後黃水嘗從小便出不出再服 小便如泔乃腎虛也||散用||根一兩白石脂二兩兔絲子酒浸二兩桂心一兩牡蠣粉一兩為末服二錢大麥粥飲下衛生寶鑑 乳汁不下||根為末酒服一錢日三楊氏產乳 經水不利

王瓜 三十二

帶下少腹滿或一月再見者丨丨根散主之丨丨根
芍藥桂枝䗪虫各三兩為末酒服方寸匕日三仲
師金匱方婦人陰癩方同上一切漏疾丨丨根搗傳千金面上靤瘖
丨丨根搗末漿水和匀入夜別以漿水洗面塗藥旦
復洗之百日光彩射人夫妻不相識也極效見肘
後
方
子酸苦平生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐血腸
風瀉血赤白痢大明主蠱毒甄權反胃吐食時珍
方消渴飲水雹爪去皮每食後嚼三兩枚五七度瘥聖惠方傳尸勞瘵
王爪焙為末每酒服一錢十藥神書反胃吐食馬雹兒灯上燒存性一錢入好棗內平胃
散末二錢酒服食即可下丹溪算要痰疾頭風懸栝樓一箇赤雹子七箇焙大力子四兩

時珍曰陽明衝任之藥　昂曰陽明多氣多血

焙為末每食後或茶或酒服三錢忌動風發熱之物

筋骨攣痛 馬藺子炒開口為末酒下一錢日二服 集簡

赤目澀痛 不可忍小圓瓜蔞籬上大如彈丸紅色皮上有刺者九月十月采日乾槐花炒赤芍藥等分為末每服二錢臨卧溫酒下 衛生家寶方

瘀血作痛 赤雹兒燒存性為末好酒空心服二錢 集簡

大腸下血 王瓜一兩燒存性地黃二兩黃連半兩為末蜜丸梧子大米飲下三十丸 指南方

王不留行

又名禁宮花 日華 剪金花 日華 金盞銀臺

集解 弘景曰今處處有之葉似酸漿子似菘子人言是蓼子不爾多入癰瘻方用 保昇曰所在有之葉似菘藍花紅白色子殼似酸漿其中實圓黑似菘子大如黍米根苗花子並用 頌曰今江浙並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸根黃色如薺根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃

希雍曰其氣溫而無毒苦能泄辛能散甘入血溫能行故主金瘡止血逐痛除風痺內寒及癰疽産難等症入血活血之要藥也若夫心煩鼻衄應是血分熱病非同涼血藥用未見其可也入足厥陰經

又曰孕婦忌之

介賓曰味苦性平乃陽明衝任血海之藥也治風毒通血脉痺經産下乳利小便除風濕痺痛及衄血瘡疽風疹等症

子接曰功專通血脉療瘡瘍

紫葉隨莖而生如菘子狀又似猪藍花俗謂之剪金草河北生者葉圓花紅與此小別時珍曰多生麥地中苗高者一二尺三四月開小花如鈴鐸狀紅白色結實如灯籠草子殼有五稜殼內包一實大如豆實內細子大如菘子生白熟黑正圓如細珠可愛陶氏言葉似酸漿蘇氏言花如菘子狀者皆欠審以子為花葉狀也灯籠草即酸漿苗子皆入藥

苗子苦平 元素曰甘苦 治金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳癰婦人産難久服輕身 別錄 治風毒通血脉 甄權 遊風風疹婦人經血不勻發背 日華 下乳汁 元素 利小便出竹木刺 時珍 蒸熟漿水浸焙用

發明 元素曰｜｜｜｜下乳引導用之取其利血脉也 時珍曰｜｜｜｜能走血分乃陽明衝任之

希雍曰同漏芦貝母山甲青皮没藥山慈
姑山豆根栝樓根治乳癰乳岩　同山甲

藥俗有穿山甲王不留婦人服之乳常流之語可見
其性行而不住也按王執中資生經云一婦人患淋
卧久諸藥不效其夫夜告予〻按既效方治諸淋用
剪金花十餘葉煎湯遂令服之明早來云病減八分
矣再服而愈剪金花即｜｜｜｜是也頌曰張仲景
師治金瘡有｜｜｜｜散貞元廣利方治諸風痓有
｜｜｜｜
湯皆最效

方　鼻衄不止　｜｜｜｜連莖葉陰乾煎濃汁温服立效　指南

産後下血　｜｜｜｜末水服一錢　聖濟

金瘡亡血　｜｜｜｜散治身被刀斧傷亡血用｜｜｜｜十分
八月八日採蒴藋細葉十分七月七日採桑東南根
白皮十分八月三日采川椒三分甘草十分黄芩乾
薑芍藥厚朴各二分以前三味燒存性後六味為散
合之大瘡飲服方寸匕小瘡但粉之　金匱要略方

婦人乳少　因氣鬱者湧泉散｜｜｜｜穿山甲炮龍
骨瞿麥穗麥冬等分為細末每服一錢酒

王不留行　葵　三十四

白芷通草豬蹄煮服下乳汁

調下後食豬蹄湯仍以木梳梳乳日三 衛生寶鑑

頭風白屑 丨丨丨香白芷等分為末乾摻一夜篦去 聖惠

癧瘍惡瘡 丨丨丨湯治癧瘍黯乳月蝕白禿及面上久瘡去虫止痛用丨丨丨東南桃枝東引茱萸根皮各五兩蛇床子牡荊子苦竹葉蒺藜子各三升大麻子一升以水二斗半煮一斗頻洗 千金

丁腫初起 丨丨丨子為末蟾酥丸黍米大每服一丸酒下汗出即愈 集簡方

誤吞鐵石骨刺 不下危急者丨丨丨黃柏等分為末湯浸蒸餅丸彈子大青黛為衣線穿懸風處每用一丸冷水化服 百一

葵

〔弘景曰〕以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵春葵子不堪入藥 又名露葵 綱目 滑菜

集解 〔恭曰〕此即常食之葵也〔頌曰〕苗葉作菜茹甚甘美冬葵子古方入藥最多又有蜀葵錦葵黃葵終葵菟葵皆有功用〔時珍曰〕葵菜古人種為常食今之種者頗少有紫莖白莖二種以白莖為

勝大葉小花〻紫黄色其最小者名鴨脚葵其實大如指頂皮薄而扁實内子輕虛如榆莢仁四五月種者可留子六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵經年收採正月復種者為春葵然宿根至春又生

苗甘寒滑其心傷人別録 脾之菜也宜脾利胃氣滑大腸思邈 宜導積滯妊婦食之胎滑易生蘇頌 煮汁服利小腸治時行黄病乾葉為末及燒灰服治金瘡出血甄權 除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒熱毒下痢丹毒並宜食之汪穎 服丹石人宜食孟詵 潤燥利竅功與子同

葵 三十五

時珍曰食葵須用蒜無蒜勿食凡被犬咬者永不可
食〻之即發能伏硫黃頌曰作菜茹食甚美但性滑
利不益人詵曰其性雖冷若熱食之令人熱悶動風
氣四月食之發宿疾天行病後食之令人失明霜葵
生食動五種留飲吐水凡服百藥忌食其心心有毒
也黃背紫莖者勿食之不可合鯉魚　黍米食〻之
害
人

發明 張從正曰凡久病大便澁滯者宜食葵菜自然
通利乃滑以養竅也時珍曰按唐王燾外臺秘
要云天行斑瘡須臾遍身皆帶白漿此惡毒氣也高
宗永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉
以蒜齏啖之則止又聖惠方亦云小兒發斑用生葵
菜葉絞汁少〻與服散惡毒氣按此即今痘瘡也今
治法惟恐大便頻洩傷其元氣痘不起發而昔人用
葵菜滑竅以利二便豈古今運氣不同治法亦異歟

方 天行斑瘡 見發明 肉錐怪疾 有人手足忽生倒生肉刺如錐痛不可忍

者但食葵菜即愈見夏子益怪症奇方

諸癭不合 先以泔清温洗拭淨取葵葉微火烘暖貼之不過二三百葉引膿盡即㕘生忌猪魚蒜房事必效

湯火傷瘡 搗傳之食物本草

丹石發動 口乾欬嗽者搗汁服一盞便臥少時食療

根甘寒治惡瘡癢淋利小便解蜀椒毒別錄 小兒吞錢不出煮汁飲之神妙甄權 治疳瘡出黃汁孟詵 利竅滑胎止消渴散惡毒氣時珍

方

二便不通 脹急者生冬葵根二斤搗汁三合生薑四兩取汁一合和勻分服連用即通也

消中尿多 日夜七八升冬葵根五斤煮汁平旦服二升外臺

漏胎下血 血盡子死葵根莖燒灰酒服方寸匕千金

瘭疽惡瘡 內中忽生一黶子大如豆粟或如梅李或

葵 冬葵子

三十六

赤或黑或白或青其黶有核〻有深根應心能爛筋骨毒入藏腑即殺人但飲葵根汁可折其熱毒姚僧坦集驗方

妬乳〻癰根莖及子為末酒服産寶

身面疳瘡出黃汁者根燒灰和猪脂塗之食療

口吻生瘡用經年葵根燒灰傅之外臺

冬葵子甘寒滑治五臟六腑寒熱羸瘦五癃利小便本經

治婦人乳內閉腫痛別錄

出癰疽頭孟洗

下丹石毒弘景

通大便消水氣滑胎治痢疾時珍

【時珍曰】黃芩為之使

發明【時珍曰】葵氣味俱薄淡滑為陽故能利竅通乳消腫滑胎也其根葉與子功用相同按陳自明婦人良方云乳婦氣脉壅閉乳汁不行及經絡凝滯奶房腫痛留蓄作癰毒者用丨丨丨炒香砂仁等分為末熱酒服二錢此藥滋氣脉通營衛行津液極驗乃上蔡張不愚方也

方大便不通十日至一月者肘後用｜｜｜三升
水四升煮一升服○聖惠用｜｜｜
為末人乳關格脹滿欲死者肘後用｜｜｜二升水
和服立通四升煮一升納猪脂一雞子大
頓服○千金用｜｜｜末猪血淋｜｜｜煮汁任娠
脂和丸桐子大每服五十丸任服千金
血淋｜｜｜一升水三升妊娠下血方同產後淋瀝
煮一升分服千金上
不通｜｜｜一合朴消八分水妊娠水腫身重小便
二升煎八合下消服集驗不利洒〻
惡寒起即頭眩用｜｜｜茯苓等分為散飲服方寸
匕日三小便利則愈轉脬者加髮灰神效金匱
生產困悶｜｜｜一合擣水煎頓服神倒生｜｜｜
效有人服此登廁兒撲廁中炒黃為
末酒服二錢神乳汁不通見發胎死腹中｜｜｜末
效昝殷產寶明酒服方寸
匕口噤者灌之胞衣不下｜｜｜一合牛膝
即甦千金一兩煎服千金血痢產
冬葵子蜀葵

三七

菝音
喬

痢｜｜｜每服二錢入臘茶二錢沸湯調下　聖惠　痎瘧邪熱｜｜｜陰乾為末酒服二錢良

聖惠方　瘑疽無頭孟詵曰三日後取｜｜｜二百粒水吞之當日即破也○經驗云吞一粒即破一頭吞二粒即破二頭　傷寒勞復｜｜｜二升梁米一升煮粥食取汗立安　聖惠方

蜀葵又名戎葵爾雅吳葵　葿爾雅

集解〔頌曰〕｜｜似葵花如木槿花有五色小花者名錦葵功更勝〔時珍曰〕｜｜處〻種之宿根嫩苗時亦可茹食葉似葵葉而大亦以絲瓜葉有岐义莖高五六尺花似木槿而大有深紅淺紅紫黑白色千葉單葉之異惟紅白二色入藥其實大如指頂皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁輕虛易種其楷剥皮可緝布作繩一種小者名錦葵即荆葵也爾雅謂之荍花大如五銖錢粉紅色有

紫僊文

苗甘微寒滑除客熱利腸胃 思邈 煮食治丹石發熱及熱毒下痢 藏器 滑竅治淋潤燥易産 時珍 搗塗火瘡燒研傅金瘡 大明

根莖治客熱利小便散膿血惡汁 藏器

發明 〔宗奭曰〕｜｜紅色単葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗也〔孫真人曰〕不可久食鈍人志性若被犬咬者食之永不瘥也〔李廷飛曰〕合猪肉食令人無顏色

方 淋痛｜｜根洗剉水煎五七沸服如神 寳鑑

血淋｜｜根二錢車前子一錢煮日服 簡便単方

腸胃生癰 懐忠丹治内癰有敗血腥穢殊甚臍腹冷痛用此排膿下血単葉紅

蜀葵 三十八

紅丨丨根白芷各一兩白枯礬白芍各五錢為末黃蠟溶化和丸梧子大空心米飲下二十丸膿血出盡補以十宣散 坦仙

諸瘡腫痛不可忍者丨丨根去黑皮搗爛井華水調貼 普濟

花鹹寒 禹錫曰 甘冷 理心氣不足 別錄 小兒風疹疥瘡 嘉祐 治帶下目中溜火和血潤燥通竅利大小腸 時珍

發明 元素曰 丨丨花赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥皆取其寒滑潤利之功紫者入烏鬚藥用

方 二便關格 脹悶欲死丨丨花一兩搗爛入射香半錢水煎服

痎瘧邪熱 丨丨花白者陰乾為末服之午日取花挼手亦能去瘧 圖經本草

婦人帶下 臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困丨丨花一兩陰乾為末溫酒服二錢赤帶用赤白帶用白 聖惠方

嗚皐曰即今俗名秋葵者是也

子甘冷治淋澀通小腸催生下胎療水腫及一切瘡疥並瘢疵赤靨大明

發明 時珍曰按楊士瀛直指方云——子炒入宣毒藥中最驗又催生方用子二錢滑石三錢為末順流水服五錢即下

方 石淋 端午日取葵子炒研酒下一錢當下石出 聖惠 癰疽無頭 用子為末水調傅 經驗後方

黃蜀葵花

集解 時珍曰黃葵葉如蓖麻葉深綠色開岐丫有五尖如人爪形旁有小尖六月開花大如碗鵞黃色紫心六瓣而側旦開午收暮落人亦呼為側金盞花結角大如拇指長二寸許本大末尖六

棱有毛老則黑色其稜自綻內有六房如芝麻房其子累〻在房內狀如茼麻子色黑其莖長者六七尺剝皮可作繩索〔又曰〕｜｜｜｜別是一種自宜入草部而嘉祐本草與蜀葵同入菜部為其同名葵而氣味

主治亦同也

甘寒滑治小便淋及催生治諸惡瘡膿水久不瘥末傳即愈為瘡家聖藥 嘉祐 消瘡腫浸油塗湯火傷 時珍

方 沙淋石淋｜｜｜｜一兩炒為末米飲服一錢名獨聖散 普濟 催生 花焙研末湯服二錢 瘡疽腫毒｜｜｜｜用鹽擦收甆器中密封經年不壞每用敷之自平自潰無花用根葉 直指方 小兒口瘡｜｜｜｜焙末敷之 肘後 湯火傷 以瓶盛麻油入花浸之密封遇有傷者塗之神效 經驗 小兒禿瘡｜｜｜｜大黃〻芩等分

為末米泔洗淨香油調搽　普濟方

子及根甘寒滑療癰腫利小便治五淋水腫産難通乳汁　時珍

發明　頌曰冬葵蜀葵黃葵形狀雖不同而性俱寒滑故所主療不甚相遠　時珍曰黃葵子古方少用今為催生及利小便要藥湯散皆宜蓋其性滑與冬葵子同功故也花子根性功相同可互用

方　産難催生　寇氏曰以四十九粒研末溫水服即産○經驗用子焙研三錢井華水服無子用根煎服亦可　便癰初起　黃蜀葵子七〻粒皂角半挺為末石灰同醋調塗　永類　癰腫不破　黃葵子研酒服一粒則出一頭神效　易簡　撲打傷　葵子研酒服二錢　見海上方

菟葵 又名紫背天葵 炮炙論 天葵 圖經 莃 雷丸

草 外丹本草

集解 〔恭曰〕丨丨苗似石龍芮而葉光澤花白似梅其莖紫黑煑噉極滑所在下澤田間皆有〔禹錫曰〕郭璞註爾雅云丨丨似葵而小葉狀如藜有毛灼之可食而滑〔宗奭曰〕丨丨綠葉如黄蜀葵其花似拒霜甚雅其形至小如初開单葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黄其葉則蜀葵也唐劉夢得所謂菟葵燕麥動揺春風者是也〔時珍曰〕按鄭樵通志云丨丨天葵也狀如葵菜葉大如錢而厚面青背微紫生於崖石凡丹石之類得此而後能神所以雷公炮炙論云如要形堅豈忘紫背謂其能堅鉛也此說得於天台一僧又按南宮促岣嶁神書云紫背天葵出蜀中靈草也生於水際取自然汁煮汞則堅亦能煑八石拒火也

苗 甘寒下諸石五淋治虎蛇毒諸瘡擣汁飲之塗瘡

能鮮毒止痛唐本

酸漿

又名醋漿本經燈籠草唐本皮弁草食療苦葴音針爾雅苦耽嘉祐天泡草綱目王母珠嘉祐洛神珠同上。小者名苦蘵郭璞

集解〔弘景曰〕處處有之苗似水茄而小葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃紅色小兒食之〔時珍曰〕楊慎危言云本草燈籠草苦耽丨丨皆一物也燕京野果名紅姑娘外垂絳囊中含赤子如珠酸甘可食盈盈繞砌與翠草同芳亦自可愛〔又曰〕龍葵丨丨一類二種也丨丨苦蘵一種二物也但大者為丨丨小者為苦蘵耳敗醬亦名苦職與此不同其龍葵酸漿苗葉一樣但龍葵莖光無毛五月入秋開小白花五出黃蕊結子無殼纍纍數顆同枝子有蔕蓋生青熟紫黑其丨丨同時開小花黃白色紫心白蕋其花如杯狀無瓣但有五尖結一鈴鐸殼凡五稜一枝一顆下懸如燈籠

之狀殼中一子狀如龍葵子生青熟紅以此分別便自明白

苗葉莖根苦寒無毒〔禹錫曰〕有小毒〔恭曰〕苦大寒無毒　治熱煩滿定志益氣利水道〔本經〕擣汁服治黃病多效〔弘景〕治上氣欬嗽風熱明目根莖花實並宜〔唐本〕苗子治傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱欬嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒無辜癧子寒熱大腹殺虫落胎去蠱毒並煮汁飲亦生擣汁服研膏傅小兒閃癖〔嘉祐〕

發明〔震亨曰〕燈籠草苦能除濕熱輕能治上焦故主熱欬咽痛此草治熱痰咳嗽佛耳草治寒痰咳

𣪊名金燈𣪊輕虛入肺治肺熱咳嗽極妙

嗽也與片芩清金丸同用更效時珍曰ー丨利濕除熱除熱故清肺治咳利濕故能化痰治疸一人病虛乏咳嗽有痰遇以此加入湯中用之有效

方 熱嗽咽痛 灯籠草為末白湯服名清心丸 喉瘡仍以醋調傳喉外 丹溪纂要

作痛 灯龍草炒焦研末酒調呷之 醫學正傳

子酸平別錄曰寒治熱煩定志益氣利水道治產難吞之立產別錄食之除熱治黃病尤益小兒蘓頌治骨蒸勞熱尸疰痟瘦痰癖熱結與苗莖同功嘉祐

方 酸漿實丸 治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產用ー丨實五兩莧實三兩馬藺子炒二兩榆白皮炒二兩柴胡黃芩栝樓根藺茹各一兩為末煉蜜丸梧子大每服三十丸木香湯下 聖濟

時珍曰手足陽明胃大腸厥陰肝心包藥

天泡濕瘡 天泡草鈴兒生搗傅之亦可爲末香油調傅之 鄧才筆峰雜興方

敗醬 又名苦菜綱目苦蘵同上澤敗別錄鹿腸本經鹿首別錄馬草同上

集解 弘景曰出近道葉似稀薟根形如柴胡根作陳敗豆醬氣故以爲名 恭曰不出近道多生岡嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似狶薟也 頌曰江東亦有之狀如蘇恭所說 時珍曰處處原野有之俗名苦菜野人食之春初生苗深冬始凋初時葉布地生似菘菜葉而狹長有鋸齒綠色面深背淺夏秋莖高二三尺而柔弱數寸一節節間生葉四散如繖顛頂開白花成簇如芹花蛇床子花狀結小實成簇其根白紫頗似柴胡吳普言根似桔梗陳自明言根似蛇莓根者皆不然

根苗苦平 別錄曰酸微寒 權曰辛苦大明曰酸 時珍曰微苦帶甘 **治暴熱火瘡**

赤氣疥癢疽痔馬鞍熱氣本經除癰腫浮腫結熱風痺不足產後痛別錄治毒氣瘰痺破多年凝血能化膿為水產後諸病止腹痛餘瘀煩渴甄權治血氣心腹痛破癥結催生落胎血運鼻衄吐血赤白帶下赤眼障瞙努肉聤耳瘡癤疥癬丹毒排膿補漏大明

發明 時珍曰｜｜乃手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治癰及古方婦人科皆用之乃易得之物而後人不知用蓋未遇識者耳

方 腹癰有膿 苡仁附子｜｜湯用苡仁十分附子二分｜｜五分擣為末每以方寸匕水二升煎一升頓服小便當下即愈 金匱玉函

產後惡露 ｜當歸各六分

敗醬 白鮮皮

〔時珍曰〕入足太陰陽明脾胃兼入手太陰陽明經肺大腸〔昂曰〕兼入膀胱小腸

續斷芎藥各八分芎藭竹茹各四分生地黃炒十二分水二升煮取八合空心服 外臺 產後腰痛 乃血氣流入腰腿痛不可轉者｜｜當歸各八分芎藭芍藥各六分水二升煮至八合分二服忌蔥 廣濟方 產後腹痛 如錐刺者｜｜五兩水四升煮二升每服二合日三服良 衛生易簡方

蠼螋尿瘡 遶腰者｜｜汁塗 楊氏產乳

白鮮皮 又名白羶 弘景 白羊鮮同上 地羊鮮 圖經 金雀兒椒 日華 時珍曰根白色作羊羶氣子纍〻如椒故名

集解〔弘景曰〕近道處〻有之以蜀中者為良〔恭曰〕其葉似茱萸高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月采四五月采便虛惡矣〔頌曰〕今河中江寧府滁州潤州皆有苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開淡紫花似小蜀葵花根似小蔓菁皮黃白而心實

〔昂曰〕女子陰中腫痛皆濕熱乘虛客於腎
及膀胱所致
〔希雍曰〕苦能泄熱寒能除熱故主頭風有
火証性寒而燥能除濕熱故主五疸欬逆
者實火上冲也得寒而散則欬逆止矣濕
痺死肌不可屈伸者地之濕氣害人皮肉
筋脉也脾主四肢惡濕喜燥今為濕邪所
干故四肢不安也時行腹中大熱飲水大
呼欲走者邪熱盛也小兒驚癇熱生風也
散濕除熱蔑不濟矣産後餘痛原是血虛
而熱非所宜也〔又曰〕下部虛寒者雖有濕
症勿用〔又曰〕得牛膝石斛苡仁黃柏蒼
术治足弱頑痺去下部濕熱多加銀花佐
以漢防己治下部一切濕瘡〔中梓曰〕多
服損中氣
〔昂曰〕行水故性燥
〔介賓曰〕治毒風ゝ瘡癬疥赤爛亦治楊梅

根皮苦寒〔別錄曰〕鹹 治頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫
痛濕痺死肌不可屈伸起止行步 本經 療四肢不安時
行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人産後餘
痛 別錄 治一切熱毒風ゝ瘡疥癬赤爛眉髮脫脆
皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃 甄權 通
關節利九竅及血脉通小腸水氣天行時疾頭痛眼
疼其花同功 大明 治肺嗽 蘓頌
〔之才曰〕惡螵蛸桔
梗茯苓草蘚等藥
發明〔時珍曰〕｜｜｜氣寒善行味苦性燥足太陰陽
明經去濕熱藥也兼入手太陰陽明為諸黃風
白鮮皮 草蘚

惡毒眉髮脫落此雖善理瘡瘍而實為諸黃、麻痺要藥

［子接曰］鼠瘻已破服之最效

［嗚呆曰］頭風自是因風仲淳謂｜｜｜主頭風有火証者則芩連石膏亦主陽明頭痛何以不云治風乎觀其能通關節利九竅血脉不僅以散濕除熱為用實有去風之功故能兼主欬逆肺嗽濕痹驚癇產後中風及壯熱惡寒等症也

［時珍曰］足陽明厥陰胃肝經藥

［恭曰］｜｜根細長淺白菝葜根作塊赤黃

痹要藥也世醫止知施之瘡科淺矣

方 鼠瘻已破出膿血者｜｜｜煑汁服一升當吐若鼠子也肘後 產後中風人虛不可服他藥者一味｜｜｜湯用新汲水三升煑一升溫服 陳延之小品方

萆薢 又名赤節別錄百枝吳普竹木炮炙論白菝葜

［時珍曰］時人呼為白菝葜象形也赤節百枝與狗脊同名

集解 ［弘景曰］根似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺［恭曰］此有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟〻者為勝蔓生葉似薯蕷［頌曰］今河陝汴東荊蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉俱青葉作三叉似山薯又有綠豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者根黃白色多節大三指許春秋采根晒乾今成德軍所產根亦如山薯而體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜采根切片晒乾用［時珍曰］

丨丨蔓生葉似菝葜而大如盌其根長硬大者如
簡陸而堅今人以土茯苓為丨丨誤矣莖葉根苗
皆不同吴普以丨丨為狗脊
亦誤矣宋以懷慶丨丨充貢

根苦平別錄曰甘治腰脊痛强骨節去風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣本經傷中恚怒陰痿失溺老人五緩關節老血別錄冷風𤸷痺腰脚癱緩不遂手足驚掣男子腰痛久冷腎間有膀胱宿水甄權頭旋癎疾補水臟堅筋骨去風之功益精明目中風失音大明補肝虛好古治白濁莖中痛痔漏壞瘡時珍

之才曰薏苡為之使畏葵根大黄柴胡前胡

希雍曰味苦甘平入足陽明少陰厥陰為祛風除濕補益下元之要藥故主腰背痛强骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣陰痿失溺關節老血老人五緩正以苦能燥濕甘入脾而益血故悉主之又主冷風𤸷痺癱緩不遂男子腰痛久冷腎間有濕膀胱宿水日華子主頭旋癎疾補水臟堅筋骨益精明目中風失音海藏主肝虛李氏治白濁莖中痛痔漏壞瘡以上諸症無非陽明濕熱流入下焦客于肝腎所致此藥袪陽明濕熱以固下焦故能去濁分清而療下元虛冷濕邪為病也

又曰丨丨本除風濕若下部無濕陰虛火熾以致溺有餘瀝莖中痛此真陰不足之候也無濕腎虛腰痛並不宜用

不肎曰丨丨能溫腎去濕但性味緩用宜

萆薢

大劑
〔中梓曰〕苦平胃與肝藥也搜風去濕補腎强筋
〔又曰〕入肝搜風故能理風除筋之病入胃去濕故能理濁除瘡之病古人或稱其攝溺之功或稱其逐水之效何二說相懸耶不知腎藏之本在腎〻氣强旺則收拜而妄水無容藏之地且善清胃家濕熱故能去濁分清也楊氏丨丨分清飲正合此意
〔仲淳曰〕得牛膝木瓜苡仁黃柏骨碎補續斷杜仲石斛地黃狗脊治腰脊痛强骨節加术菖蒲茯苓治周痺　同黃芪生地金銀花皂角刺皂角子牛膝木瓜石斛苡仁海風藤白僵蚕胡麻治惡瘡久不瘳　同蓮子茯苓車前子木通澤瀉牛膝黃柏甘草可分清除濕

發明

〔時珍曰〕丨丨足陽明厥陰經藥也厥陰主筋屬風陽明主肉屬濕丨丨之功長於去風濕所以能治緩弱痿痺遺濁惡瘡諸病之屬風濕者丨丨萆薢土茯苓三物形雖不同而主治之功不相遠豈一物数種乎炮炙論云囊皺漩多夜煎竹木即丨丨也漩多白濁皆是濕氣下流丨丨能除陽明之濕而固下焦故能去濁分清楊倓家藏方治真元不足下焦虛寒小便頻數白濁如膏有丨丨分清飲正此意也楊子健萬全護命方云凡人小便頻数不計度數便時莖內痛不可忍者此疾必先大腑秘熱不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚則渾身熱心燥想凉水如此即重症也此疾本因貪酒色積有餘毒腐物瘀血之類隨虛水入於小腸故便時作痛也不飲酒者必平時過食辛熱葷膩之物又因色傷而然此乃小便頻數而痛與淋症澁而痛者不同也宜用丨丨一兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽為末每服二錢水一盞煎八分和渣服之使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則小便数及痛自減也

方

腰脚痹軟 行履不穩者｜｜二十四分杜仲八分搗篩每旦溫酒服三錢匕禁牛肉 唐德宗貞元廣利方

小便頻數 川｜｜一斤為末酒丸梧子大鹽湯下七十丸 摘元

白濁頻數 漩面如油澄下如膏乃真元不足下焦虛寒｜｜｜分清飲｜｜石菖蒲益智仁烏藥等分每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分服

腸風痔瘻 如聖散｜｜｜貫衆去土等分為末每服三錢酒下 見孫氏秘寶方

菝葜 又名菝葀同葜金剛根日華鉄菱角綱目王瓜草日華

時珍曰莖蔓堅强短小故名金剛根堅有尖刺故名鉄菱角鄭氏通志云其葉頗近土瓜故名王瓜草

集解 頌曰近道及江浙州郡皆有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉而差大秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作塊人呼金剛根

時珍曰山野中甚多其莖似蔓而堅强植生有刺

時珍曰｜｜陽明胃本藥

其葉團大狀如馬蹄光澤似柿葉不似冬青秋開
黃花結紅子根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸濇
野人采其根葉入
染家用名鉄菱角
根甘酸平温治腰背寒痛風痺益血氣止小便利別錄
治時疾瘟瘴大明補肝經風虛好古治消渴肝崩下痢時珍
發明時珍曰｜｜足少陰厥陰藥氣温味酸性濇而
收孫真人元旦辟邪屠蘇酒中亦用之頌曰取
根浸赤汁煮
粉食能辟瘴

土茯苓又名土萆薢綱目山猪糞同上仙遺粮同上
冷飯團同上硬飯同上山地栗同上刺猪苓
圖經草禹餘粮
拾遺過山龍
集解藏器曰根如盞連綴半在土上皮如茯苓肉
赤味濇人取以當穀食不飢時珍曰｜｜

介賓曰療癰腫喉痺除周身寒濕惡瘡

土茯苓

忌茶茗

時珍曰

瘡癰腫解汞粉銀朱毒 時珍

脾胃强筋骨去風濕利關節止泄瀉治拘攣骨痛惡

根甘淡平食之當穀不飢調中止洩健行不睡 藏器 健

其類也

相近亦

薢及菝葜然根苗迥不相同宜參考之但功亦頗

始知用此遂為要藥諸醫無從考証往往指為萆

梅瘡甚行率用輕粉藥取效毒留筋骨潰爛終身

入藥用白者良昔人不知用近時弘治正德間楊

者離尺許近或數寸其肉軟可生啖有赤白二種

其根狀如菝葜而圓其大如鷄鴨子連綴而生遠

狀頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸

楚蜀山箐中甚多蔓生如蓴莖有細點其葉不對

四十七

發明〔機曰〕楊梅毒瘡藥用輕粉愈而復發久則肢體拘攣變為癰漏竟致癈篤惟判｜｜｜或加皂角牽牛各一錢水六盞煎三盞分三服不數劑多瘥蓋此疾多由毒氣干於陽明而發加以輕粉燥烈久而水衰肝挾相火來凌脾土〻屬濕主肌肉濕熱蓄欝於肌腠故發為癰腫甚則拘攣內經所謂濕氣害人皮肉筋骨是也｜｜｜甘淡而平能去脾濕〻去則營衛從而筋脉柔肌肉實而拘攣癰漏愈矣初病服之不效者火盛而濕未欝也此藥長於去濕不能去熱病久則熱衰氣耗而濕欝為多故也〔時珍曰〕楊梅瘡古無此病近起於嶺表傳及四方蓋男女淫猥濕熱之邪積畜既深發為瘡毒遂致互相傳染其類有數種治之則一也其證多屬厥陰陽明二經而兼乎他經邪之所在則先發出如兼少陰太陰則發於咽喉兼太陽少陽則發於頭耳之類蓋相火寄於厥陰肌肉屬於陽明故也醫用輕粉銀朱刼劑五七日即愈蓋水銀性走而不守加以鹽礬升為輕粉銀朱其性燥烈善逐痰涎〻乃脾之液此物入胃氣歸陽

明故涎被劫隨火上升從喉頰齒縫而出故瘡即乾
瘥而愈若服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡
筋骨間莫之能出痰涎既去血液耗涸筋失所養營
衛不從變為筋骨拘攣疼痛發為癰毒疳漏久則生
蟲為癬手足　裂遂成廢痼惟｜｜氣平味甘淡
為陽明本藥能健脾胃去風濕脾胃健則營衛從風
濕去則筋骨利故諸症多愈此亦得古人未言之妙
也今醫家有搜風解毒湯治楊梅病深者月餘淺者
半月即愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服
之亦效其方用｜｜｜一兩苡仁金銀花防風木瓜
木通白蘚皮各五分皂莢子四分氣虛加人參七分
血虛加當歸七分水二大盞煎飲一日三服惟忌飲
茶及牛羊雞鵝魚肉燒
酒發麵房事蓋秘方也

方　楊梅毒瘡　筆峯雜興用｜｜｜四兩皂角子七
箇水煎代茶淺者二七深者四七見
效○一方｜｜｜一兩五加皮皂莢子苦
參各三錢金銀花一錢好酒煎日一服　骨攣癰漏

土茯苓　白歛

鄭奠一曰赤斂能治溫瘧血痢腸風痔漏赤白帶下

昂曰苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣

服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成瘡至成廢疾者｜｜｜一兩有熱加黃芩氣虛加四君子血虛加四物水煎代茶 薛己外科發揮 瘰癧潰爛｜｜｜切片或為末水煎或入粥內須多食方攷江西所出色白者良

白斂

一名白草本經 白根別錄 兔核同上 崑崙同上 貓兒卵綱目

集解 弘景曰近道處處有之作藤生根如白芷破片竹穿日乾 恭曰根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥不似白芷蔓生枝端有五葉所在有之 頌曰今江淮及荊襄懷孟商齊諸處皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如鷄鴨卵而長三五枚同一窠皮黑肉白一種赤斂花實功用皆同但表裏俱赤爾

根苦平 別錄曰甘微寒 權曰有毒 治癰腫疽瘡散結氣止痛除熱

希雍曰癰疽皆由榮氣不從逆於肉裏所致女子陰中腫痛亦由血分有熱之故目中赤亦血熱為病散結涼血除熱故諸症悉已又曰為瘡疽家要藥又曰瘡疽已潰不宜服

時曰箭鏃不出者同丹皮或半夏為末酒服

鶴皋曰胎孕不下一方五十丸疑誤若生半夏服至五十丸當麻死矣

目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛赤白帶下本經

殺火毒別錄

治發背瘰癧面上疱瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生肌止痛大明

解狼毒時珍

之才曰代赭為之使反烏頭

發明弘景曰生取根搗敷癰腫有效頌曰今醫治風及金瘡面藥方多用之往往與白及相需而用宗奭曰服餌方少用惟斂瘡方多用之故名｜｜

方

發背初起水調｜｜末塗之肘後方

丁瘡初起方同上聖惠

一切癰疽陶隱居用｜｜二分藜蘆一分為末酒和貼之日三

湯火傷｜｜末敷之外臺

胎孕不下｜｜生半夏等分為末水丸桐子大榆皮湯下五十丸保命

諸瘡不斂

白斂　預知子　四十九

希雍曰｜｜得白及紅藥子加朱砂雄黄乳沒腦麝為傅癰疽止痛散毒之上藥

御藥院方治面鼻酒皶｜｜白石脂杏仁各半兩為末鷄子調塗日一洗　时後治面生粉刺｜｜二分杏仁半分鷄屎白一分為末蜜和拭面

希雍曰味苦性寒凡蠱毒多辛熱之物所造故宜苦寒以洩其熱毒熱毒既解則蠱不靈矣蟲皆濕熱所生蟲得苦則伏故殺蟲之藥多苦寒

｜｜赤欽黄柏各三錢炒研輕粉一錢葱白漿水洗淨敷　瑞竹堂

凍耳成瘡｜｜黄柏等分為末生油調搽

諸瘡腫｜｜赤小豆茵草為末鷄子白調塗　談埜翁方

甄權

預知子

又名聖知子日華　聖先子同上　盍合子同上　仙沼子同上

集解　志曰｜｜｜有皮殼其實如皂莢子相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其有聲當預知之故名　頌曰舊不著所出州土今惟淮蜀黔壁諸州皆有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房生青熟深紅每房有子五七枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾今蜀人每貴重之云亦難得其根冬月采之陰乾治蠱其勝於子也山民名為聖無憂

子仁苦寒　大明曰温　雙仁者可帶

殺蟲療蠱諸毒去皮研服有效　開寶　治一切風補五勞七傷其功不可備述治痃癖

同上汁黑入腎補腎

氣塊消宿食止煩悶利小便催生中惡失音髮落天
行溫疾塗一切蛇蟲蚕咬治一切病每日不過吞十
七粒不過三十粒永瘥 大明
方 預知子丸 治心氣不足精神恍惚語言錯忘忪悸煩鬱憂愁慘戚喜怒多恐少睡夜
多惡夢健忘驚魘或發狂並宜服此丨丨丨去皮白
茯苓甘杞子石菖蒲伏神柏子仁人參地骨皮遠志
山藥黃精蒸熟朱砂水飛等分為末 癘風 有虫眉落
客丸芡子大每嚼一丸 和劑局方 聲變丨丨
丨膏用丨丨丨雄黃各二兩為末以乳香三兩同水
一斗銀鍋煮至五升入二末熬成膏瓶盛之每服一
匙酒調下有出如馬尾
隨大便而出 聖惠方
旱蓮草 又名鱧腸 唐本 蓮子草 同上 金陵草 圖經 墨烟草 綱目 墨頭草 同上 墨菜 同上 猢孫頭 必

希雍曰｜｜｜汁黑味甘酸平純陰之草也入肝腎亦入胃與大小腸善凉血鬚髮白者血熱也齒不固者腎虛有熱也凉血益血則須髮變黑而齒固矣故古今變白之草當以此為勝本經主血痢及針灸瘡發洪血傳之立已塗眉髮生速而繁大明謂能止血排膿通小腸傳一切瘡蓋血痢

用猪牙草

集解 恭曰｜｜｜生下濕地所在坑渠間多有苗似旋覆二月八月採陰乾 頌曰處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺開花細而白其實若小蓮房蘇恭謂似旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之連翹者二種折其苗皆有汁出須臾而黑俗謂之旱蓮子亦謂之金陵草

時珍曰｜｜｜有二種一種苗似旋覆而花白細者是鱧腸一種花黃紫而結房如蓮房者乃是小連翹也爐火家亦用之見連翹條

甘酸平治血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗眉髮生速而繁 唐本 烏髭髮益腎陰 時珍 止血排膿通小腸傳一切瘡并蠶瘑 大明 膏點鼻中添腦 蕭炳

由於血分為濕熱所傷針灸洪血亦因病
人素本血熱及加艾灸則益熾血凉則止
熱藥則生膿血凉則散小腸有熱則閉熱
觧則通及傳一切瘡何非凉血益血之功
乎
鳴皋曰｜｜｜甘酸微濇甚補腎余治一
婦患勞二年漸愈而元虧殞胎六七次俗
謂胎滑百治不效因思殞胎當固腎滑則
治以濇乃以｜｜｜金櫻子熬膏以蒸熟
芡實末和丸與之竟得生子蓋此方本治
精滑而胎滑亦同此理也屢用有效又一
婦大便本不利滑胎二十餘次余與此方
大便更燥燥則努力動胎〻仍墮大抵腸
燥者難服
希雍曰性冷雖善凉血不益脾胃病人雖
血熱一見脾胃虛敗飲食難消及溏泄勿
與服故千金方用薑汁和劑

方　金陵煎　益髭髮變白為黑｜｜｜一担六月以
後採青嫩無泥者洗摘去黃葉擣爛絞
汁日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和
日中煎以柳木條攪勿停手待如餳藥乃成矣每日
午後各服一匙溫酒化下如欲作丸日中再煎
至可丸此藥及時多合為佳其效甚速　千金　固齒
｜｜｜取汁同鹽鍊
乾研擦牙　攝生　一切頭痛　中｜｜｜汁滴鼻　聖濟總錄　繫臂
截瘧　｜｜｜擣爛男左女右置寸口上以古文錢壓
定帛繫住良久起小泡謂之天灸其瘧即止
王執中　資生經　小便溺血　｜｜｜車前草杵自然汁每空
心服三杯愈乃止　醫學正傳　腸
風臟毒　下血不止｜｜｜瓦上焙研末
米飲下二錢　家藏經驗方　痔漏瘡發｜｜
｜一把連根鬚淨洗石臼擣如泥極熱酒一盞冲入
取汁飲之其渣傅患處重者不過三服即安屢試其
效如神
保壽堂方
旱蓮草　罌粟花

〔杲曰〕入腎〔時珍曰〕斂肺〔鳴皋曰〕按花與穀同嘗見鄉閒人瀉痢不止用花同麪作餅食即效大抵瀉痢初起愼不可用耳

罌粟花 又名麗春花 時珍 粟名御米 開寶 米囊子 同上 象穀

殼 酸濇微寒止瀉痢固脫肛治遺精久欬斂肺濇腸止心腹筋骨諸痛 時珍

〔時珍曰〕得醋烏梅橘皮良〔又曰〕凡用洗潤去蒂及筋膜取外薄皮陰乾細切醋拌炒入藥亦有用蜜炒蜜炙者

發明 〔杲曰〕收斂固氣能入腎故治骨病尤宜〔震亨曰〕今人虛勞咳嗽多用粟殼止劫及濕熱泄痢者用之止澀其治病之功雖急殺人如劍宜深戒之〔又曰〕治嗽多用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也治痢亦同凡痢須先散邪行滯豈可遽投粟殼龍骨之藥以閉塞腸胃邪氣得補而愈甚所以變症作而淹延不已也〔時珍曰〕酸主收澀故初病不可用之瀉痢既久則氣散不固腸滑肛脫欬嗽諸病既久

氣散不收而肺脹痛劇故俱宜此澀之固之收之歛之按楊氏直指方云粟殼治痢人皆薄之固矣然下痢日久腹中無積痛當止澀者豈容不用不有此劑何以對治乎但要有輔佐耳又王碩易簡方云粟殼治痢如神但性緊澀多令嘔逆故人畏而不敢服若用醋制加以烏梅則用得法矣或同四君子藥尤不致閉胃妨食而獲奇功也

方　久痢｜｜｜醋炙為末蜜丸彈子大每服一丸水煎入生薑三片溫服○集要百中散｜｜｜蜜炙厚朴薑製等分為末每米飲下一錢

水瀉不止｜｜｜一枚烏梅肉大棗肉各十枚

穀氣素壯者用之即效｜｜｜蜜煎服經驗方

久嗽不止｜｜｜炙為末每服五分蜜湯下　危氏方

久嗽虛嗽｜｜｜二兩半醋炒取一兩烏梅半兩焙為末每服二錢　宣明

米　甘平〔宗奭曰〕寒多食利二便動膀胱氣　治丹石發動不下飲食

罌粟花殼米　鴉片

五十二

〔鳴皋曰〕｜｜大毒同酒服数分或錢許即殺人〔又曰〕西洋煑用罌粟花熬成｜｜罌粟之性不過能斂濇耳何以熬成｜｜燃而吸之能令人精神陡發日夜不眠房事不倦乎此理殊不可解久又令人不能暫離一日不吸便筋骨抽痛淹然如死且吸之久〻陽事漸不能舉為其拔取而竭之也其害如此惟有久痢不止用脂麻大一粒吞之却有效此與用粟殼同義

和竹瀝作粥食 開寶 逐邪熱治反胃 蘇頌 潤燥 時珍

方 反胃吐食 白罌粟米三合人参三錢生山藥五寸細切煮粥入生薑汁盐花少許隨時服 見圖經

鴉片 又名阿芙蓉 綱目

酸澁温微毒治瀉痢脫肛不止能澁丈夫精氣 時珍

〔時珍曰〕服之忌醋令人腸斷

方 痢下｜｜木香川連白术各一分研末飯丸小豆大壯者一分老幼半分空心米飲下忌酸物生冷油膩茶酒麪無不止者

劉寄奴草 又名金寄奴 大明 烏藤菜 綱目

劉裕字寄奴微時伐荻新州射一大蛇明日再往見童子林中擣藥問之答曰吾王為劉寄奴所傷合藥敷之裕曰王何不殺之答曰寄奴王者不可殺也叱之不見乃収藥回敷金瘡立愈故名

〔希雍曰〕||||其味苦其氣溫揉之有香氣故應兼辛苦能降下辛溫通行血得熱則行故能主破血下脹然善走之性又在血分故多服令人痢昔人謂為金瘡要藥又治產後餘疾下血止痛者正以其行血迅速故也

集解〔恭曰〕||||生江南莖似艾蒿長四五尺葉似山蘭草而尖長一莖直上有穗葉互生其子似稗而細〔保昇曰〕今出越州蒿類也高四五尺葉似菊其花白色實黃白色作穗夏月収苗乾之〔頌曰〕今河中府孟州漢中滁州亦有之莖似艾蒿上有四稜高二三尺葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細根淡紫色似蒿苣六七月采苗花及子通用〔時珍曰〕||||一莖直上葉似蒼朮尖長糙澀面深背淡九月莖端分開數枝一枝攢簇十餘朵小花白瓣黃蕊如小菊花花罷有白絮如苦藚花之絮其子細長亦如苦藚子所云實如黍稗者似與此不同其葉亦非蒿類

苦溫破血下脹多服令人下痢蘇恭**下血止痛治產後餘疾止金瘡血極效**別錄**治心腹痛下氣水脹血氣通**

婦人經脉癥結止霍亂水瀉大明小兒尿血新者研末服即愈時珍

〔斅曰〕用子去莖葉去薄殼酒拌蒸晒乾用〔時珍曰〕莖葉花子皆可用

方

大小便血｜｜｜｜為末茶調空心服二錢即止集簡方

折傷瘀血在腹內者｜｜｜｜骨碎補延胡索各一兩水煎入酒及童便溫服千金方

血氣脹滿｜｜｜｜穗實為末每服三錢酒煎服不可過多令人吐利此破血之仙方也衛生易簡方

霍亂成痢｜｜｜｜煎汁飲聖濟錄

湯火傷｜｜｜｜搗末先以糯米漿鵝翎掃上後乃摻末並不痛亦無痕大驗之方也凡湯火傷先以鹽末摻之護肉不壞後乃用藥為妙本事方

風入瘡口腫痛｜｜｜｜｜為末摻之即止聖惠方

馬鞭草

又名龍牙草圖經鳳頸草

集解 弘景曰 墟陌甚多莖似細辛花紫色微似蓬蒿 恭曰 葉似茺蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭鞘不似蓬蒿 保昇曰 花白色 頌曰 今江淮湖皆有苗類益母而莖圓高二三尺 時珍曰 ｜｜下地甚多春月生苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫花作穗如車前穗其子如蓬蒿子而細根白而小陶言花似蓬蒿韓言花白色蘇言莖圓皆誤矣

苗葉苦微寒 大明曰 辛凉無毒 權曰 苦有毒伏丹砂硫黃 治下部䘌瘡 別錄 癥瘕血瘕久瘧破血殺虫擣汁熬膏每空心服一匙 藏器 治婦人血氣肚脹月候不匀通月經 大明 治金瘡行血活血 震亨 擣塗癰腫及蠼螋尿瘡男子陰腫 時珍

方 瘧痰寒熱 ｜｜｜擣汁五合酒二合分二服 千金方 鼓脹煩渴 身乾

黑瘦｜｜｜細切晒乾勿見火以酒或水同煮至味
濃出渣溫服以六月中旬雷鳴時採者有效　衛生
易
簡　大腹水腫｜｜｜鼠尾草各十斤水一石煮五斗
去渣再煎令稠以粉和丸大豆大每服
二三丸加至四五　男子陰腫大如升核痛人不能治
丸神效　肘後　者｜｜｜搗傅　集驗
婦人疝痛名小腸氣｜｜｜一兩酒煎濃服
以湯浴身取汗甚妙　纂要奇方　經閉｜｜
｜熬膏每服半匙用熱酒下有血
塊脇脹欲死者俱治　聖惠方　魚肉癥瘕酒積在
脳
腸不化成結｜｜｜汁　赤白痢｜｜｜五錢陳茶一
飲一升即消　千金　撮煎服神效　醫方
摘
要　乳癰｜｜｜一握酒一椀薑一
塊搗汁服渣傅　易簡方　疥瘡｜｜｜草不
犯鐵器搗汁
頻飲半椀十日　發背｜｜｜搗汁飲渣傅痛
愈神效　薰蛃　不可忍者即緩　集簡　楊梅瘡
｜｜｜煎先熏後洗氣到
便爽痛隨減　本草蒙荃

〔昂曰〕上行陽明胃亦入厥陰肝

〔希雍曰〕｜｜｜味辛微温入足厥陰經又入足陽明經補肝氣之要藥也辛能散結微温能通氣喉痹者手少陰心火與足少陽相火相煽上壅而成散二經之火則氣通而無所結滯矣齒風痛者胃家熱盛上

根　辛澁温赤白下痢初起焙為末米飲服一錢匕

無所忌　頌　藴

穀精草　又名戴星草開寶文星草綱目流星草

集解〔頌曰〕處處有之春生於穀田中莖葉俱青根花並白色二三月採花用花白小圓似星可喂馬令肥主虫顙毛焦病又一種莖梗長有節根微赤出秦隴間〔時珍曰〕此草收穀後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採花藴云二三月採誤也

花辛温〔藏器曰〕甘平　治喉痹齒風痛諸瘡疥開寶頭風痛目盲醫膜痘後生翳止血時珍〔大明曰〕可結水銀成砂子

衛熱則生風〻火相搏也瘡亦由於血熱諸痛痒瘡瘍皆屬心火藥宜辛散故悉主之以其入肝補肝氣故為治目散翳之上藥

〔鳴皋曰〕｜｜｜性辛散而平和無妨多用汪氏云能散陽明風熱實則散厥陰之風熱更勝也

〔時珍曰〕入足厥陰

發明〔時珍曰〕｜｜｜體輕性浮能上行陽明分野凡治目中諸病加而用之甚良其明目退翳之功似在菊花之上也

方 **腦痛眉痛** ｜｜｜二錢地龍三錢乳香一錢為末每用半錢燒烟筩中隨左右薰鼻

聖濟方 **偏正頭痛** ｜｜｜一兩為末麪和貼之

集驗 **鼻衄** ｜｜｜為末熟麪湯服

聖惠 **目翳** ｜｜｜防風等分為末米飲服甚驗

明目方 **痘後目翳** ｜｜｜為末以柿或羊肝蘸食○一方加蛤粉等分同入羊肝煮食○又方見夜明砂

邵真人濟急方 **小兒雀盲** 至晚不見物用羯羊肝一具不用水洗竹刀剖開入｜｜｜一把瓦罐忌鉄煮熟日食之屢效或炙熟搗丸茶服亦可

見衛生家寶方

青葙 一名草蒿本經 萋蒿同上 崑崙草唐本 野雞冠綱目 雞冠莧同上 子名草決明

集解〔時珍曰〕ㅣㅣ生田野間嫩苗似莧可食長則高三四尺苗葉花實與鷄冠花一樣無別但鷄冠花穗或有大而扁或圓者此則梢間出穗尖長四五寸狀如兎尾水紅色亦有黃白色者子在穗中與鷄冠子莧子一樣難辨蘇恭言其結角誤矣

莖葉苦微寒治邪氣皮膚中熱風瘙身癢殺三虫 本經 惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡 別錄 擣汁服大療溫癘 蘇恭 止金瘡血 大明

子苦微寒〔權曰〕苦平 治唇口青 本經 治五臟邪氣益腦髓鎮肝明目堅筋骨去風寒濕痺 大明 治肝臟熱毒衝眼赤障青盲翳腫惡瘡疥瘡 甄權

〔昂曰〕青葙子能助陽火瞳子散大者忌服

發明〔炳曰〕治眼有｜｜子丸〔宗奭曰〕｜｜子經不言治眼惟藥性論日華子始言治肝明目今人多用治眼殊與經意不相當〔時珍曰〕｜｜子治目與決明子莧實同功本經雖不言治目而云主唇口青則明目之功可知矣目者肝之竅唇口青足厥陰之證古人除熱亦多用之｜｜子之為厥陰藥又可知矣況用之治目往往有驗尤可微據魏畧云有青牛先生服｜｜子丸年百餘如五六十者

方 衄血不止 眩冒欲死｜｜子汁三合灌入鼻中 貞元廣利方

雞冠

集解〔時珍曰〕處處有之花有紅白黃三色其穗圓長而尖者儼如青葙之穗扁卷而平者儼如雄雞之冠花大有圍圓一二尺者子黑細光滑與莧實一様

苗甘涼治痔瘡及血病 時珍

子甘凉止腸風瀉血赤白痢藏器崩中帶下入藥炒用大明

花甘凉治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶下分赤白用時珍

方　吐血不止白｜｜花醋浸七次為末每服二錢熱酒下經驗　結陰便血｜｜花椿根白皮等分為末蜜丸桐子大每服三十丸黃芪湯下聖濟　糞後下血白｜｜花並子炒煎服聖惠　五痔成漏久不愈｜｜花鳳眼草等分煎頻洗衛生寶鑑　下血脫肛白｜｜花防風等分為末糊丸梧子大空心米飲下永類　經水不止紅｜｜花晒乾為末每服二錢空心酒調下忌魚肉孫氏集效方　產後血痛白｜｜花酒煎服李樓

寫象曰———厥陰肝經藥

奇方 **白帶** 白——花日乾為末空心酒服三錢赤帶用赤者 孫氏集效 **赤白痢** ——花煎酒服赤用紅白用白 集簡

決明子

集解 頌曰 人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺根帶紫色葉似苜蓿而大七月開黃花結角其子如綠豆而銳十月採之 時珍曰 決明有二種一種馬蹄決明莖高三四尺葉大於苜蓿而本小末奓晝開夜合兩〻相帖秋開淡黃花五出結角如初生細豇豆長五六寸角中子數十粒參差相連狀如馬蹄青綠色入眼藥最良一種茳芒決明救荒本草所謂山扁豆是也苗莖似馬蹄決明但葉之本小末尖正似槐葉夜亦不合秋開深黃花五出結角如小指長二寸許角中子數成列狀如黃葵子而扁其色褐味甘滑二種苗葉皆可作酒麴但茳芒嫩苗及花與角子皆可瀹茹及點茶食馬

蹄決明苗葉皆韌苦不可食也

子鹹平〔別録曰〕苦甘苦寒　治青盲目淫膚赤白膜眼赤淚出久服益精光輕身本經　療唇口青別錄　助肝氣益精以水調末塗腫毒熁太陽穴治頭痛又貼心胸止鼻洪作枕治頭風明目甚於黑豆日華　治肝熱風眼赤淚每旦取一匙挼淨空心吞之百日後夜能見物甄權　益腎解蛇毒震亨

葉作菜食利五臟明目甚良甄權

〔之才曰〕〡〡子蓍實為之使惡大麻子

決明

發明〔時珍曰〕相感志言圃種｜｜蛇不敢入丹溪言解蛇毒本於此也王旻山居録葉花皆可食切忌胞茶多食無不患風按馬蹄｜｜苗角皆勒而苦不宜於食縱食之有利五臟明目之功何遂至於患風耶又霏雪録言家種｜｜生子多跛此迂儒説不可信

方 積年失明 ｜｜子二升為末食後米飲服方寸匕 外臺 青盲 ｜｜子一升地膚子五兩為丸梧子大米飲下二三十丸 普濟方 補肝明目 ｜｜子一升蔓菁子二升酒五升煮乾為末每溫水下二錢日三 聖惠 目赤痛 ｜｜子炒研茶調傅兩太陽穴乾則易之一夜即愈 醫方摘元 頭風上 方同 鼻洪 方見大註 發背初起 ｜｜子生用一升擣生甘草一兩水三升煮一升分二服大抵血滯則生瘡肝主藏血｜｜子和肝氣不損元氣也 本事方

蓼

[鳶皋]曰本經云下水氣治浮腫甄權云除腎氣肘後治卵腫或縮入腹別錄除大小腸邪氣蔵器云能入腰脚是蓼乃肝腎之藥而行下焦者也○厥陰肝脉絡陰器治卵腫卵縮是行厥陰下水氣除腎氣是行

集解[弘景曰]此類多人所食有三種一是青|人家常用其葉有圓有尖以圓者為勝一是紫|相似而紫色一是香|相似而香並不甚辛好食[保昇曰]|類甚多有青|香|水|馬|紫|赤|木|七種紫赤二|葉小狹而厚青香二|葉亦相似而薄馬水二|葉俱濶大上有墨點木|一名天|蔓生葉似栀葉六|花皆紅白子皆大如胡麻赤黑而尖扁惟木|花黃白子皮青滑諸|並冬死惟香|宿根可為生菜食[時珍曰]韓保昇所説甚明古人種|為蔬收子入藥故禮記烹雞豚魚鱉皆實|於其腹中而和羹膾亦須切|也後世飲食不用人亦不復栽惟造酒麹用其汁耳今但以平澤所生香|青|紫|為良

子辛温明目温中耐風寒下水氣面浮腫癰瘍本經歸鼻除腎氣止霍亂治小兒頭瘡多食吐水壅氣損陽

蓼

少陰

執權

方 傷寒勞復（因交後卵腫或縮入腹痛蓼子一把水挼汁飲一升 肘後）霍亂煩渴（蓼子一兩香薷二兩每服二錢水煎服 聖惠）小兒頭瘡（蓼子為末蜜和雞子白同塗之蟲出不作痕 藥性論）蝸牛咬毒（毒行遍身者蓼子煎水浸之立愈不可近陰令弱也）

陳藏器

苗葉辛溫無毒（思邈曰食多有毒）治歸舌除大小腸邪氣利中益志（別錄）乾之釀酒主風冷大良（弘景）作生菜食能入腰脚煮湯浸脚能治霍亂轉筋煮汁日飲治痃癖搗傅狐尿瘡（藏器）脚暴軟赤蓼燒灰淋汁浸之以桑葉蒸

晉立愈大明 殺虫伏砒時珍

孫真人曰黃帝云食丨過多發心痛和生魚食令人脫氣陰核痛求死二月食丨傷人胃扁鵲云久食令人寒熱損髓減氣少精婦人月事來時食丨變為淋與大麥麪相宜

方 蓼汁酒 治胃脘冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧足冷八月三日取丨日乾煮汁釀酒日飲之明目壯氣 千金 肝虛轉筋 吐瀉赤丨莖葉切水一盞酒一盞煎服 聖惠方 又方 丨葉一升水三升煮二升去渣入香豉一升再煮升半分服 藥性論 小兒冷痢 擣汁服 千金 血氣攻心 痛不可忍丨根切浸酒飲 斗門方 犬咬傷 擣傅之 肘後

水蓼

集解〔宗奭曰〕一一大槩與水葒相似但枝分耳今造酒取葉以水浸汁和麪作麴亦取其辛耳〔時珍曰〕此水際所生之蓼葉長五六寸比水葒葉稍狹比家蓼葉稍大而功用髣髴

莖葉辛治蛇傷擣傅之蛇毒入腹心悶絞汁服之又治脚氣腫痛成瘡水煮汁漬之唐本

馬蓼 又名大蓼綱目 墨記草

集解〔弘景曰〕一一生下濕地莖斑葉大有黑點亦有數種其最大者即水葒也〔時珍曰〕俗呼大蓼是也高四五尺有大小二種但每葉中間有黑跡如黑點記故方士呼為墨記草

莖葉辛溫去腸中蛭虫輕身本經

水葒 又名葒草別錄 天蓼同上 石龍同上 游龍詩經 大蓼

集解〔弘景曰〕生下濕地甚多極似馬蓼而甚長大詩稱隰有游龍即此也〔頌曰〕似蓼而葉大赤白色高丈餘〔時珍曰〕其莖粗如拇指有毛其葉大如商陸花色淺紅成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤黑而肉白不甚辛

子　鹹微寒治消渴去熱明目益氣 別錄

方　瘰癧 ——子不拘多少一半微炒一半生用同研末食後好酒調服二錢已破者亦治日三服久則效〻則止 寇氏本草衍義

癖痞腹脹及堅硬如盃盌者用水葒花子一升另研獨頭蒜三十箇去皮新狗腦一箇皮消四兩石臼搗爛攤在患處上用油紙以長帛束之酉時貼之次日辰時去之未效再貼二三次倘有膿潰勿怪仍看虛實日逐間服錢氏白餅子紫霜丸塌氣丸消積丸利之磨之服至半月甚者一月無不瘥矣以欲滿者為實不欲為虛 藺氏經驗方

蓼水葒　虎杖　卒一

花散血消積止痛 時珍

方 胃脘血氣作痛｜｜花一大撮水二鍾煎一鍾服百户毛菊庄屢效方也 董炳集驗

心氣痛｜｜花為末酒服二錢○又法男用酒水各半女用醋水各半煎服一婦年三十病此一服立

腹中痞積｜｜花或子一盌煎成膏攤貼效 摘元

仍以酒調膏服忌葷腥油膩 劉松石保壽堂

虎杖

又名苦杖 拾遺 大虫杖 藥性 斑杖 日華 酸杖

時珍曰 杖言其莖虎言其斑或云一名杜牛膝者非也

集解

弘景曰 田野甚多狀如大馬蓼莖斑而葉圓

保昇曰 生下濕地作樹高丈餘其莖赤根黄二月三月採根

頌曰 今出汾州越州滁州處處有之三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑初生便分枝

子葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云蒤虎杖郭璞註云似葒草而粗大有細刺可以染赤是也〔宗奭〕曰此草藥也蜀本言作木高丈餘者非矣大率皆似寒菊然花葉莖蕊差大為異仍莖葉有淡黑斑六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大而外微深陝西山麓水次甚多〔斅〕曰凡使勿誤用天藍及斑袖根根形味皆相似也〔機〕曰或云似葒似杏似寒菊各不相侔豈所產不同耶〔時珍〕曰其莖似葒蓼其葉圓似杏其根黃似柳其花狀似菊色似桃花合而觀之未嘗不同

根 微溫〔權〕曰甘平〔宗奭〕曰微苦今暑月多煎根為飲不得甘草則不堪飲云甘是甘草味非｜｜味也

通利月水破留血癥結〔別錄〕漬酒服主暴瘕〔弘景〕風在骨節間及血瘀煮酒服之〔藏器〕治大熱煩躁止渴利小

便壓一切熱毒甄權治産後血運惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癤撲損瘀血破風毒結氣大明燒灰貼諸惡瘡焙研鍊蜜為丸陳瘡米飲服治腸痔下血蘇頌研末酒服治産後瘀血ミ痛及墜撲畜悶有效時珍

發明【權曰】暑月以根和甘草同煎為飲色如琥珀可愛甚甘美瓶置井中令冷如冰時人呼為冷飲子啜之且尊於茗極解暑毒其汁染米作糕益美搗末浸酒常服破女子經脈不通有孕忌服【時珍曰】千金方治月經不通腹内積聚虛脹雷鳴四肢沉重亦治丈夫積聚有｜｜煎取高地｜｜根剉二斛水二石五斗煮取一斗半去滓入醇酒五升煎如餳每服一合以知為度又許學士本事方治男婦諸般淋疾用苦杖根洗淨剉一合以水五合煎一盞去滓入乳香麝香少許服之鄞縣尉耿夢得内人患沙石淋已

時珍曰上焦肺經藥

十三年每溲痛楚不可忍尿器中小便下沙石剥剥有聲百方不效得此一服而愈余所目睹者

方 五淋 方見發明 月水不通 ｜｜三兩凌霄花没藥各一兩為末熱酒服一錢◯又方治經水不通腹大如甕氣短欲死｜｜一石去頭日乾切土瓜根汁牛膝汁二斗水一斛浸｜｜一宿煎取二斗入二汁同煎如餳每酒服一合日二夜一血當下也 聖惠方 時疫流毒 攻手足腫痛欲断｜｜根煮汁漬之 肘後方 腹中暴癥 硬如石痛刺不治百日内死用｜｜根勿令影臨水上取石餘洗乾擣末秫米五升炊飯納入攪之好酒五斗漬之封固須俟藥消飯浮可飲一升半勿食魚塩此方治癥大勝諸藥 外臺

馬勃

又名馬疕 音屁 馬氣 音庀 灰菰 綱目

集解 弘景曰俗名｜氣｜是也紫色虛軟狀如犬肝弾之粉出 宗奭曰生濕地及腐木上夏秋

采之有大如斗者小亦如升杓

辛平無毒治惡瘡馬疥別録傳諸瘡甚良弘景去膜以蜜拌揉少以水調呷治喉痺咽痛宗奭清肺散血解熱毒時珍

時珍曰凡以生布張開將丨丨于上摩擦下以盤承取末用

發明 時珍曰丨丨輕虛上焦肺經藥也故能清肺熱咳嗽喉痺衄血失音等病李東垣治大頭病咽喉不利普濟消毒飲中亦用之

方

咽喉腫痛 嚥物不得丨丨一分蛇蛻一條燒末綿裹一錢嚥汁 聖惠

走馬

喉痺 丨丨焰消各一兩為末每吹一字吐涎血即愈 經驗

失音 丨丨馬牙消等分研沙糖和丸含之 摘元

久嗽不止 丨丨為末蜜丸桐子大每白湯下二十九即愈 普濟方

斑

「宗奭曰」益心脾「元素曰」入手太陽小腸好古曰白入手太陰肺足太陽膀胱經氣分赤入足太陰脾手少陰心太陽小腸氣分伏腎邪

「杲曰」色白入肺瀉熱而下通膀胱又能通心氣於腎使熱從小便出然必其上行入肺清其化源而後能下降利水也

瘡入目 ｜｜蛇蛻各五錢皂子十四箇為末入罐內塩泥固濟燒存性研酒服一錢 閻氏

臁瘡不合 蔥塩湯洗淨拭乾以｜｜末敷之即愈 仇遠稗史

伏苓

又名伏靈綱目 伏兎本經 不死麪

集解「弘景曰」今出欝州大者如三四升器外皮黑而細縐內堅白者良虛赤者不佳「恭曰」今泰山亦有實而理小不復采用第一出華山形極粗大雍州南山亦有不如華山「頌曰」今東人見山中古松久為人斬伐其枯折槎枿枝葉不復上生者謂之｜｜撥即於四面丈餘地內以鉄頭錐剌地如有｜｜則錐固不可拔其撥大者｜｜亦大皆自作塊不附着根

甘平「元素曰」甘淡温 治胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神 本經

昂曰五皮散用皮以皮行皮之義凡腫而煩渴便秘溺赤屬陽水宜五皮散疏鑿飲不煩渴大便溏小便數屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神氣別錄開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰塞心腹脹滿小兒驚癇女人熱淋甄權補五勞七傷開心益志止健忘煖腰膝安胎大明止渴利小便除濕和中益氣利腰臍間血元素逐水緩脾生津導氣平火止泄除虛熱開腠理李杲瀉膀胱益脾胃治腎積奔豚好古

赤茯苓破結氣甄權瀉心小腸膀胱濕熱利竅行水時珍

皮主水腫膚脹利水道開腠理時珍

注昂曰宜用人乳拌蒸

斅曰搗細入水盆中攪之浮者濾去此是丨丨赤筋若誤服令人盲目鳴按丨丨後人用之多矣未見其害若此雷斅妄說甚多不足信也

子接曰得人參能下氣得半夏能滌飲

鳴臯曰世醫但知丨丨利小便若遇大熱症泥於古人釜底抽薪之法誤用丨丨猪苓等將邪熱引入下焦遂成癃閉此等弊非閱歷不知○凡遇大熱症祗宜大清邪熱〻解而便自利不必用利藥也即用利藥須俟熱衰渴半之後

之才曰馬藺為之使得甘草防風芍藥紫石英麥冬共療五臟惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲忌米醋及丨丨

酸物

發明 弘景曰丨丨白者補赤者瀉俗用甚多仙方云其通神而致靈和魂而鍊魄利竅而益肌厚腸而開心調營而理衛上品仙藥也宗奭曰丨丨行水之功多益心脾不可缺也元素曰丨丨其用有五利小便也開腠理也生津液也除虛熱也止瀉也如小便利或數者多服則損人目汗多人服之亦損元氣為其淡而滲也杲曰白者入壬癸赤者入丙丁味甘而淡降也陽中陰也其用有六利竅而除濕益氣而和中治驚悸生津液小便多者能止結者能通又云濕淫所勝小便不利淡以利竅甘以助陽溫平能益脾逐水乃除濕之聖藥也好古曰白者入手太陰足太陽經氣分赤者入足太陰手少陰太陽氣分伐腎邪小便多能止之小便澁能利之與車前子相似雖利小便而不走氣酒浸與光明朱砂同用能秘童元

嗚皋曰余少因鑿喪致虛弱至夏必病濕熱芬醫教余以丨丨代茶遂至遺精急止藥始不復遺丹溪接引之說甚切

嗚皋曰丨丨走而不守入少陰而伐腎邪故多服單服而無監制滲利太過每有損目走精之患然用為接引則甚妙如和劑之威喜丸用丨丨之滲利入腎最速加以黃蠟之膠粘固濇所以能固元陽治帶濁也所謂天道好濇製此方者有神悟

欬音去聲

蒿曰張呂

也詩顧言

明嚏毛訓

嚏作欬

味甘而平如何是利小便耶震亨曰仲景利小便藥多用之此暴病新病之要藥也若陰虛者恐未為宜此物有行水之功久服損人八味丸用之者不過接引他藥歸就腎經去胞中久陳積垢耳時珍曰丨丨本草又言利小便伐腎邪至李東垣王海藏乃言小便多者能止澀者能通同朱砂能秘真元而丹溪又言陰虛者不宜用義似相反何哉丨丨氣味淡而滲其性上行生津液開腠理滋水之源而下降利小便故潔古謂其屬陽浮而升言其性也東垣謂其為陽中之陰降而下言其功也素問云飲食入胃游溢精氣上輸於肺通調水道下輸膀胱觀此則知淡滲之藥俱必上行而後下降非直下行也小便多其源亦異素問云肺氣盛則便數而欠虛則欠欬小便遺數心虛則少氣遺溺下焦虛則遺溺胞移熱於膀胱則遺溺膀胱不利為癃不約為遺厥陰病則遺溺閉癃所謂肺氣盛者實熱也其人必氣壯脈強宜用丨丨甘淡以滲其熱故曰小便多者能止也若夫肺虛心虛胞熱厥陰病者皆虛熱也其人必上熱下寒脈虛

〔鳴〕皋曰威喜丸說見黃蠟下

而弱法當用升陽之藥以升水降火膀胱不約下焦
虛者乃火投於水〻泉不藏其人必肢冷脈遲法當
用溫熱之藥峻補其下交濟坎離二證皆非｜｜輩
淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有
服食之法亦當
因人而用焉

方　濁遺帶下

威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固
小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻〻
遺泄婦人白淫白帶並皆治之白｜｜去皮四兩作
匱以猪苓四錢五分入內煮二十餘沸取出日乾揀
去猪苓將｜｜為末化黃蠟和丸如彈子大每服一
丸空腹細嚼俟滿口生津送下以小便利為度〇抱
朴子云｜｜千歲上生小木狀似蓮花名曰木威喜
芝夜有光帶之辟兵服之長生威喜之名蓋取諸此

和劑局方　**吳仙丹**　朱氏集驗方云中丞常子正苦痰飲
每食飽或陰晴節變皆同約十日一
發頭背寒嘔吐酸水即數日伏枕不食服藥罔效後
得吳仙丹方服之遂愈每遇飲食過多腹滿服五七
茯苓

六十六

十丸便已少頃小便作吳萸氣酒飲皆隨小便去前後痰藥甚多無及此者用吳茱萸湯泡七次丨丨等分為末煉丸梧子大開水送下

小便頻多

丨丨去皮乾山藥去皮以礬水淪過焙等分研末米飲服二錢　儒門事親方

小便淋濁

由心腎氣虛神不守舍或夢遺赤白丨丨等分為末新汲水飛去浮沫控乾以地黃汁同搗酒熬作膏和丸彈子大空腹鹽湯嚼下一丸　三因方

卒然耳聾

丨丨為末黃蠟和丸細嚼茶湯下　普濟

水腫尿澀

丨丨皮椒目等分煎湯日飲取效　見普濟方

血餘怪症

手十指節斷壞惟有筋連每節肉虫出如燈心長数寸遍身綠毛卷名曰血餘以丨丨胡黃連煎飲取效　夏子益怪症奇方

服茯苓法

取白丨丨五斤去皮擣篩絹囊盛於二斗米下蒸之米熟取出晒乾又蒸如此三遍乃取牛乳二斗和合銅器内微火煎膏収之以竹刀劃食辟穀不飢○又以丨丨合白菊花或合白术為散常服甚補益人　蘇頌

抱根而不離者為伏神

茯神甘平療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神別錄補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利者加而用之甄權

發明〔時珍曰〕神農本草止言茯苓名醫別錄始添丨丨而主治皆同後人治心病必用丨丨故張潔古云風眩心虛非丨丨不能除然茯苓亦未嘗不治心病也弘景始言伏苓赤瀉白補李杲復分赤入丙丁白入壬癸此其發前人之祕者時珍則謂伏苓丨丨只當云赤入血分白入氣分各從其類如牡丹芍藥之義不當以丙丁壬癸分也若以丙丁壬癸分則白丨丨不能治心病赤丨丨不能入膀胱矣張元素不分赤白之說却於理欠通

方　交感丹 凡人中年精少神衰蓋由心血少火不下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕營

茯神

（昂曰乳香能伸筋木瓜能舒筋也）

斷不知上則多驚中則痞塞飲食不下〻則虛冷遺精愚醫只知峻補下焦非惟不能生水滋陰反見憔悴但服此方半年屏去一切暖藥絕欲養攝其效不可殫述香附子一斤新水浸一宿石上擦去毛炒黃〡〡去皮去木四兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸侵晨細嚼以降氣湯下○降氣湯用香附如上法五錢用〡〡二兩炙甘草兩半為末點沸湯服前藥 瑞竹堂經驗方

養心安神 朱雀丸 治心神不足恍惚健忘不樂火不下降水不上升時復振跳常服此丸消陰養火全心氣〡〡二兩沉香五錢為末鍊蜜丸小豆大每服三十丸食後人參湯下 百一

伏神心木 又名神木 黃松節 治偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘 甄權 治腳氣痹痛諸筋牽縮 時珍

方 松節散 用〡〡心木一兩乳香一錢石器炒研為末每服二錢木瓜酒下治風寒冷濕

〔元素曰〕——清肺利小腸

搏於筋骨足筋攣痛行步艱難但是諸筋攣縮疼痛並主之 聖濟錄

琥珀 又名江珠

集解〔弘景曰〕舊説松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣有煮毈雞子及青魚魫僞之者惟以手心摩熱拾芥爲眞今並從外國來〔保昇曰〕楓脂入地千年變爲——不獨松脂也〔宗奭曰〕今西戎亦有其色淡而明徹南方者色深而重濁地理志云海南林邑多出——時珍曰內有蜂蟻松枝形者尤好

甘平安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋 別錄 壯心明目磨翳止心痛顛邪療蠱毒破結瘕治產後血枕痛 大明 止血生肌合金瘡 藏器 清肺利小腸 元素

發明〔丹溪曰〕古方用為利小便以燥脾土可助脾能運化肺氣下降故小便可通若血少不利者反致其燥急之苦〔弘景曰〕帶之避惡刮削服治瘀血甚驗〔蔵器曰〕和大黃鱉甲作散酒下方寸匕下惡血婦人腹内血盡即止宋高祖有｜｜枕碎以賜軍士敷金瘡

方　琥珀散　止血生肌鎮心明目破癥結氣塊産後血運悶絶兒枕痛｜｜一兩鱉甲一兩三稜一兩延胡半兩没藥半兩大黃六銖熬擣為末空心酒下三錢日再服神效産後各疾減大黃　海藥本草

小兒胎癇　｜｜末朱砂各少許全蝎一枚為末麥冬湯調下一字　直指

小便轉胞　水四升葱白十莖煮汁三升入真｜｜末二錢溫服石淋沙淋三服皆效　聖惠

小便淋瀝　｜｜末二錢入射香白湯下或萱草根湯下亦可蜜丸赤苓湯下　普濟

從高墜下有瘀血在内　｜｜末酒服方寸匕或入蒲黃二三匕日四五服　外臺秘要

金瘡悶絶　｜｜

研粉童便調下一
錢三服瘥　鬼遺
松節甘温治久風〻虚脚痺疼痛 別錄 釀酒主脚弱骨
節風 弘景 炒焦治筋骨間病燥血中之濕 震亨 治風蛀牙
痛煎漱或燒灰揩有效 時珍
發明〔時珍曰〕〡〡松之骨也質堅氣勁久
亦不朽故治筋骨間風濕諸病宜之
方　歷節風痛 四支如解脱松節酒用〡〡二十
斤酒五斗浸三七日恣飲 外臺
轉筋攣急 〡〡一兩剉如米大乳香一錢瓦上慢火炒
焦存一二分性研末每服一二錢熱木瓜酒
下一應筋病皆　反胃吐食〡〡煎酒細
治 秘寶方　飲 百一方
又名 松膏 松肪 松香 瀝青
松脂苦甘温治癰疽惡瘡頭瘍白禿瘙疥風氣 本經 除

松節　脂　一六十九

胃中伏熱咽乾消渴風痺死肌別録煎膏生肌止痛排膿袪風貼諸瘡膿血瘻爛塞牙孔殺虫甄權强筋骨利耳目治崩帶時珍

發明時珍曰ㄧㄧ松之津液精華也抱朴子云上黨趙瞿病癩數年垂死其家棄之山中遇仙人與藥服百餘日遂愈顏色豊潤肌膚玉澤仙人再過之瞿求其方仙人曰此是ㄧㄧ鍊服可長生瞿歸家鍊服身輕力倍年百餘歲人聞瞿服此脂皆競服之不過月餘未覺大益輙止焉志之不堅故無效

方 鍊松脂法ㄧㄧ十斤桑柴灰汁一石煮五七沸漉出以冷水中再煮之凡十次乃白研細末毎粥飲服一二錢可以辟穀延年千金方 又法ㄧㄧ十斤鍊五度令苦味盡毎一斤入茯苓四兩毎旦服一刀圭巳 强筋補益 四聖不老丹ㄧㄧ一斤好酒煮數沸傾冷水内結塊復以

酒煮九次不苦不澁為末用十二兩入茯苓末半斤
黄菊末半斤柏子霜半斤蜜丸梧子大每旦服七十
丸 健陽補中 强筋潤肌松梅丸||如法錬每斤入熟地末十兩烏梅末六兩錬蜜為丸每
服七十丸 歷節風 百節酸痛不可忍||錬十次每三斤和錬酥三斤攪令極稠每旦酒服方寸
匕日三忌血腥生冷酸||酒錬五兩杵
物果子百日愈 外臺 婦人白帶 細酒丸桐子大每
服百丸酒 小兒禿瘡 ||二兩黄蠟兩半銅緑錢半
下 摘元 麻油兩半熬汶攤貼神效 衛
生寳鑑 風虫牙痛 ||滚水泡化一漱立止極效 集簡 金瘡出血 ||末少
加生銅末摻之立
愈 唐瑶經驗方
松毛（即松葉）苦温治風濕瘡生毛髮 別録 搗屑丸服可辟穀治
悪疾 弘景 灸𤸎凍瘡風瘡佳 大明 去風痛脚痹殺米虫 時珍

松脂毛花 七十

方

辟温疫 丨丨切細酒服方寸匕日三能辟温疫 傷寒類要

中風口喎 丨丨一斤擣汁清酒一升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出愈 千金方

三年中風 丨丨一升細切酒一斗煮取三升頓服取汗甚效 千金

歷節風 松葉擣汁一升酒三升浸七日服一合日三 同上

脚氣風痺 丨丨酒治十二風痺不能行衆療不效者服此一劑便瘥重者不過兩劑丨丨六十斤細剉以水四石煮取四斗以米五斗釀如常法別煮松葉汁以漬米并饙飯泥封頭七日後發澄飲取醉得此酒力者甚衆 千金方

大風惡疾 猪毛松葉二斤麻黄去節五兩剉以絹袋盛之寘清酒二斗中浸之春五日夏三日秋七日冬七日每温飲數杯常令醺之 聖惠方

松花 又名松黄 甘温潤心肺益氣除風止血

發明 丹溪曰多食發上焦熱病

〔鳴皐曰〕｜｜｜養陰治血分病是亦足厥陰肝藥也

〔鳴皐曰〕凡藥味辛而香者非熱即溫柏葉之清肺止血謂其性平則可謂其性寒則不然

〔昂曰〕養陰滋肺而燥土最清血分為補陰要藥鳴皐按肺喜潤惡燥脾喜燥惡潤故潤肺之藥多傷脾燥脾之藥多傷肺一舉兩得者其惟｜｜｜乎

側柏葉 又名梮

苦微溫〔權曰〕苦平〔頌曰〕性寒 頌曰性濇 治吐血衄血痢血崩中赤白去濕痺生肌〔別錄〕治冷風歷節疼痛止尿血〔甄權〕炙罯凍瘡燒取汁塗頭烏髭髮〔大明〕傅湯火傷止痛滅瘢服之療蠱痢常服殺五臟蟲益人〔蘇頌〕

〔權曰〕與酒相宜〔之才曰〕瓜子牡蠣桂為使畏菊花羊蹄諸石麪麴伏砒硝

發明〔丹溪曰〕此補陰之要藥其性多燥久服之大益脾土以滋其肺〔時珍曰〕柏性後凋而耐久乃多壽之木所以道家以之浸酒服食元旦以之浸酒飲辟邪皆有取也秦宮人因賊至走入山飢無所食一老人教食松柏葉初覺苦澀久相宜遂不飢至漢成帝時獵者見一人身生黑色越澗如飛乃捕獲之已二百

側柏葉 枝節

餘歲矣見
抱朴子
方　中風不省涎潮口禁言語不出手足嚲曳侍病
之日便進此方可使風退氣和不成
癈人｜｜｜一握去枝葱白一握連根研如泥無灰
酒一升煎一二十沸温服其人如不飲酒分作數服
再進他藥張仲景師｜｜｜湯用青柏
見楊氏家藏　吐血不止葉一把乾薑二片阿膠一挺
炙以水二升煮一升去渣别絞馬通汁一升合煎一
升濾淨一服盡之○聖惠方用｜｜｜米飲服二錢
或蜜丸或水　尿血｜｜｜川連焙研隨四
煎服並良酒服三錢濟急　大腸下血時方
向來｜｜｜炒研米飲服二錢王渙之或
在舒州病此得此方二服愈百一　酒毒下血下
痢｜｜｜九蒸九晒二兩陳槐花一兩炒
焦蜜丸梧子大每服四十丸酒下普濟　蠱痢下血
男婦及小兒大腹下黑血茶脚色或膿血
如靛色｜｜｜焙乾為末與川連同煎服　小兒洞痢

「好古曰」栢子仁入肝經氣分時珍曰透心腎益脾胃
「時珍曰」香通竅故聰明耳目甘故益血心生血汗為心液補心故止汗

｜｜｜煮汁代茶經驗方
月水不斷｜｜｜炙芍藥等分每用三錢水酒各半煎服○室女用｜｜｜木賊炒微焦等分為末每服二錢米飲下見聖濟總錄
大風癘疾眉髮不生｜｜｜九蒸九晒鍊蜜丸梧子大每服五丸至十丸日三夜一百日即生聖惠方
枝節煮汁釀酒去風痺歷節風燒瀝塗治癘疥及虫癬蘇頌○陳承曰久不愈者燒瀝油敷數次無不愈
脂治身面疣目同松脂研勻塗之數夕自失聖惠
栢子仁　甘平治驚悸益氣除風濕安五臟久服令人潤澤美色耳目聰明本經療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗別錄治頭風腰腎中冷膀胱冷膿宿

栢脂　栢子仁　七十二

〔昂曰〕略陳即不堪用

〔昂曰〕凡補脾藥多燥此潤藥而香能舒脾燥脾藥中兼用最良

水興陽道去百邪鬼魅小兒驚癎甄權潤肝好古養心氣潤腎燥安魂定魄益智寧神燒灑澤髮治癬疥時珍

〔甄權曰〕畏菊花羊蹄草〔之才曰〕見柏葉下

發明〔好古曰〕｜｜肝經氣分藥也又潤腎古方十精丸用之〔時珍曰〕｜｜性平而不寒不燥味甘而補辛而能潤其氣清香能透心腎益脾胃蓋仙家上品藥也宜乎滋養之劑用之

方 服柏子法｜｜｜二斤為末酒浸為膏棗肉三斤白朮末地黃末各一斤搗勻丸彈子大每服一丸日三服百日百病皆愈久服延年 奇效

老人虛秘 ｜｜ 松仁 火麻仁等分研溶蜜蠟丸梧子大以少黃丹湯食前調服二三十丸 寇宗奭

黃水瘡 ｜｜油 二兩 香油二兩煎稠塗之如神 陸氏方

鳴皋曰桂類多綱目集解中辨之紛然地
道既難細辨形狀亦難詳求惟有嘗之一
法其味甚香油多甘味極濃而長辣味少
於甘味細細咀嚼覺味美性平和毫不猛
烈便為上品甘辣相半者尚可用治中焦
病有一種辣舌至痛如椒薑者專能借肺
斷不可用一種味微帶苦者亦不可用○
古云交趾桂乃交趾清華山野生者所謂
清華桂是也彼國亦難得而禁嚴不可得
矣今之用者惟廣西猺桂為第一次則雲
南之迤安桂蒙自桂嘗之味長而平和者
皆可用也安邊桂厚大油多可治脾胃之
病如潯桂等下品斷不可用
昂曰入肝腎血分補命門辛能散肝甘能
益脾
鳴皋曰ㄧㄧ性辛熱入血分極能動血故
血病往往用之然味辛純陽陰虛血熱之
人用之靡不成大禍至謂能引火歸源必
得清華桂乃可今已不可得時醫泥于本
草之言不辨貨之美惡任意用之不惟不

性辛散

昂曰入肺收 有餘不歸 元着桂能 引火歸宿 丹田

南桂 梫 爾雅 菌桂 本經

甘辛大熱有小毒利肝肺氣心腹寒熱冷疢霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽（此指肺氣）鼻齆墮胎（昂曰能動血故墮胎）温中堅筋骨通血脉理踈不足宣導百藥無所畏 別錄 補下焦不足沉寒錮冷之病滲泄止渴去營衛中風寒表虛自汗春夏為禁藥秋冬下部腹痛非此不能止 元素 補命門不足益火消陰 好古 治寒痺風瘖陰盛失血瀉痢驚癇（此指慢驚） 時珍

之才曰得人參甘草麥冬大黃黃芩調中益氣得柴胡紫石英乾地黃療吐逆忌生葱石脂

肉桂

能抑肝風而且大孀肝陽不能扶脾土而
且大損肺陰以致困篤者不知凡幾也
「鳴皋曰」ㅣㅣ之性以通為用者也必得真
者而後可用又曰陽盛失血者多陰盛失
血者少亦時有之不可用凉藥須桂附必
須有確見乃可用
「希雍曰」得芍藥飴糖甘草黃芪則建中兼
止榮弱自汗 得石膏知母人參竹葉麥
冬治陽明瘧渴欲引飲汗多寒熱俱甚
得朴硝當歸下死胎 入桂苓甘露飲治
中暑霍亂吐瀉殊驗 得薑黃鬱金治怒
氣傷肝脇痛 得當歸牛膝治冬月產難
交骨不開 「子接曰」得紫石英治吐逆

牡桂部
桂枝

發明「時珍曰」ㅣㅣ性下行益火之源東垣所謂腎苦
燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣者也
聖惠方言桂心入心引血化汗化膿蓋手少陰君火
厥陰相火與命門同氣者也別錄云桂通血脉是矣
曾世榮云小兒驚風及泄瀉並用五苓散以瀉丙火
滲土濕内有桂能抑肝風而扶脾土又醫餘錄云有
人患赤眼痛脾虛不能飲食肝脉盛脾脉弱用凉
藥治肝則敗脾用熱藥治脾則肝愈盛但於温平藥
中倍加ㅣㅣ殺肝而益脾故一治而兩得傳云木得
桂而枯是也此皆與別錄桂利肝肺氣牡桂治脇風
脇痛之義相符人所不知者今為拈出又桂性辛散
能通子宮而破血故別錄言其墮胎龐安時云炒過
則不損胎也又丁香ㅣㅣ治痘瘡
灰塌能温托化膿詳見丁香下

方 心腹脹痛 氣短欲絶桂二兩水煮頓服 肘後 中惡心痛 方同上 死
胎不下 桂末二錢待痛緊時童便温熱調下名觀音
救生散亦治產難橫生加射香少許酒下

〔希雍曰〕肉桂ニ心實一物也祇去皮耳
〔鳴皋曰〕李士材本草通元云在下近根者為肉桂在中者為桂心在上枝條為桂枝二說未知孰是嘗謂雷斅多臆說難信李氏亦似強分閱桂心列方治病與桂無異似亦不必分矣且肉桂之精華在裏層斷無刮去之理大約未去皮為肉桂去外皮便為桂心鄙意如此俟高明証之
〔鼎曰〕九種心痛一虫二疰三風四驚五食六飲七冷八熱九去來痛皆邪乘於手少陰之絡邪心相激故令心痛丨丨苦入心

中風失音 含桂嚥汁○又桂末三錢水煎服取汗 千金

頭風 桂末酒調塗 聖惠

足躄筋急 同上

小兒久痢 赤白 桂去皮以薑汁炙黃川連以吳萸炒過等分為末紫蘇木瓜湯服名金鎖散 金幼心鑑

打撲傷 血瘀昏悶辣桂末酒下二錢 直指

乳癰腫痛 方見附子下

桂心 〔斆曰〕用紫厚者去上粗皮并內薄皮取心中味辛者用之 **苦辛無毒** **治九種心痛腹內冷氣痛不可忍欬逆結氣壅痺脚痺不仁止下痢殺三蟲治鼻中瘜肉破血通月閉胞衣不下** 甄權 **治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉消瘀血**

桂心

十四

辛走血故治之〔鳴皋按〕痛則不通〻則不痛桂以通為用故也

〔昂曰〕氣薄浮升入太陰肺太陽膀胱經〔鳴皋曰〕治腸風腸痛則亦入肝胆經矣

破痃癖癥瘕 大明 治風僻失音喉痺陽虛失血 即陰盛失血 內托癰疽痘瘡能引血化汗化膿解蛇蝮毒 時珍

方 九種心痛 聖惠 ｜｜二錢為末酒煎服大效○外臺 ｜｜末酒服方寸匕 產後心痛 惡血冲心氣悶欲絶｜｜為末犬胆汁丸芡子大熱酒下一丸 聖惠 寒疝心痛 四肢逆冷全不飲食｜｜不拘多少末一錢熱酒調下 同上 血崩不止 ｜｜砂鍋內煆存性為末米飲空腹服一二錢名神應散 婦人良方 吐血下血 肘後 用｜｜為末水服方寸匕○王璆曰此陰乘陽之症也不可服涼藥趙宣德吐暴血二服而止屢效 中風口喎 舌不能轉｜｜酒煮汁布醮搨病上正即止左喎搨右〻喎搨左常用大效 千金

桂枝 又名牡桂 本經 〔時珍曰〕此即木桂也薄而味淡其最薄者為｜｜

〔嘉言老人曰〕仲景用｜｜以和榮衛而解肌此定例也不但為太陽經中風之本藥即少陰之宜汗者亦取用之其妙處在用芍藥以養陰而和陽太陽之營衛得芍藥之酸收則不為甘溫之發散所逼而安其位也至若少陰則更為陰臟而少血所以强逼少陰汗者重則血從耳目口鼻出而厥竭可虞輕亦小便不利而枯涸可待用藥自當比芍藥之例而倍加陰以和陽余每用｜｜必加生地以佐芍藥之不逮三十年來功多雁〻可紀蓋得比例法也仲景於冬月太陽中風之症而用｜｜為例不為春月之病溫設也春月病溫用｜｜勢必佐以辛涼而冬不藏精之溫病在少陰不得不用｜｜之溫解之以少陰本陰標寒邪入其界非溫不散也豈惟｜｜甚則麻黃附子在所必用所貴倍加陰藥以輔之如芍藥地黃猪胆汁之屬是也今人未達此理但知畏藥性之溫概以羌獨柴葛混表則治太陽而遺少陰屢表而病不

辛溫無毒〔權曰〕甘辛 治氣欬逆結氣喉痺利關節補中益（不宜輕用）氣（本經）心痛脇痛脇風溫經通脈止煩出汗（君曰溫經通脈之效）（別錄）去冷風疼痛（甄權）去傷風頭痛開腠理解表發汗去皮膚風濕（元素）泄奔豚散下焦畜血利肺氣（成無己）橫行手臂治痛風（震亨）

發明〔好古曰〕或問本草言桂能止煩出汗而仲景治傷寒有當發汗凡數處皆用｜｜湯又云無汗不得用｜｜汗家不得重發汗若用｜｜是重發其汗〻多者用｜｜甘草湯此又用｜｜閉汗也一藥二用與本草之義相通否予曰本草言桂辛甘大熱能宣導百藥通血脉止煩出汗是調其血而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛故發熱汗出又云太陽病發熱汗出者此為營弱衛強陰

桂枝

七十五

除莫可如何矣
〔嗚皋曰〕觀嘉言所論是少陰腎亦取用丨
丨也
〔嘉言曰〕春傷於風夏生飧泄謂腸胃受風
不俟脾之運化食入即出以故飧已即泄
也不知者以為脾虛完穀不化用冬月飧
泄之法反以補脾剛燥之藥助風性之勁
有泄無已束手無策倘知從春令治之以
丨丨領風從解肌而出一二劑可愈也
〔嗚皋曰〕此即夏英公風泄用藁本湯之意
與藁本參看
〔嘉言氏曰〕經云丨丨入咽陽盛則斃春夏
發者為禁藥也桂能動血血熱者為禁藥
也木得桂而死肝不足者為禁藥也皋按
春夏當用必用但以陽盛血熱為禁耳
〔嗚皋曰〕別錄溫經通脈一語東壁氏透達
營衛一語可以參桂枝之性矣
〔嗚皋曰〕丨丨專入營血而溫經通脈故解
肌用丨丨湯加葛根湯解肌後身疼痛脈
沉者有丨丨加人參芍藥新加湯解肌後

虛陽必湊之故皆用丨丨發其汗此乃調其營氣而
衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非丨丨能閉腠
理發出其汗也汗多用丨丨者以之調和營衛則邪
從汗出而汗自止非丨丨能閉汗孔也昧者不知出
汗閉汗之義遇傷寒無汗者亦用丨丨誤之甚矣成
〔無已曰〕丨丨本為解肌若太陽中風腠理緻密營衛
邪實津液禁固其脈浮緊發熱無汗者不可與也必
也皮膚疎泄自汗脈浮緩風邪干於衛氣者乃可投
之發散以甘辛為主故以丨丨為君以芍藥為臣甘
草為佐者風淫所勝平以苦辛以甘緩之以酸收之
也以薑棗為使者辛甘能發散而又用其行脾胃之
津液而和營衛不專於發散也故麻黃湯不用薑棗
專於發汗不待行其津液也〔宗奭曰〕桂甘辛大熱素
問云辛甘發散為陽故仲景治傷寒表虛皆須此藥
正合辛甘發散之義〔承曰〕凡桂之厚實氣味重者宜
入治水臟及下焦輕薄氣味淡者宜入治頭目發散
藥故本經以菌桂養精以牡桂利關節仲景發汗用
丨丨乃枝條非身幹也取其輕薄能發散〔時珍曰〕麻

汗出過多心下悸欲得按者有｜｜甘草湯臍下悸欲作奔豚者有茯苓｜｜甘草大棗湯解肌領邪有｜｜加生地湯清陽瀉火有｜｜加大黄湯溫經止汗有｜｜加附子湯解肌瀉火有｜｜白虎湯｜｜加瓜蔞湯治誤攻腹滿時痛有表症相碍者有｜｜加芍藥湯他如｜｜加紅花湯｜｜加苓連湯亦在人隨症領悟而用之

月

【希雍曰】｜｜子甘平氣微寒潤而滋補兼能退熱而專於補腎潤肺生津益氣為肝腎真陰不足勞乏內熱補益之要藥本經主五內邪熱消渴周痺別錄主風濕下胸脇氣客熱頭疼當指葉與地骨皮而言寒能除熱也至於補內傷大勞噓吸堅筋骨强陰利大小腸久服輕身耐寒暑當是指子之功用老人陰虛者十之七八故服食家為益精明目之上品蓋熱退則陰生陰生則精血自長肝開竅於目黑水神光屬腎二臟之陰氣增益則目自明矣

黄遍徹皮毛故專於發汗而寒邪散肺主皮毛辛走肺也｜｜透達營衛故能解肌而風邪去脾主營肺主衛甘走脾辛走肺也

枸杞 又名枸檵 爾雅 枸忌 別錄 杞棘 衍義 地骨 本經 仙人杖 別錄 西王母杖 【時珍曰】此通指根苗花實並用

天精 抱朴

苦寒主五內邪熱氣熱中消渴周痺風濕久服堅筋骨耐寒暑 本經 下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸强陰利大小腸 別錄 補精氣諸不足易顏色明目安神 甄權

發明【時珍曰】考本經所列主治蓋通根苗花實而言初無分別後世以杞子為滋補藥地骨皮為退

希雍曰｜｜雖為益陰除熱之上藥若脾胃弱泄瀉者勿用必用亦須同山藥蓮肉車前茯苓相兼

時珍曰去上焦心肺客熱

好古曰入足少陰腎手少陽三焦經

鳴皋曰亦入肺肝二經　介賓曰兼入胆經

昂曰地骨皮能凉血而補正氣故治五內邪熱

熱藥始分而二之蓋謂苗葉味甘苦而氣凉根味甘淡氣寒子味甘氣平氣味既殊功用當別其单用之功列於左

苗 苦寒 時珍曰 甘凉 除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫 大明 和羊肉作羹益人除風明目作飲代茶止渴消熱煩益陽事解麪毒與乳酪相惡汁注目中去風障赤膜昏痛 甄權 去上焦心肺客熱 時珍

地骨皮 斅曰 掘得根東流洗去土捶去心甘草湯浸焙用

苦寒 權曰 甘平 時珍曰 甘淡寒 杲曰 苦辛寒 細剉拌麪煮熟吞之去腎

昂曰能上除頭風頭痛者肝腎同治也肝有熱則自生風與外感之風不同熱退則風自息矣中能平胸脇痛為能清肝也

又曰腸骨者忌杞子中寒者忌地骨皮

又曰亦治欬嗽

介賓曰南產苦甘平北產大苦性劣入藥以南者為佳其性辛寒善入血分肝腎三焦胆經退陰虛血熱凡不因風寒而熱在精髓陰分者最宜此物涼而不峻可理虛勞氣輕而辛故亦清肺假熱者勿用

瀕湖曰瀉白散用之以瀉肺方見桑根白皮發明中

家風益精氣 甄權 去骨熱消渴 孟詵 解骨蒸肌熱消渴風濕痺堅筋骨涼血 元素 治在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸 李杲 瀉腎火降肺中伏火去胞中火退熱補正氣 好古 治上膈吐血煎湯漱口止齒血治骨槽風 吳瑞 治金瘡神驗 陳承 去下焦肝腎虛熱 時珍

發明

弘景曰杞葉作羹小苦補益精氣強盛陰道根實為服食家用甚美名為仙人杖遠有旨乎 蘊

頌曰莖葉及子服之輕身益氣有花實葉根莖作煎或单取子汁煎膏服之者其功並同甚益人也 斅曰其根似物形者為上 時珍曰其苗名天精苦甘而涼上焦心肺客熱者宜之根名地骨甘淡而寒下焦肝腎虛熱者宜之此皆三焦氣分之藥所謂熱淫於內治以甘寒也至於子則甘平而潤性滋而補不能退

熱止能補腎潤肺生精益氣此乃平補之藥所謂精不足者補之以味也分而用之則各有所主合而用之則一舉兩得世人但知用芩連苦寒以治上焦之火知伯苦寒以治下焦之火謂之補陰降火久服致傷元氣而不知杞子地骨皮甘寒平補使精氣充而邪火自退之妙予嘗以青蒿佐地骨皮退熱屢有殊功人所未喻者苗及根皮

俱能制硫黃丹砂伏砒石

方

枸杞煎 治虛勞退虛熱輕身益氣令人一切癰疽永不發用枸杞十斤春用莖葉秋冬用根實搗碎砂鍋熬膏如錫每酒服一合　千金

地骨酒 壯精骨補精髓延年地骨皮生地菊花各一斤搗碎以水一石煮汁五斗炊糯米五斗麴拌句如常釀封待熟澄清日飲　聖濟錄

虛勞客熱 地骨皮為末白湯調服有錮疾者勿服　千金

骨蒸煩熱 及一切勞或大病後煩熱並用地仙散地骨皮二兩防風一兩炙草五分每用五錢生薑五片煎服　濟生方

熱勞如燎 地骨

皮二兩柴胡一兩為末每服二錢麥門冬湯下　聖濟摠錄

虛勞苦渴 骨節煩熱或寒熱用地骨皮切五升麥冬三升小麥二升水煮至麥熟去滓每服一升口渴即飲　千金

腎虛腰痛 地骨皮杜仲川萆薢各一斤好酒三斗漬之瓶中密封隔水煮一日任飲之　千金

吐血不止 新地骨皮洗淨擣汁無汁則以水煎汁每服一盞入酒少許食前溫服　簡便

地骨皮為散日〻煎飲　聖濟摠錄

小便出血 新地骨皮洗淨擣汁無汁則以水煎汁每服一盞入酒少許食前溫服　簡便

帶下脉数 地骨皮一斤生地黃五斤酒一斗煮五升日〻服之　千金方

天行赤目 暴腫地骨皮三斤水三斗煮三升去滓入鹽一兩取二升頻洗之　謝道人天竺經

風蟲牙痛 地骨皮醋煎漱之虫即出亦可煎水飲　肘後

口舌糜爛 地骨皮湯治膀胱移熱於小腸上為口糜生瘡潰爛心胃壅熱水穀不下用柴胡地骨各三錢煎服　東垣方

小兒耳疳 生耳後腎疳也地骨皮一味煎湯洗之仍以香油調末塗之　高文　蓼洲閑錄

卆八

地骨皮

郎曰掘鮮者同鮮小薊煎濃浸下痔極效

氣瘻痔瘡 多年不愈者應效散又名托裏散用地骨皮冬月者為末每用紙撚蘸入瘡內頻用生肌生肉更以米飲服二錢日三 外科精義

男子下痔 先用米泔水洗之後摻地骨皮末生肌 衛生寶鑑

婦人陰腫或生瘡 地骨皮煎水頻洗 永類方

癰疽惡瘡 膿血不止地骨皮不拘多少洗刮去粗皮取細白瓤以粗皮同骨煎湯洗令膿血盡以細瓤貼之立效一朝士腹脇間患疽經歲或以地骨皮淋洗出血一二升家人懼欲止之病者曰疽且少快更以淋之用五升許血漸淡乃止以細瓤貼之次日結痂愈 唐慎微本草

鉤刺針即枸杞刺

十三種疔 春上建日采葉夏上建日采枝秋上建日采子冬上建日采根並日乾為末如不得依法采但得一種亦可再以緋繒一塊裹藥牛黃一梧子大鉤棘針三七枚赤小豆七粒為末先於繒上鋪亂髮一鷄子大乃鋪牛黃等藥包作團以髮束定熨斗內炒令沸冷定刮搗為末以一方寸匕合前把末二匕空心酒服二錢半日再服 千金方

瘭

疽出汗 着手足肩背累〻如赤豆用地骨皮桊火赫根葉煮汁煎膏如飴隨意服之 千金

毒瘡 此患急防毒攻心腹杞葉打汁服立瘥 肘後

目濇有翳 杞葉車前葉各二兩搗汁以桑葉裹 陰地一夜取汁點之不過三五度 十便良方

雞眼瘡 地骨皮紅花同研細末傅之即愈 閨閣事宜

杞子 時珍曰酒潤搗爛入藥

甘平堅筋骨耐老除風去虛勞補精氣 治風先治血 孟詵 主心病嗌乾心痛渴而引飲腎病消中 好古 滋腎潤肺明目 時珍

方 金髓煎 杞子摘紅熟者以無灰酒浸之封固兩月足取入沙盆中搗爛濾汁同浸酒入銀鍋慢火熬膏净瓶密收每早服二大匙晚再服積年不輟可以羽化 經驗

四神丸 治腎經虛 杞子 山茱萸

鳴皋曰杞子肝腎二經血分藥

昂曰能生精助陽利大小腸〻滑者勿用

又曰亦能清肝

不實曰此物微助陽而無動性用以助𤍠地最妙善補勞傷尤止消渴真陰虛而臍腹疼痛不止者多用神效

子接曰得杜仲萆薢治腎虛腰痛得青鹽川椒治肝虛目暗

鳴皋曰｜｜汁紅飃酸脂故能入血分而補血活血也汁點目赤翳神效者亦活血散瘀之功前人之論所不及

七十九

〔中梓曰〕｜｜平而不熱有補水制火之能與地黃同功而除蒸者未嘗用之惜哉

〔好古曰〕入足厥陰肝足少陰腎經氣分

〔中梓曰〕酸屬東方而功多在北方者乙癸同源也〇肝為乙木腎為癸水

〔希雍曰〕其治心下邪氣腸胃風邪寒熱頭風二氣鼻塞者皆肝腎二經所主之病二經虛熱故見前症經曰諸風眩掉皆屬肝此藥溫能通行辛能走散酸能入肝而斂虛熱風邪消散則心下腸胃寒熱自除頭目亦清利而鼻塞等症亦愈也肝腎在下

損眼目昏花或雲翳遮睛｜｜一斤好酒浸透分四分四兩用川椒一兩炒四兩用小茴一兩炒四兩用脂麻一兩炒四兩用川楝子肉一兩炒楝出｜｜加熟地白朮茯苓各一兩為末蜜丸日服　瑞竹堂

肝虛下淚｜｜浸無灰酒飲

目赤生翳｜｜搗汁日點三五次神效　肘後

面黑皯皰｜｜十斤生地三斤為末每服方寸匕溫酒下日三服久則童顏　聖惠

注夏虛病｜｜五味子滾水泡透代茶　攝生方

山茱萸

又名蜀酸棗本經　肉棗綱目　魁實同上　雞足吳普　鼠矢同上

〔集解〕〔頌曰〕木高丈葉似榆花白色雷斅言雀兒蘇真相似只是核八棱為異〔時珍曰〕雀兒蘇即胡頹子也

實酸平〔別錄曰〕微溫　治心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痹去

居至陰之位非得溫暖之氣則孤陰無以生此藥正入二經氣分溫而補酸而斂故精氣益而陰強也精益則五臟自安九竅自利又腎與膀胱為表裏膀胱虛寒則小便不禁耳為腎之外竅腎虛則耳聾肝虛則邪熱客之而目黃二經受寒邪則為疝瘕二臟受補則諸症可瘳矣〇〔嘷皋曰〕繆氏所論前列諸症是肝腎二經所主者可用非二經所主者不可泥也

〔希雍曰〕命門火熾者忌之膀胱熱結小便不利者不宜用陰虛血熱不宜用欲用宜同黃柏

〔昂曰〕聖劑云如何濇劑以通九竅經疏云精氣充則九竅利矣｜｜｜通九竅古今疑之得經疏一言而意旨豁如〔又曰〕別錄甄權皆言發汗酸收之劑何以反發汗恐誤

〔介賓曰〕亦能止帶濁節小便調經收血

〔希雍曰〕同兔絲蓯蓉巴戟鹿茸牛膝白膠車前杞子地黃沙苑麥冬能添精固髓

三蟲久服輕身 本經 腸胃風邪寒熱疝瘕頭風〻氣去來鼻塞目黃耳聾面皰下氣出汗強陰益精安五臟通九竅止小便利久服明目 別錄 治腦骨痛療耳鳴補腎氣興陽道堅陰莖添精髓止老人尿不節治面上瘡能發汗止月水不定 甄權 暖腰膝助水臟除一切風逐一切氣破癥結治酒皶 大明 溫肝 元素

〔之才曰〕蓼實為之使惡桔梗防風防己〔斅曰〕酒潤去核一斤只取四兩烘乾用核能滑精不可服

發明〔好古曰〕滑則氣脫澀劑所以收之｜｜｜止小便利秘精氣取其酸澀以收滑也仲景八味丸用之為君其性味可知矣

山茱萸 酸棗仁

八十

同人參五味牡蠣益智治老人小便淋澁及遺尿　同人乳沙苑熟地人參麥冬牛膝菊花治腦骨痛腦為髓海髓足則腦痛自除　同石菖甘菊地黃〻柏五味治腎虛耳聾　入六味丸為腎虛而有濕熱者所須

時珍曰足厥陰肝少陽胆藥

鳴皐曰雖係肝藥亦自入心而補心

昂曰炒熟則香能醒脾故歸脾湯用之

昂曰經疏云凡服固表藥而汗不止者用棗仁炒香同生地黃白芍五味麥冬竹葉桂圓肉煎服多效汗為心液故也又曰心君易動皆由胆怯所致經曰十一官皆取

方　草還丹　益元陽補元氣固元精壯元神乃延年嗣續之藥也｜｜｜酒浸取肉一斤破故紙酒浸炒半斤當歸四両射香一錢為末蜜丸梧子大每服八十一丸臨卧塩湯下或酒下　吴旻扶壽方

鳴皐曰一老人浮腫小便不利百治不效一醫用八味加車前牛膝丸服而愈可為｜｜｜利竅之明証但病不在肝腎虛者似非所宜腎為二便關闔腎氣虛故送小便不出山萸収斂腎氣腎氣旺則送出矣故云利小便也

酸棗　又名樲爾雅　山棗

酸平　宗奭曰微熱　時珍曰棗仁味甘氣平　治心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痺久服安五臟本經　心煩不得眠臍上下痛血

決於胆棗仁補胆故寧心

轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令人肥健別錄筋骨風炒仁研湯服甄權

之才曰惡防己

發明恭曰本經用實療不得眠不言用仁今方皆用仁補中益肝堅筋骨助陰氣皆酸棗仁之功也宗奭曰酸棗經不言用仁今則天下皆用仁志曰按五代史後唐刊石藥驗云酸棗仁睡多生用不得睡炒熟用陶云食之醒睡而經云治不得眠盖其子肉味酸食之使不思睡核中仁服之治不得眠正如麻黄發汗根節止汗也時珍曰酸棗實味酸性收故主肝病寒熱結氣酸痺久泄臍下滿痛之症其仁甘而潤故熟用治胆虛不得眠煩渴虛汗之症生用治胆熱好眠皆足厥陰少陽藥也今人以為心家藥殊昧此理

昂曰治胆虛不眠温胆湯中或加用之肝虛則胆亦虛肝不藏魂則不寐血不歸脾則卧不安金匱治虛勞虛煩不眠用酸棗仁湯棗仁二升炙草一兩知母川芎茯苓各二兩深師加生薑二兩此補肝之劑經曰卧則血歸於肝二方棗仁並生用豈以煮過便為熟乎又曰又治胆熱好眠胆熱必心煩口苦何反能好眠乎温胆湯治不眠用二陳加竹茹只實皆涼藥乃以涼肺胃之熱非以温胆經之寒也其以温胆名者以胆欲不寒不燥當温為候耳胆熱好眠四字不能無疑也

鳴皋曰胆為甲木胆熱則木尅脾土脾受尅則倦而好眠棗仁非治胆熱其或為醒脾之效乎

好古曰肝經氣分藥時珍曰子能令母實故兼補腎

蝭母即知母

方

胆風沉睡 胆風毒氣虛實不調昏沉多睡用酸棗仁一兩生用全挺臘茶二兩以生薑汁塗炙微焦為散每服二錢水七分煎六分温服 簡要濟衆方

胆虛不眠 心多驚悸用酸棗仁一兩炒香搗末每服二錢竹葉湯下○和劑加人參一兩辰沙半兩乳香二錢半蜜丸服

振悸不眠 胡洽方酸棗仁湯用酸棗仁二升伏苓白术人參甘草各二兩生薑六兩水八升煮三升温服 見圖經

虛煩不眠 深師方酸棗仁湯用酸棗仁二升蝭母乾薑茯苓川芎各二兩炙草一兩水一斗先煮棗仁減三升乃同煮取三升分服 圖經本草

骨蒸不眠 心煩用棗仁一兩水二盞研絞取汁下粳米二合煮粥候熟下地黃汁一合再煮匀食 聖惠方

睡中汗出 酸棗仁人參茯苓等分為末每服一錢 簡便方

杜仲 又名思仲 別錄 思仙 本經 木綿 吳普 櫋 時珍

時珍曰有杜仲服此得道因以名之思仲思仙皆由

昂曰按腰痛不已者屬腎虛痛有定處屬死血往來走痛者屬痰腰冷身重遇寒即發者屬寒濕或痛或止屬濕熱而其原多本於腎虛以腰者腎之府也鳴皋曰往來走痛亦有屬肝氣者

介賓曰治腰痛有殊功療足痛見立效肉熱火盛者亦當緩用

希雍曰腎虛火熾者用當與知柏同入

又曰同牛膝杞子川斷白膠地黃五味兎絲黃柏山藥治腎虛腰痛及下部軟弱無力

此
義

皮辛平〔別録曰〕甘溫〔甄權曰〕苦煖 治腰膝痛補中益精氣堅筋骨强志除陰下濕癢小便餘瀝久服輕身耐老本經 治腳中酸痛不欲踐地別録 治腎勞腰脊攣大明 腎冷腰痛人虛而身强直風也腰不利加而用之甄權 能使筋骨相着李杲 潤肝燥補肝經風虛好古

〔之才曰〕惡元參蛇蛻〔斅曰〕削去粗皮每斤用酥一兩蜜三兩和塗炙以盡為度細剉用

發明〔時珍曰〕丨丨古方只知滋腎惟王好古言是肝經氣分藥潤肝燥補肝虛發昔人所未發也蓋肝主筋腎主骨腎充則骨强肝充則筋健屈伸利用皆屬於筋丨丨色紫而潤味甘微辛其氣溫辛甘溫

〔昂曰〕此二藥大補腎氣托住胎元則不墜

能補嵌辛能潤故能入肝而補腎子能令母實也一
少年新娶後得脚軟病痛甚醫作脚氣治不效孫琳
診之用｜｜一味寸斷片折每以一兩用半酒半水
一大盞煎服三日能行又三日全愈琳曰此乃腎虛
非脚氣也｜｜能治腰

方

青娥丸 方見補骨脂下 腎虛腰痛 崔元亮海上方用｜｜去皮炙黃一斤分
十劑每夜取一劑水一升浸至五更煎三分減一取
汁入羊腎三四个切再煮三五沸如作羹法和以椒
鹽空腹頓服○聖惠入薤白
七莖○篋中方加五味子 風冷傷腎 腰背虛痛｜｜一斤切炒
酒二升漬十日：服三合此陶隱居得
效方也○三因方為末每旦酒服二錢 病後虛汗及目
中流汁｜｜牡蠣等分為末卧時
水服四五錢不止更服 肘後 頻慣墮胎 受孕一兩月用
｜｜八兩糯米湯浸透炒去絲續斷二兩酒浸山藥
為糊丸或棗肉為丸梧子大糯米飲下五十丸 楊

〔馮采曰〕｜｜腎經藥

〔張介賓曰〕味苦性凉陰也降也養陰氣平陰火解煩熱骨蒸止虛汗消渴及淋濁崩漏便血尿血陰瘡痔漏疼痛清肝火明目止淚

〔希雍曰〕甘寒凉血益血之藥入足少陰經蓋腎水本寒因虛而熱而軟此藥氣味俱陰正入腎除熱補精之要品〔又曰〕此藥有變白明目之功累試輒驗經文不載為闕略也

起簡
便

女貞 又名貞木（山海經）蠟樹〔時珍曰〕琴操載魯有處女見｜｜木而作歌者此也近時以放蠟虫故又名蠟樹

集解〔時珍曰〕｜｜冬青一類二種｜｜葉長子黑色冬青葉微圓子紅色為異耳〔又曰〕｜｜綱目亦名冬青今方書所用冬青皆｜｜也

子苦平〔時珍曰〕溫 補中安五臟養精神除百病久服肥健輕身不老 本經 強陰健腰膝變白髮明目 時珍

發明〔時珍曰〕｜｜子乃上品妙藥古方罕用何哉典術｜｜木乃少陰之精故冬不落葉觀此則其益腎之功尤可推矣世傳｜｜丹方云｜｜子酒浸一日夜布袋擦去皮日乾為末待旱蓮草出多取數

又曰同地黃首烏人參麥冬旱蓮草牛膝
杞子山藥桑椹黃柏椒紅蓮須為變白要
藥　同甘菊生地蒺藜杞子能明目

石搗汁熬濃膏和丸梧子大每夜酒送百丸不旬日
間脊力倍加老者即不夜起又能變白髮為黑強腰
膝起
陰氣

方　虛損百病｜｜子酒蒸晒乾二十兩桑椹乾十
兩旱蓮草十兩蜜丸如四月即搗桑
椹汁七月即搗旱蓮汁和藥即不必用蜜
每服七八十丸鹽湯送下　見簡便方　風熱赤眼
｜｜子搗汁煎膏瓶收埋地
中七日每用點眼　濟急

葉微苦平除風散血消腫定痛治頭目昏痛諸惡瘡
腫胻臁潰爛久者以水煮乘熱貼之頻換醋煮亦可
口舌生瘡舌脹出搗汁含漱吐涎　時珍

方　風熱赤眼｜｜葉五斗搗汁浸新磚數片五日
掘坑架磚於內蓋之日久生霜刮下

入龍腦少｜｜葉研爛入朴硝貼
許點之　一切眼疾之海上方也　保普濟

楮

又名穀音媾亦作𥠖詩疏穀桑【頌曰】陸佃詩疏
云構幽州謂之穀桑或曰楮桑荊揚交廣謂之穀
【恭曰】｜有二種一皮有花斑文謂之斑穀今
集解　人用皮為冠者一皮白無花枝葉大相數但
取其葉似蒲萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏
生大如彈丸青綠色至六七月漸深紅色八九月
采水浸去皮瓤取中子陸氏詩疏云南人績其皮
以為布又擣以為紙甚好【大明曰】皮斑者是｜皮
白者是穀【時珍曰】按說文｜穀乃一種不必分別
惟辨雌雄耳雄者皮斑而葉無椏叉三月開花成
穗如柳不結子雌者皮白葉有椏叉亦開碎花結
子如楊梅二種並易生葉多澀毛南人剝皮擣煮
作紙亦緝練為
布不堅易朽

【鴻泉曰】細繹｜｜之功用不過消腫利水 ｜｜亦名穀實楮桃
耳時珍既引軟骨之說則益氣補虛之說

實　甘寒治陰痿水腫益氣充肌明目 別錄 **壯筋骨助**

楮實

八十四

不可泥也

陽氣補虛勞健腰膝益顏色大〔斅曰〕水浸去浮者
明 酒蒸焙乾用〇經
驗方六月六日取穀子五升水
一斗煮五升去渣熬膏如餳用
發明〔頌曰〕仙方單服其實正赤時收子陰乾篩末水
服二錢匕久乃益佳〔時珍曰〕別錄言｜｜功用
大補益而修真秘旨言久服令人成骨軟之病濟生
秘覽治骨鯁用｜｜煎湯服豈非軟骨之徵乎按南
唐書云烈祖食飴喉中噎國醫莫能愈吳廷紹請進
｜｜湯一服疾如失羣醫他日取用皆不驗扣之答
曰噎因甘起故以此治之愚謂此乃治
骨鯁軟堅之義耳治他噎故不驗也
方 水氣蠱脹｜｜一斗水二斗熬成膏茯苓三兩
白丁香一兩半為末以膏和丸梧子
大從少至多服至小便利脹減為度後服治中
湯調養忌甘苦峻補發動之物 活法机要 肝熱
生翳｜｜研細食後蜜湯
服一錢日二 直指 身面石疽狀如痤癤而皮
厚｜｜擣傳

外臺
金瘡出血｜｜搗傳之 同上

白皮 甘平逐水利小便 別錄 治水腫氣滿 甄權 喉痺 吳普 煮汁釀酒飲治水腫入腹短氣咳嗽為散服治下血血崩 時珍

方 血痢血崩 楮白皮荊芥等分為末冷醋調服一錢匕神效不可具述 危氏得效方

風水腫浮 一身盡浮楮白皮散用楮白皮豬苓木通各二錢桑白皮三錢陳橘皮一錢生薑三片水二鍾煎服日一劑 聖濟

魚骨鯁咽 楮樹嫩皮搗爛為丸水下二三十丸 衛生易簡方

桵音蕤

蕤仁 又名蕤核 本經 白桵 爾雅

集解 別錄曰蕤核生函谷及巴西 弘景曰今出彭城大如烏頭形圓而匾有文理狀似胡桃核

〔昂曰〕入心脾肝三經消風散熱益水生光
〔又曰〕三經皆血臟也血得其養則目疾平
凡目病在表當疏風清熱在裡屬腎虛血
少神勞宜補腎養血安神遠視為腎水虧
近視為火不足
〔鴻案曰〕當斆所說製法當是服藥如此服
食當不爾也

破取仁用〔保昇曰〕今出雍州葉細似枸杞而狹長
化白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺五
六月熟采實〔頌曰〕今河東并州亦有之木高五七
尺莖間有刺〔時珍曰〕郭璞云白桵小木也叢生有
刺實如耳璫紫
赤可食即此也

甘溫〔別錄曰〕微寒 治心腹邪熱結氣明目〻赤痛傷淚出
目腫眥爛久服益氣本經 強志明耳目吳普 破心下結痰
痞氣鼻齆別錄 治鼻衄生治足睡熱治不眠藏器 〔斆曰〕凡使
丨丨以湯浸去皮尖擘作兩片每四兩用芒硝
一兩木通七兩同煮一伏時取仁研膏入藥

發明〔弘景曰〕醫方惟以治眼仙經以合守中丸也〔頌
曰〕按劉禹錫傳信方所著治眼法最奇云眼風
癢或生翳或赤皆一切皆主之宣州黃連末丨丨去
皮研膏等分和勻取不蛀乾棗二枚割下頭去核以

時珍曰能通腎氣

二物填滿却以割下頭合定用少薄綿裹之大茶鍾
盛於銀器中文武火煎取一鷄子大以綿濾罐收點
眼萬〻不失前後試驗數十
人皆應今醫家亦多用得效

方 春雪膏治肝虛風熱上攻眼目昏暗痛癢隱澀
赤腫羞明迎風流淚黑花｜｜去皮壓
去油二兩龍腦二錢半研勻
生蜜六錢和收點眼 和劑
取膜翳｜｜一兩去油
入硼沙一錢射
香二錢研勻收之
去翳妙不可言
百點膏治一切目疾｜｜去油三
錢甘草防風各六錢川連
五錢以三味熬取濃汁次下
｜｜膏日點 孫氏集效
赤爛眼｜｜杏仁各一
兩去皮尖研勻
入膩粉少許為丸每用
熱湯化洗 經驗良方

柘 宗奭曰｜木裏有紋可旋為器葉可飼蠶然葉
硬不及桑入藥以無刺者良 時珍曰處〻山中
有之喜叢生幹踈而直葉厚團而有尖飼蚕取
絲作琴瑟清響勝常其實狀如桑子而圓粒如

〔好古曰〕入手太陰肺經

椒其木染黃赤色謂之丨黃

木白皮東行根白皮　甘温治崩中血結瘧疾大明醸酒服主風虚耳聾補損虚羸夢與人交泄精者蔵器

發明〔時珍曰〕丨能通腎氣聖惠治耳聾二十年者有丨根酒丨根二十斤菖蒲五斗水一石煮取汁五斗故鉄二十斤煅赤水五斗浸取清合水一石五斗用米二石麹二斗醸酒成用真磁石三斤為末浸酒中三宿日夜飲之取小醉而眠聞人聲乃止

方　洗目令明丨木煎湯日洗甚效　海上方

桑根白皮〔別録曰〕出土上者殺人〔時珍曰〕根見土上者名馬頷殺人旁行出土者名伏蛇亦有毒而治心痛

〔昂曰〕能散瘀血故治崩中唾血能降氣故
治欬滿止霍亂
〔希雍曰〕得二冬欵冬百部薄荷甘草沙參
貝母枇杷葉五味子為治嗽要藥　得芍
藥苡仁木瓜茯苓橘皮赤小豆為治水腫
之神劑
〔子接曰〕得地骨皮瀉肺得白茯苓利水得
糯米阿膠治咳嗽吐血

甘寒〔昂曰〕甘辛　寒〔權曰〕平　治傷中五勞六極羸瘦崩中絕脉補
虛益氣 本經 去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利
水道去寸白可以縫金瘡 別錄 治肺氣欬滿虛勞客熱
頭痛內補不足 甄權 煮汁飲利五臟入散用下一切風
氣水氣 孟詵 調中下氣消痰止渴開胃下食殺腹臟蟲
止霍亂吐瀉研汁治小兒天吊驚癇客忤及傅鵞口
瘡大驗 大明 瀉肺利大小腸降氣散血 時珍
〔之才曰〕續斷桂心麻子為之使〔斆曰〕忌鉄及鉛凡使
采十年以上向東嫩根銅刀刮去薄皮取白皮用皮
中涎勿去力
俱在涎也

桒白皮 皮中白汁

發明〔杲曰〕｜｜｜甘以固元氣之不足而補虛辛以瀉肺氣之有餘而止嗽又云｜｜｜瀉肺然性不純良不宜多用〔時珍曰〕｜｜｜長於利小便乃實則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜之十劑云燥可去濕｜｜｜赤小豆之屬是也錢乙治肺氣熱盛欬嗽而後喘面腫身熱瀉白散用｜｜｜炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒半兩每服二錢入粳米百粒水煎食後溫服｜｜｜地骨皮皆能瀉火從小便去甘草瀉火而緩中粳米清肺而養血此乃瀉肺諸方之準繩也羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣瀉邪所以補正也若肺虛而小便利者不宜用之〔頌曰〕｜｜｜作線縫金瘡腸出更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用此法而愈

方 欬嗽吐血 鮮｜｜｜米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾為末每服一錢米飲下經驗 產後下血 炙｜｜｜煮水飲之肘後 血露不絕 鋸截桑根取屑

鳴皋曰牛皮膠最能軟堅一婦乳腫硬而木醫不能治或教以真牛皮膠頻傅即軟而消人莫解其理予曰腸胃結滯大黃巴豆莫能消何以霞天膏能消之乎即此理也

鳴皋曰一一足少陰腎經藥

鳴皋曰一一色黑故益腎水色帶紫故入血分古人皆言其性涼實則生搗汁飲則涼熬膏則溫也惟其入血分故滑腸之結

五指撮醇酒服之日三服 肘後方 墜馬損傷一一止瘀散 煎膏傅之便痛 經驗後方

髮脫一一煎水頻洗 脾熱也胸膈有痰自不脫也 聖惠 小兒流涎一一搗自然汁飲少許甚效 聖惠方 驚癇天吊 一一東行根取汁服 聖惠方 小兒火丹一一一一煮洗 千金 石癰堅硬 不作膿者 蜀一一陰乾為末烊膠和酒調傅以軟為度 千金方

皮中白汁小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金刃傷燥痛須臾血止仍以白皮裹之甚良 蘇頌 塗蜈蚣蜘蛛傷有驗 時珍

桑椹 一名文武實 甘平單食止消渴 蘊恭 利五臟關節痛血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明 藏器 搗汁飲解中酒

燥者宜之惟其益腎水故亦能明目

葚釀酒服利水氣消腫 時珍

發明 宗奭曰 本經言桑甚詳而獨遺｜｜桑之精英盡在於此濾汁熬膏入瓷器收貯每用一二錢夜臥以沸湯點服治服金石發熱口渴生精神及小腸熱其性微凉故也酒服亦良 時珍曰 ｜｜有紫白二種楊氏産乳云孩子不得與｜｜令兒心寒而陸機詩疏云鳩食｜｜多則醉傷其性何耶四時月令云四月宜飲｜｜酒能理百種風熱其法用｜｜汁三斗重湯煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑一合瓶收每以一合和酒飲之和入燒酒藏之經年彌佳

方 水腫脹滿 水不下則滿溢水下則虛竭還脹十無一活宜用｜｜治之桑白皮切以水二斗煮汁一斗入｜｜再煮取五升以糯米五升造酒飲 普濟方 小兒赤禿 ｜｜汁頻服 ｜｜入罌中曝三七日化為 千金 小兒白禿 水洗之三七日神效 聖濟 拔白變

時珍曰手足陽明大腸胃藥

昂曰能涼血燥濕

手揆曰得麥冬治勞熱得生地阿膠石膏枇杷葉治肺燥咳嗽

時珍曰桑葉大如掌而厚者為白桑葉赤葉諸漸青為?辛

黑——一斤蝌蚪一斤瓶盛封閉懸屋東一百日盡化為黑泥以染白髮如漆 陳藏器

瘰癧——熬膏白湯點服 名文武膏 保命集

桑葉苦甘寒有小毒 大明曰家桑葉無毒 除寒熱出汗 本經 煎濃汁服能除脚氣水腫利大小腸 蘇恭 炙熟煎代茶止渴 孟詵 煎飲利五臟通關節下氣嫩葉煎酒服治一切風蒸熟搗署風痛出汗并撲損瘀血接爛塗蛇虫傷 大明 研汁治金瘡及小兒吻瘡煎服治霍亂吐下腹痛亦可以乾葉煮之雖桑葉熬膏服去老風及宿血 藏器 治勞熱咳嗽明目長髮 時珍 汁解蜈蚣毒 別錄

桑椹 桑葉 八十九

昂曰一僧就枕汗出衣被皆透二十年或教采帶露桑葉焙為末米飲下二錢遂愈

發明 頌曰四月桑茂時采葉十月經霜二分已落一分猶存名神仙葉采取與前葉同陰乾為末丸散任服或煎水代茶可常服又霜後葉煮湯淋手足去風痺又微炙和桑皮煎服治痢及金瘡止血 丹溪曰經霜丨丨研末米飲服止盜汗 時珍曰霜丨丨乃手足陽明藥煎汁代茗能止消渴

方 風眼下淚 臘月不落桑葉煎湯日洗 集簡 赤白澀痛 丨丨為末紙卷燒烟熏鼻取效此海上方也 普濟方 吐血不止 霜丨丨焙研冷茶下三錢只一服止後用補肝肺藥 小兒渴疾 丨丨逐片塗生蜜懸繫陰乾煎汁代茶 聖濟摠録方 勝金方 霍亂轉筋 入腹丨丨煎一二服立定 聖惠 瘡口不歛 霜丨丨為末傳之 直指 湯火傷 霜丨丨焙存性香油調傳 醫學正傳 手足麻木 霜丨丨煎水頻洗 救急 肺毒風瘡 狀如大風綠雲散丨丨蒸熟日乾為末水調二錢服 經驗方 刀斧傷 丨丨為末

鳴皋曰｜｜之性近桂枝能行四肢故治
脚氣及四肢拘攣但桂枝熱｜｜涼耳性
近桑根皮故亦治嗽利小便但根皮性微
峻而枝性平耳

乾貼之
甚良
桑枝苦平治遍體風癢乾燥行水氣治脚氣風氣四
肢拘攣上氣眼運肺氣咳嗽消食利小便久服聰明
耳目療口乾及癰疽後渴嫩條細切一升炒香煎飲
亦無忌久服終身不患偏風蘇頌燒瀝治大風瘡疥生
眉毛時珍
發明頌曰｜｜不冷不熱可以常服抱朴子言一切
仙藥不得桑煎不服時珍曰煎藥用桑者取其
能利關節除風寒濕痺諸痛也觀靈樞治寒痺內熱
用桂酒法以桑炭炙布熨痺處治口僻用馬膏法以
桑鉤丶其口及生桑灰上皆取此意也又癰疽發背
不起發或瘀肉不腐潰及陰瘡瘰癧流注臁瘡惡瘡

昂曰——能養津液行水釀酒服甚良

鳴皋曰昔年 老母患臂痛五六年作痰治風治養血舒筋悉不愈一人傳方用——熬膏服之遂愈又一老婦患臂痛十餘年 老母以此方授之亦服之而愈蓋因熱傷筋者多效亦有去風之能

久不愈者用桑木炙法未潰則拔毒止痛已潰則補益元氣亦取通關節去風寒火性暢達出鬱毒之意其法以乾桑木劈成細片紮作小把然火吹息炙患處每吹炙片時以瘀肉腐動為度内服補托藥誠良方也又趙溍養疴漫筆云越州一學録少年苦嗽百藥不效或令取南向柔桑條一束每條寸折納鍋中以水五椀煎至一椀盛瓦器中渴即飲之服一月而愈此亦——煎之變法耳

方 水氣脚氣——二兩炒香以水一升煎二合每日空腹服之亦無禁忌 聖濟總録

風熱臂痛——一升切炒水三升煎二升一日服盡許叔微云常病臂痛諸藥不效服此遂愈 本事方

破傷中風——燒灘好酒對和溫服以醉為度醒服消風散 摘元方

癜風——十斤益母草三斤熬成膏臥時溫酒服半合 聖惠

桑柴灰

辛寒有小毒蒸淋取汁為煎與冬灰等分同

滅瘢痕黑子蝕惡肉煮小豆食大下水腫脹傅金瘡止血生肌藕菾桑霜治噎嗝積塊時珍淋汁入鍊五金家可結汞伏硇五洗

方洗青盲目|||煎湯澄清溫洗一方以童便和作丸泡湯澄清洗龍木論

尸疰鬼疰其病變動有三十六種至九十九種使人寒熱恍惚默默不知所苦累年積月以至於死死復傳親人宜急治之用桑白皮燒灰二斗瓶中蒸透以釜中水淋之又淋取濃汁澄清止取二斗以漬赤小豆三斗漬一夜晒乾復漬灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊肉或鹿肉作羹進此豆飯初食一升至二升取飽病淺者三四斗愈深者七八斗愈病去時體中自覺痛痒淫淫若根本不盡再為之神效方也肘後

痃癖氣塊癥瘕用大鱉一个蚕沙一斗|||一斗淋濃汁同煮如泥去骨再煮成膏丸梧子

鳴皋曰｜｜｜寄生桑上爲能拔取此一樹之精也綱目之集觧紛如形狀不一或云是鳥食物子隨糞落於桑上而生或云是感造化之氣別是一物大約是鳥糞中落子而生者爲近是余在江南曾得二枝俱是冬青蓋雀食冬青落子而生者若得以桑寄桑則更妙殊不可得

宗奭曰｜｜｜真者下咽必驗如神

時珍曰必自採或連桑採者乃可用他樹寄生服之反有害也

介賓曰味苦性涼主女子血熱崩漏

大每服十九日三服 聖惠

身面水腫｜｜｜淋汁煮赤小豆飽食不得吃湯飲 梅師

金瘡｜｜｜傅之 同上

瘡傷風水｜｜｜淋汁漬之 同上

大風惡疾眉毛脫落｜｜｜淋汁洗頭面次用熱水綠豆粉濯之頭三日一洗頭一日一洗面不過十度愈 聖惠

風白屑｜｜｜淋汁沐之神效 同上

桑寄生

又名寄屑 本經 寓木 同上 宛童 同上 蔦

苦平治腰痛小兒背強癰腫充肌膚堅髮齒長鬚眉安胎 本經 去女子崩中内傷不足產後餘疾下乳汁主金瘡去痺 別錄 助筋骨益血脉 大明 主懷妊漏血不止令胎牢固 甄權

斆曰采得陰乾剉用勿見火

〔昂曰〕苦堅腎甘益血外科用之散瘡瘍追風濕

〔希雍曰〕同杞子地黃川斷胡麻首烏當歸牛膝治血虛手臂骨節痛 入獨活寄生湯治一切風濕痺

〔希雍曰〕入足厥陰肝少陰腎二經

實甘平明目輕身通神 本經

方

膈氣 生｜｜｜搗汁一盞服 集簡方

胎動腹痛 ｜｜｜一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩水煎溫服或去艾葉 聖惠

毒痢膿血 六脉微小並無寒熱宜｜｜｜二兩防風二錢半大芎二錢半炙草三銖為末每服二錢水一盞煎八分和渣服 楊子健護命方

下血後虛 下血止後但覺丹田元氣虛乏腰膝沉重無力｜｜｜為末每服一錢白湯服：無時 同上

石南 又名風藥

集解 〔恭曰〕葉似茵草凌冬不凋關中者葉細為好江南者葉長大如枇杷葉無氣味不任用〔宗奭曰〕似枇杷葉之小者背無毛面不皺

葉辛苦平有毒養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛 本經 療

脚弱五臓邪氣除熱女子不可久服令思男別録能添腎氣治軟脚煩悶疼痛殺虫遂諸風甄權浸酒飲治頭風時珍

之才曰五加皮為使悪小薊

發明恭曰——葉為療風邪丸散之要權曰雖能養腎亦令人陰痿時珍曰古方為治風痺腎弱要藥令人絶不知用識者亦少盖由甄氏藥性論有令人陰痿之説也殊不知服此藥者能令腎强嗜欲之人藉此放恣以致痿弱歸咎於藥良可嘅矣

方 小兒通睛小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致瞳人不正觀東則見西觀西則見東宜——散吹鼻通項——葉一兩黎蘆三分瓜丁五七个為末毎吹少許入日三度内服牛黄平肝

昂曰——補陰祛風則有之然味辛不熱不助相火亦未聞春方中用之者別録思男之説未可信

希雍曰同巴戟肉蓯容瑣陽鹿茸杞子山萸治腎經虚寒精滑精冷　同疾黎菜葉首烏淫羊藿巴戟五加皮兎絲威靈仙虎骨治肝腎為風寒濕所乘以致痺弱不能行

又曰腎虚而陽道數擧者不宜用足弱由於肝腎虚而不由於風寒濕客於下部者不宜用

杲曰入手太陰肺經血分昂曰色赤入心
輕飄象肺故亦入肺經
希雍曰亦入足陽明胃經

濟方

巵子 又名木丹本經 越桃別錄 鮮支綱目 花名薝蔔時珍曰佛書稱其花為薝蔔或云薝蔔金色非也

集解 弘景曰有兩三種小異以七棱者為良亦入染家用 頌曰入藥用山丨丨方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七棱至九稜者佳大而長者雷氏炮炙論謂之伏尸丨丨入藥無力

苦寒 別錄曰大寒 治五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍本經 治目赤熱痛胸心大小腸大熱心中煩悶別錄 去熱毒風除時疾熱解五種黃病利五淋通小便解消渴明目主中惡殺疰蟲毒甄權 解玉支毒羊躑躅也 弘景 主瘖啞紫癜風孟詵 治心煩懊憹不得眠臍下血滯

昂曰最清胃脘之血炒黑末服本草滙云
治實火之血順氣為先氣行則血自歸經
治虛火之血養正為先氣壯則自能攝血
丹溪云治血不可單行單止不可純用寒
涼
昂曰生用瀉火炒黑止血薑汁炒止煩嘔
內熱用仁表熱用皮丹溪曰治上焦中焦
連殼用治下焦去殼洗去黃漿炒用治血
病炒黑用
昂曰心痛而厥有寒熱二種熱厥宜之
丹溪曰凡心痛當分新久若初起因寒因
食宜溫散久則鬱而為熱若用溫藥反助
痛添病故古方多用｜｜為君熱藥為之
嚮導此病雖日久不食不死若痛止恣食
病必再作
希雍曰｜｜苦寒損胃而傷血脾胃虛弱
者忌之血虛發熱者忌之性能瀉有餘之
火心肺無邪熱者不宜用小便不通由于
膀胱虛無氣以化之而非熱結小腸者不
宜用瘡因氣血虛不能收斂則為久冷敗

而小便不利元素瀉三焦火清胃脘血治熱厥心痛解
熱鬱行結氣震亨治吐血衄血〻痢下血〻淋損傷瘀
血及傷寒勞復熱厥頭痛疝氣湯火傷時珍
發明元素曰｜｜輕飄而象肺色赤而象火故能瀉
肺中之火其用有四瀉心經客熱一也除煩燥
二也去上焦虛熱三也治風四也震亨曰｜｜瀉三
焦之火及痞塊中火邪最清胃脘之血其性屈曲下
行能降火從小便中瀉去凡心痛稍久不宜溫散反
助火邪故古方多用｜｜以導熱藥則邪易伏而病
易退好古曰本草不言｜｜能吐仲景用為吐藥｜
｜本非吐藥為邪氣在上拒而不納食令上吐則邪
因以出所謂其高者因而越之也或用為利小便藥
實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之
府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚
合又與丙合又能泄戊先入中州故也仲景治煩躁

瘡非温脫補益則不愈所謂既潰之後一毫寒藥不可用也世人又以治諸血症不知血得熱則行得寒則凝瘀血凝結則反致寒熱或反發熱勞嗽飲食減少治吐血之法以順氣為先蓋血隨氣而行氣降則火降血自歸經矣此治療之要法也

〔鳴皋曰〕繆氏謂血症不得用凉藥亦一偏之見有邪熱迫血逆行者十居大半不過黃連龍胆等寒而凝滞者宜斟忌他如大黃芩柏等藥尚須用之何況卮子乎如必不用凉藥任邪火熇燎逼血不止不所傷更多耶如云血得寒則凝喻氏用當歸龍薈丸治經脉不行者則又何說也至于順氣一語自有至理不可易也大抵治病不可有偏見古人之説貯之胸中而不泥斯良醫矣如謂治吐血必須凉藥則又誤景岳用桂附治吐血法皋又嘗用之而得效焉

〔鳴皋曰〕｜｜之寒或配以生薑或配以川烏白芷或用酒九此古人之妙用

用｜｜豉湯煩者氣也躁者血也氣主肺躁主血故用｜｜以治肺煩香豉以治腎躁〔杲曰〕仲景以｜｜色赤味苦入心而治煩香豉色黑味鹹入腎而治躁

〔宗奭曰〕仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹｜｜豉湯治之因其虛故不用大黃有寒毒故也｜｜雖寒而無毒治胃中熱氣既亡血亡津液臟腑無潤養內生虛熱非此物不能去也又治心經留熱小便赤澀用去皮｜｜火煨大黃連翹炙甘草等分為末水煎三錢服無不利也

〔頌曰〕仲景及古今名醫治發黃皆用｜｜茵陳甘草香鼓四物作湯飲又治大病後勞復皆用｜｜鼠矢等湯利小便而愈其方極多不可悉載

方

衄血｜｜燒末吹之屢用有效　黎氏易簡方

血淋澀痛生｜｜末滑石等分葱湯下　經驗良方

熱毒血痢｜｜十四枚去皮擣末蜜丸梧子大每服三九日三服大效亦可水煎服　肘後

臨產下痢｜｜炒研末空心熱酒服一匙甚者不過五服　勝金

婦

鳴皋曰火痛一方用之宜審施之寒痛則悖矣

介賓曰同枳朴除煩滿同生薑陳皮除嘔噦同延胡索破熱滯瘀血腹痛

中梓曰古方治心痛多用丨丨此為火氣上逆不得下降者設令人泥丹溪之說重寒者何以堪之

鳴皋曰吃飯直出一方所謂邪熱不殺穀也用之宜審

人胎腫 屬濕熱丨丨一合炒研每服二三錢米飲下 丹溪方

熱水腫疾 丨丨仁炒研米飲服三錢若上焦熱者連皮用 同上

冷熱腹痛 瘡刺不思飲食丨丨川烏頭等分生研為末酒丸梧子大每服十五丸薑湯下小腹痛小茴湯下 博濟

胃脘火痛 大山丨丨七枚或九枚炒水一盞煎七分入生薑汁飲之立止復發者必不效用元明粉一錢服之立止 丹溪

五臟諸氣 益少陰血丨丨炒研末生薑同煎飲之甚捷 同上

熱病食復及交接後發動 欲死不能語丨丨三十枚水三升煎一升服令微汗 閻氏集效方

盤腸釣氣 丨丨仁半兩草烏頭少許同炒過去草烏入香白芷一錢為末每服半錢茴香葱白酒下 普濟

折傷腫痛 丨丨白麪同搗傳之甚效 集簡方

眉中練癬 丨丨炒黑研和油塗之 保幼大全方

霍亂轉筋 心腹脹滿未得吐下丨丨二七枚炒研熱酒服之立效 肘後方

喫飯直出

好古曰入足太陽少陰經膀胱腎
昂曰茯苓走氣分||此說不盡然走血分

昂曰瘧多由暑〻必兼濕經曰夏傷於暑
秋必痎瘧
鶴皋曰治傷寒溫疫大熱汪昂云大熱利
小便亦分消之意此說宜審傷寒或可用
溫疫用之害不旋踵蓋瘟疫全是一團邪
火爍灼津液此時利其小便斷利他不動
反使火邪隨藥引入膀胱成癃閉者多矣
惟宜先泄其火以救陰俟火邪退已渴半
方可利小便
昂曰仲景五苓散為治水之総劑經云膀
胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

||二十枚去皮微炒
水煎服　怪症奇方

豬苓　又名豭豬矢 本經 豕橐 莊子 地烏桃 圖經

集解　弘景曰是楓樹苓皮黑肉白而實者佳去皮
用　頌曰蜀州習州皆有之生土底不必楓根
下始有也　時珍曰||亦是木之
餘氣所結他木皆有楓木為多耳

甘平　普曰神農甘雷公苦
王好古曰甘重於苦　治痎瘧解毒蠱疰利水道

本經　解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹腹滿急痛 甄權 治渴
除濕去心中懊憹 元素 瀉膀胱 好古 開腠理治淋腫脚氣
白濁帶下妊娠子淋胎腫小便不利 時珍　時珍曰||取其行
溫生用
為佳

用肉桂辛熱引入膀胱所以化其氣也除桂名四苓散資生經云五苓散能生津液亦通大便曾世榮治驚風亦用五苓散曰茯苓安心神澤泄利小便小腸利而心氣平木得桂而枯能抑肝而風自息可謂善用五苓矣

發明〔頌曰〕仲景治消渴脉浮小便不利微熱者||散發其汗病欲飲水而復吐名為水逆冬時寒嗽如瘧狀者亦與||此即五苓散也||茯苓朮各三兩澤瀉五分桂二分細搗篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此駃令人皆用之〔杲曰〕苦以泄滯甘以助陽淡以利竅故能除濕利小便〔宗奭曰〕||引水之功多久服必損腎氣昏人目宜審之〔元素曰〕||淡滲大燥亡津液無濕症者勿服〔時珍曰〕||淡滲氣升而又能降故能開腠理利小便與茯苓同功但入補藥則不如茯苓也

方 **傷寒口渴** 邪在臟也||湯主之||茯苓澤泄滑石阿膠各一兩以水四升煮取二升每服七合日三服嘔而思水者亦主之 仲景方

小兒秘結 ||一兩水煎雞屎白一錢調服立通 外臺秘要

通身腫滿 小便不利||五兩為末水服方寸匕日三 楊氏產乳

妊娠腫渴 從脚至腹小便不利微渴引飲方同上 見子母秘錄

妊娠子淋 方同

〔昂曰〕五苓散雜症當用桂枝寒症表未解者亦當用桂枝兼表解表

鶴臯曰威喜丸解說見黄蠟上

〔元素曰〕入足少陰經胃為足太陽膀胱經引經藥

上日三夜二以通為度 小品方

五苓散||茯苓白朮各七錢半澤泄一兩六銖半桂半兩為末每服三錢多飲熱水汗出愈 仲景

威喜丸 見茯苓下

黄蘗

蘗木 本經 根名檀桓 俗作黄柏

集解

〔別錄曰〕蘗木生漢中及永昌〔弘景曰〕今出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚而色淺其根檀桓於道家入木芝品又有一種小樹狀如石榴其皮黄而苦俗呼為子蘗亦主口瘡〔恭曰〕子蘗名山石榴子似女貞皮白不黄亦名小蘗今云皮黄謬矣按今俗用子蘗皆多刺小樹名刺蘗非小蘗也〔禹錫曰〕按蜀本圖經云||樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黄色其根結塊如松下茯苓今所在有之本出房商合等州山谷中皮緊厚二三分鮮黄者為上〔頌曰〕以蜀中出者肉厚色深者為佳

昂曰——補腎非真能補也腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之也相火退而腎固則無狂蕩之患矣又曰腎本屬水虛則熱矣心本屬火虛則寒矣又曰諸痿癱痪皆由熱甚則傷血血不榮筋則耎短而為拘濕勝則傷筋筋不束骨則弛張

苦寒（元素曰苦微辛）治五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止瀉痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡（本經）療驚氣皮間肌膚熱赤起目赤熱痛口瘡（別錄）熱瘡皰起蟲瘡血痢止消渴殺疰虫（藏器）男子陰痿傅莖上瘡治下血如雞肝（甄權）安心除勞治骨（骨屬腎）蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治蚘咬心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛（大明）瀉膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸痿癱痪利下竅除熱（元素）瀉伏火救腎水治衝脉氣逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍（李杲）得知母滋陰降火得蒼朮除

而為痿合蒼术則為二妙散清熱利濕為治痿要藥或兼氣虛血虛脾虛腎虛濕痰死血之不同當隨症加治之【又曰】凡治口瘡用凉藥不效者乃中氣虛二火上炎宜用反治之法參术甘草補上焦之虛乾薑散火之標甚者加附子或含肉桂引火歸元嗚皋按此亦一法也臨症不可不知

【昂曰】尺脉弱者禁用又曰炒黑能止崩帶

【希雍曰】丨丨為腎經藥然以柴胡引之則入胆以川連升葛引之則入腸胃及脾經治濕熱滯下　佐牛膝杞子地黄五味鼈甲青蒿則益陰除熱　佐甘菊地黄杞子蒺藜女貞則益精明目

【又曰】陰陽兩虛之人病兼脾胃薄弱飲食少進或兼泄瀉或惡冷物腎虛飧泄上熱下寒小便不禁少腹冷痛子宮寒血虛不孕陽虛發熱瘀血停滯產後血虛發熱金瘡發熱癰疽潰後發熱陰虛小便不利脾虛小便不利血虛不得眠血虛煩躁等症咸忌之

濕清熱為治痿要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡震亨傳小兒頭瘡時珍

【之才曰】惡乾漆伏硫黄【時珍曰】丨丨性寒而沉生用則降實火熟用則不傷胃酒制則治上鹽制則治下蜜制則治中

發明【元素曰】丨丨之用有六瀉膀胱火一也利小便結二也除下焦濕腫三也痢疾先見血四也臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水膀胱不足諸痿厥腰無力於黄芪湯中加用使兩足膝中氣力湧出痿軟即便去也乃癱瘓必用之藥蜜炒砂末治口瘡如神故雷氏炮炙論云療口瘡舌折立愈黄酥謂以酥炙根黄含之也【杲曰】丨丨蒼术乃治痿要藥凡去下焦濕熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黄澀者並用酒洗丨丨知母為君茯苓澤瀉為佐凡小便不通而口渴者邪熱在氣分肺中伏熱

鳴皋曰知柏治吐血果有效但不可放手用之古人謂丹溪用知柏治失血多致敗脾而死亦宜鑒之

中梓曰肅清龍雷之火滋濡腎水之枯竭

小便癃結點下焦濕腫

不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之藥豬苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之丨丨知母是也王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脚腿裂破出水雙睛凸出飲食不下痛苦不可言狀治滿利小便滲泄之藥服遍矣予診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難經所謂關則不得小便格則吐逆者潔古老人言熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水所化大苦寒之劑丨丨知母各一兩酒洗焙研入肉桂一錢為引水丸梧子大每服二百丸白湯下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如暴泉涌出床下成流轉盼之間腫脹消散內經云熱者寒之腎惡燥急食辛以潤之以丨丨之苦寒瀉熱補水潤燥為君知母之苦寒瀉熱為佐肉桂辛熱為使寒因熱引也丹溪曰丨丨走至

陰有瀉火補陰之功非陰中之火不可用也火有二君火者人火也心火也可以濕伏可以水滅可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不可以水濕折當從其性而伏之惟｜｜之屬可以降之時珍曰古書言知母佐黃伯滋陰降火有金水相生之義｜｜無知母猶水母之無蝦也蓋｜｜能制膀胱命門陰中之火知母則清肺金滋腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火要藥古人所未言也蓋氣為陽血為陰邪火煎熬則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾甚者久服則有寒中之變近時虛損縱欲求嗣之人用補陰藥往往以此二味為君日日服餌降令太過脾胃受傷真陽暗損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲久服有反從火化之害故葉氏醫學統旨有四物加知蘗久服傷胃不能生陰之戒好古曰黃芩梔子入肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也故活人書四味解毒湯乃上下內外通治之藥

方

陰火為病 大補陰丸||鹽水炒褐色為末蜜丸血虛四物湯下氣虛四君湯下

丹溪 男女諸虛 坎離丸治諸虛百損小便淋漓遺精白濁等症||去皮切二斤熟糯米一升童便浸之九浸九晒蒸過晒研末酒煮麪糊丸如桐子大每酒下百丸 孫氏集效方、

上盛下虛 水火偏盛消中等症||一斤分四分用好酒童便蜜鹽水各浸炒為末以知母一斤熬膏和丸桐子大白湯下

臟毒下血 不止痔漏孫氏集效蘖皮丸 活人心統 用||一斤分四分三分用酒醋童便各浸七日焙一分生炒黑為末蜜丸酒下五十丸久服除根○陸一峯蘖皮丸||一斤分四分三分用好酒鹽湯童便各浸晒研一分用酥炙研以猪大腸一條入蘖紮定煮熟搗丸如上法服

妊娠下痢 晝夜數十次||蜜炒焦為末大蒜煨去皮搗爛和丸每空心米飲下三五十丸日三 神妙 婦人良方

小兒熱瀉||焙為末米湯和丸米湯下 十全博救方

赤白濁淫

及夢洩精滑真珠粉丸丨丨炒蛤粉各一斤為丸丨
丨苦而降火蛤粉鹹而補腎也又方加知母牡蠣山
藥 潔古家珍 積熱夢遺心忪恍惚膈中有熱宜清心丸主
之丨丨一兩氷片一錢蜜丸桐子大每服十五丸麥冬湯下此
大智禅師方也 本事方 消渴尿多 煑湯恣飲数日即止必能
食者可用 獨行方 嘔血熱極丨丨蜜炙為末麥冬湯調服二錢立瘥 經驗 下血数
升 丨丨一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆大服七丸温水下名金虎丸 普濟方 時行赤
目 丨丨為末濕紙包裹黃泥固煨乾每一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸熟乘熱薰洗極效此方
有金木水火土故名五行湯 每旦含丨丨一丸可用二次 龍木論 眼目昏暗 一片吐津洗
之久行永無目疾 普濟方 卒喉痺痛丨丨一斤酒一斗煮任飲 肘後 口舌生
瘡 外臺用丨丨含之○深師用蜜浸取汁含之吐涎
○魏氏治心脾有熱舌頰生瘡用蜜炙丨丨青黛

黃蘗 九十九

等分入龍腦一字摻之吐涎口赴筵散｜｜

口疳臭爛　綠雲散｜｜五錢銅綠二錢為末摻之漱去涎　三因方

細辛等分為末或｜｜乾薑等分摻之俱良

瘡疽腫毒　｜｜炒川烏炮等分為末唾調塗留不乾｜｜末入枯礬少許

小兒膿瘡　頭頻潤　集簡　摻之即愈　楊氏簡便方

臁瘡熱瘡　｜｜一兩輕粉三錢猪胆汁調搽或只用蜜炙｜｜二味

火毒生瘡　凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汁淋漓以川｜｜末摻之立愈一人病此無識者用此而愈　醫說

斂瘡生肌　｜｜末麪糊調塗效　宣明方

本草方藥參要卷五目録

秦皮　枳實　枳殼
厚朴　檳榔大腹皮　槐實花葉枝皮
楝子皮　蔓荊子　牡荊子根瀝
紫荊　辛夷　郁李仁
鼠李　金櫻子葉皮　訶黎勒
烏藥　五加皮　椿樗莢
榆白皮葉莢　海桐皮　密蒙花
木芙蓉　山茶花　木槿

合歡皮 子
杉
烏桕

皂角 刺 子
肥皂角
樺木

樟木
樟腦
楠木

椶
吳茱萸 根 葉 枝
川椒 目 葉

胡椒
碧澄茄
茶

蘓木
沈香
檀香

紫檀
降香
丁香 雞舌香

乳香
沒藥
蘓合香

楓脂香
氷片
血竭

質汗　安息香　阿魏

蘆薈　胡桐淚　蕪荑

衛矛　漆 葉　巴豆

大風子　相思子　柳 葉枝 根絮

水楊　白楊　檉柳

梓白皮 葉　楸白皮 葉　桐 梧桐

桐油　竹 葉根 茹瀝　天竹黄

雷丸

果部

二

大棗

栗 楔

桃仁 花 葉 枝 根皮 膠 桃梟

[時珍曰]足厥陰肝少陽胆經藥[帝曰]益腎

[鳴皐曰]||亦安胎要藥一婦受胎五十日必殰百藥不效余詢其病狀據云受胎後大便非痢而後重如痢既殰則後重亦愈余思之是因後重而努力以傷胎也遂以治後重法治之重用||佐以連柏服二十餘劑生一女蓋胎元在腎||能益肝胆而補腎也

[鳴皐曰]||治痢果有奇效熱毒痢不止後重者所必用也

[子接曰]||得川連白頭翁阿膠治產後下痢

本草方藥彙要卷五

如臯戴鳴臯著

秦皮

又名石檀 別錄 樊槻 弘景 盆桂 日華 苦樹 梣皮 淮南 桪木 苦櫪 淮南 [時珍曰]或云本出秦地故得秦名也

集解 [恭曰]此樹似檀葉細皮有白點不粗錯取皮清水便碧色書於紙上看之皆青色者是真

苦微寒 別錄曰大寒 甄權曰平 治風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜 本經 療男子少精婦人帶下小兒驚癇可作洗目湯久服澤膚有子 別錄 明目去目中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清洗赤目極效 甄權 主熱痢下重下焦虛 好古 同葉煮湯洗蛇

㕮并研末傅之 蔵器

〔權曰〕惡苦瓠防葵〔之才曰〕惡吴茱萸大戟為之使

發明 〔大明曰〕｜｜之功洗肝益精明目退熱〔元素曰〕｜｜沉也陰也其用有四治風寒濕邪成痹青白幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇〔好古曰〕痢則下焦虚故仲景白頭翁湯以黄蘗黄連｜｜同用皆苦以堅之也｜｜浸水青藍色與紫草同用治目病以增光暈尤佳〔時珍曰〕｜｜色青氣寒味苦性濇乃是厥陰肝少陽胆經藥也故治目病驚癇取其平木也治下痢崩帶取其收濇也又能治男子少精益精有子皆取其濇而補也故老子云天道好濇此藥乃服食及驚癇崩痢所宜而人止知其治目一節幾於廢棄良為可惋淮南子云梣皮色青乃治目之要藥也又萬畢術云梣皮止水謂其能收淚也高誘解作致水言能使水沸者謬也

嗚杲曰入脾肺胃大腸氣分按東垣雖曰主血仍主氣分居多也血分用大黃氣分用｜｜

杲曰濁氣在上則生䐜脹枳實枳殼俱能破濁消滿

方　目赤生翳｜｜水煮澄清溫洗 外臺　眼暴赤腫｜｜川連各一兩竹葉半升水煎食後服 外臺　血痢連年｜｜鼠尾草薔薇根等分水煎取汁熬膏令可丸〻如梧子大每服五六丸稍〻加增以知為度亦可煎服 千金　天蛇毒瘡似癩非癩天蛇乃草間花蜘蛛也人被螫為露水所濡乃成此疾｜｜煮汁一斗飲之即瘥 羅氏本草　安胎

枳實

集解〔頌曰〕洛西江湖州郡皆有之以商州者為佳木如橘而小高五七尺葉如橙多刺春生白花七八月采者為｜｜九十月采者為枳殼今醫家以皮厚而小者為枳實完大者為枳殼陳久者勝近道所出者俗呼臭橘不堪用

苦寒〔別錄曰〕酸微寒〔普曰〕李當之大寒〔元素曰〕寒苦　治大風在皮膚中如麻

昂曰本草枳實枳殼皆云明目思之不得其解然目疾方中多用之豈以其破濁氣即能升清氣乎本經又言益氣想同此理也故厚朴調中亦有益氣明目之文

希雍曰所主除胸脇痰癖逐停水破結實脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止溏瀉者皆足陽明太陰受病二經氣滯則不能運化精微而痰癖停水結實脹滿所自來矣胃之上口名曰賁門賁門與心相連胃氣壅則心下亦自急痞痛邪塞中焦則升降不舒而氣上逆肝木鬱於地下則不能條達而脇痛得其破散衝走之力則諸症悉除

又曰此藥性專消導破氣觀朱丹溪所云其為勇悍之氣可知凡中氣虛勞倦傷脾為痞滿者當用補中益氣補其不足則痞自除此法所當忌也脹滿非實邪結于中下焦手不可按七八日不更衣者必不可用其傷食停積多因脾胃虛不能運化所致者不可輕用時醫不識虛實往往概施

豆苦痒除熱結止痢長肌肉利五臟益氣 本經 除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止溏泄明目 別錄 解傷寒結胸主上氣欬嗽腎內傷冷陰痿而有氣加而用之 甄權 消食散敗血破積堅去胃中濕熱 元素

斅曰——枳殼性效不同若使枳殼取辛苦腥要陳久年深者佳以小麥麩炒至麩焦去麩用

發明

震亨曰——瀉痰能衝墻倒壁滑竅破氣之藥也 元素曰心下痞及宿食不消並宜——黃連

杲曰以蜜炙用則破水積以泄氣除內熱潔古用去脾經積血脾無積血則心下不痞也 好古曰益氣則佐以人參白朮破氣則佐以牽牛大黃芒消此本經所以言益氣復言消痞也非白朮不能去濕非——

損人真氣為害不淺
又曰同三稜蓬朮青皮檳榔為消磨堅積
之劑　同橘皮白朮厚朴甘草砂仁為枳
朮丸治心下痞滿因于食入陷胸湯治傷
寒寒熱結胸　入大小承氣治傷寒熱入
裏結實脹滿痛不可當數日不更衣者
又接曰得瓜蔞消痞結得皂角通大便得
白朮去痰飲

不能除痞故潔古制枳朮丸方以調脾胃仲景治心
下堅大如盤水飲所作枳實白朮湯用｜｜七枚朮
三兩水一斗煎三升分三服
腹中軟即消也餘見枳殼下
方　胸痺結胸　胸痺心下痞堅留氣結胸脇下逆氣
搶心｜｜薤白湯主之陳｜｜四枚
厚朴四兩薤白半斤栝樓一枚桂一兩水五升先煎
｜｜厚朴取二升去渣納餘藥煎兩三沸分三服溫
服當愈　傷寒後胸膈卒閉痛｜｜麩炒
金匱要略　傷寒胸痛　為末米飲服二錢日二服　嚴
子札濟　産後腹痛　｜｜麩炒芍藥酒炒各二錢
生方　水煎服亦可末服　聖惠　奔豚
氣痛　｜｜炒為末飲下　大便不通　｜｜皂莢等分為
方寸匕　外臺　末飯丸米飲下
危　腸風下血　｜｜半斤麩炒黃芪半斤炙為末
氏　米飲下二錢丸服亦可　經驗　皮膚
風疹　｜｜醋浸火炙熨
之即消　外臺
枳實　枳殼

三

枳殼苦酸微寒權曰苦辛主風痒麻痹通利關節勞氣欬
嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大脇風
安胃止風痛開寶遍身風疹肌中如麻豆惡瘡腸風痔
疾心腹結氣兩脇虛脹關格壅塞甄權健脾開胃調五
臟下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結
痃癖五膈氣及肺氣水腫利大小腸除風明目炙熱
大明泄肺氣除胸痞元素治裏急後重時珍
發明元素曰｜｜破氣勝濕化痰泄肺走大腸多用
損胸中至高之氣止可二三服而已禀受素壯
而氣刺痛者看在何部經分以別經藥導之杲曰氣
血弱者不可服以其損氣也好古曰枳殼主高枳實

元素曰瀉肺走大腸
希雍曰枳實形小氣全性烈故善下達如
少年猛將勇往直前｜｜形大氣散性緩
故其行稍遲能入胸膈肺胃之分及入大
腸也其主風痒麻痹利關節止風痛者蓋
肺主皮毛胃主肌肉風寒濕入于二經則
皮膚瘙痒或作痛麻木｜｜有苦泄辛散
之功兼能引諸風藥入于二臟故為治風
所需又肺與大腸相表裏風邪入肺則并
入大腸風熱相搏而為腸風下血苦寒下
泄之氣則血熱清而風自除矣
鳴皋曰予甥女年十一二歲得瘟症頭痛
甚其平日氣禀亦不弱一醫喜用枳殼每
劑三錢服二劑已神昏撮空理線矣予視
之曰急用人參末服而斃得病甫三日耳
以此見損氣之戒宜三復未可視為無關
輕重之藥也又見一富人因憂愁致傷心
脾腹泄服參术瀉止而氣不適平日尅伐
藥毫不能服一醫放胆用厚朴數分一瀉
而不可救但人之氣禀不同又見一夯醫

專喜用大劑自己平素多病亦弱因患腹
脹自己處方用只殼一兩桔梗四錢服數
劑病雖未愈亦無大害蓋人之腸胃有受
藥不受藥之分
鳴皋曰開寶主治背膊悶倦當是背膊疼
痛肺俞穴在背上兩旁背膊之痛每有因
肺病肺爲痰阻則臂痛肺氣不降而旁橫
則臂痛肺熱成痺則臂痛一人患臂痛醫
作風治而愈甚予用二冬膏治之而愈蓋
肺痺也只殼瀉肺氣其治臂膊亦同此理
希雍曰脾胃虛中氣不運而痰壅嗽急者
忌之咳嗽不因風寒入肺而氣壅者服之
反作劇咳嗽因虛火炎者服之立致危殆
又曰同蘇子橘皮桔梗木香白蔻香附治
上焦壅氣脹滿因于寒者同川連槐花乾
葛防風荊芥芍藥黃芩當歸生地地榆側
柏治腸風下血初起者神效同檳榔芍藥
黃連升麻甘草葛根紅曲滑石治裏急後
重　得人參麥冬治氣虛大便不快　同
肉桂治右脇痛

主下高者主氣下者主血故殼主胸膈皮毛之病實
主心腹脾胃之病大同小異朱肱活人書言治痞宜
先用桔梗丨丨湯非用此治心下痞也果知誤下氣
將陷而成痞故先用此使不致於痞也若已成痞而
用此失之晚矣不惟不能消痞反損胸中之氣先之
一字有謂也時珍曰枳實丨丨氣味功用俱同上世
亦無分别魏晉以來始分實殼之用潔古張氏東垣
李氏又分治高治下之說大抵其功皆能利氣氣下
則痰欬止氣行則痞脹消氣通則痛刺止氣利則後
重除故以枳實利胸膈丨丨利腸胃然仲景治胸痺
痞滿以枳實爲要藥諸方治下血痔痢大腸秘塞裏
急後重又以丨丨爲通用則枳實不獨治下而丨丨
不獨治高也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通
一氣而已則二物分亦可不分亦無傷杜壬方載陽
湖公主産難方士進瘦胎飲用丨丨四兩甘草三兩
五月後日服一錢臨月不惟易産仍無胎中惡病也
張潔古活法機要改以枳术丸日服令胎瘦易生名
束胎丸寇宗奭言胎壯則子有力易生服丨丨藥反

子楼曰枳桔湯治虚痞

致無力恐子亦氣弱以理思之寇氏之說似優或胎前氣盛壅滯者宜用之所謂八九月胎必用枳殼蘇梗以順氣胎前無滯則產後無虛也若氣稟弱者大非所宜矣震亨曰產難多見於鬱悶安逸之人富貴奉養之家古方瘦胎飲為陽湖公主作也予妹苦於產難其形肥而好坐予思此與公主正相反彼奉養之人其氣必實故耗其氣使平則易產今形肥則氣虛久坐則氣不運當補其母之氣以紫蘇飲加補氣藥十數帖服之遂快產

方　老幼腹脹　血氣凝滯用此寬腸順氣名四炒丸　｜｜去瓤四兩分四分一分用蒼朮一兩同炒一分用蘿蔔子一兩同炒一分用乾漆一兩同炒一分用小茴一兩同炒炒黃祇取｜｜為末以蒼朮等四味煮汁打麪糊丸梧子大食後米飲下五十丸

易簡　消積順氣　治五積六聚不拘男婦老幼但是氣積並皆治之乃仙傳方也｜｜三斤去瓤每箇入巴豆仁一箇合定札煮慢火煮一

日湯減再加熱湯勿用冷水待時足汁盡去豆切片
日乾勿炒為末　煮糊丸梧子大每服三四十丸
部真人**順氣止痢**方同　**懷胎腹痛**｜｜三兩麩炒黃
經驗方川　　上　　芩一兩每用五錢
水一盞半煎一盞服若脹滿身　不驚丸治
痛加白朮一兩　活法機要　**小兒驚風**小兒因驚
氣吐逆抽搐痰涎壅塞手足掣瘲目斜｜｜去瓤麩
炒淡豆豉等分為末急驚薄荷自然汁下慢驚荊芥
湯入酒三五滴下每服　｜｜三兩麩炒為
五分　陳文仲小兒方　**風瘮作痒**　末每服二錢水煎
服仍以汁塗　**利氣明目**　｜｜麩炒為末點　**下早成痞**
經驗方　湯代茶　普濟
傷寒陰症下早成痞心下滿而不痛按之虛軟
｜｜梹榔等分末服三錢川連湯下　宣明方　**順氣**
治痢　｜｜二兩四錢甘草六錢為末　方同
每沸湯點服二錢　嬰童百問　**疏導脚氣**　上木
瓜湯服　｜｜煨甘草各一錢　｜｜
直指　**小兒秘塞**　煎服｜｜　全幼心鑑　**腸風下血**｜｜
枳殼　厚朴

五

昂曰入足太陰陽明脾胃

寇實曰能墮胎孕婦忌之

昂曰脹滿症多不同清與補貴得其宜氣虛宜補氣血虛宜補血食積宜消導痰滯宜行痰挾熱宜清熱濕盛宜利濕寒鬱者

燒黑存性五錢羊脛骨炭三錢共為末五更米飲服少頃再一服博濟方

痔瘡腫痛 必效方用||煨熟熨之七枚立定○本事方

用||水煎百沸先熏後洗甚效

牙痛 ||浸酒含漱 聖惠方

厚朴

又名烈朴日華 赤朴別錄 厚皮同上 重皮廣雅 樹名榛別錄 子名逐折別錄

集解 頌曰今洛陽陝西江淮湖南蜀中皆有之而以梓州龍州者為上木高三四丈葉如槲葉紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪 時珍曰朴樹膚白肉紫實如冬青子生青熟赤有核味甘美

皮 苦辛溫 別錄曰大溫 吳普曰小溫 治中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲本經 溫中益氣消痰下氣療霍亂

挾寒怒鬱者行氣畜血者消瘀不宜專用
行散藥亦有多服參芪而脹滿反甚者以
挾血挾食挾熱挾寒不可概作脾虛氣弱
治也嗚皋按葉天士治一腹脹者諸醫不
效葉用歸尾桃仁山甲䗪虫等藥即愈曰
絡瘀則脹吾與通絡也此即所謂挾血也
〔希雍曰〕——之功長於泄結散滿溫暖脾
胃一切飲食停滯氣壅暴脹與夫冷氣逆
氣痰飲胃冷嘔逆腹痛泄瀉及脾胃壯實
之人為要藥然而性專消導散而不收故
凡嘔吐不因寒痰冷積而由(可與參沙同用)於胃虛火氣
上炎腹痛因於血虛脾陰不足而非停滯
泄瀉因於火熱暴注而非積寒傷冷腹滿
由於中氣不足氣不歸元而非氣實壅滯
傷寒發熱頭痛而無痞塞脹滿之候小兒
吐瀉將成慢驚大人氣虛血槁見發膈症
老人脾虛不能運化偶有停積孕婦傷食
停冷孕婦腹痛瀉利產後血虛腹痛產後
中滿作嗽產後泄瀉反胃以上諸症法所
咸忌

反腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔惡不止洩痢淋露除
驚去留熱心煩滿厚腸胃〔別錄〕健脾治反胃霍乱轉筋
冷熱氣瀉膀胱及五臟一切氣婦人胎前產後腹臟
不安殺腸中虫明耳目調關節〔大明〕治積年冷氣腹內
雷鳴虛吼宿食不消去結水破宿血化水穀止吐酸
水大溫胃氣治冷痛主病人虛而尿白〔甄權〕主肺氣脹
滿膨而喘欬〔好古〕

〔之才曰〕乾薑為之使惡澤瀉消石寒水石忌豆食之
動氣〔大明曰〕去粗皮用薑汁炙或浸炒用〔宗奭曰〕得
薑不棘人喉

厚朴

六

〔嵩皋曰〕繆氏所忌諸條頗有執泥處凡脾胃弱及氣血虛之人其病必當用亦須用之故古人有佐以參朮之法如執其說其病與藥相符而不敢用不能愈矣且||得參朮甘草而其力愈大

〔中梓曰〕行氣峻猛虛者勿多與也

發明〔宗奭曰〕||平胃散中用最調中至今此藥盛行既能溫脾胃又能走冷氣為世所需也〔元素曰〕||之用有三平胃一也去腹脹二也孕婦忌之三也雖除腹脹虛弱人宜斟酌用之誤服脫人元氣惟寒脹於熱藥中兼用乃結者散之神藥也〔丹溪曰〕||氣溫能瀉胃中之實平胃土之太過以致於中和而已非謂溫補脾胃也習以成俗皆謂之補謬哉其治腹脹者因其味辛以提其滯氣滯行則宜去之若氣實人誤服參芪藥多致氣悶脹或作嘔宜此瀉之〔好古曰〕本草言||治中風傷寒頭痛溫中益氣消痰下氣厚腸胃去腹滿果益氣乎果泄氣乎蓋與枳實大黃同用則能泄實滿所謂消痰下氣是也若與橘皮蒼朮同用則能除濕滿所謂溫中益氣是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與治瀉痢藥同用則厚腸胃大抵其性味苦溫用苦則泄用溫則補也故成無己曰厚朴之苦以泄腹滿〔杲曰〕苦能下氣以泄實滿溫能益氣故散濕滿

方　厚朴煎丸　孫兆甫云補腎不如補脾〻胃氣壯則能飲食飲食進則益榮衛養精血

素問云精不足者補之以味形不足者補之以氣此
藥大補脾胃虛損温中降氣化痰進食去留飲嘔吐
泄瀉等症｜｜去皮剉用　生薑二斤切水五升
同煮乾去薑焙朴再以乾薑四兩甘草二兩水五升
同朴煮乾去草焙薑朴為末煮棗肉搗泥和丸梧
子大每米飲下四五十丸一方加熟附　百一

痰壅嘔逆　心胸滿不下飲食｜｜一兩薑炙
為末每用米飲服二錢　聖惠方

腹脹脉數
｜｜三物湯｜｜半斤只實五枚水一斗二升煎取
五升入大黃四兩再煎三升温服一升轉動更服不
動勿服
金匱要略

腹痛脹滿　｜｜七物湯製｜｜半斤甘草
大黃各三兩棗十箇只實五枚
桂二兩生薑五兩水一斗煎取四升温服
八合嘔者加半夏五合　金匱要略方

反胃泄瀉
｜｜薑汁炙焦黑為末
陳米飲下二錢　斗門

氣脹心悶　飲食不下久不愈方同上

中滿

厚朴

七

洞瀉｜｜乾薑等分為末鍊蜜為丸梧子大米飲下　鮑氏方

小兒吐瀉 胃虛及有痰驚 梓朴散用梓州｜｜一兩半夏湯泡七次薑汁浸半日晒乾三錢以米泔同浸一日水乾為度如末乾微火烘乾去｜｜只研半夏每服｜｜湯用半錢薄荷湯下　錢乙小兒方

霍亂腹痛｜｜炙四兩桂心二兩只實五枚生薑二兩水六升煎取二升分三服此陶隱居方也○聖惠用｜｜薑炙研末新汲水調服

下痢水穀久不愈｜｜川連各三兩二錢如神　水煎緩緩服之　梅師方

尿渾白濁 心脾不調腎氣渾濁用｜｜薑炙一兩白茯苓一兩水酒各半煎成溫服　經驗良方

月水不通｜｜三兩炙切水三升煎一升分二服空心飲不過三四劑神驗一加桃仁紅花　梅師

檳榔 又名賓門 李當之藥對 仁頻 顏師古上林賦註

苦辛溫澀消穀逐水除痰辟殺三虫伏尸寸白 別錄 治

希雍曰同草果只實橘皮治食瘧加三稜莪茂麩紅、麯山查麥芽消一切堅硬肉食及米麵生冷食積成塊作痛 同雷丸使君子蕪荑芦荟肉蔻胡連治小兒疳虫 同楝根鶴虱錫灰薏苡根貫衆烏梅治

腹脹生擣末服利水穀道傅瘡生肌肉 止痛燒灰傅口吻白瘡（蕭炳） 宣利五臟六腑壅滯破胸中氣下水腫治心痛積聚（甄權） 除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷健脾調中破癥結（大明） 主賁豚膀胱諸氣五膈氣風冷氣脚氣宿食不消（李珣） 治衝脉為病氣逆裏急（好古） 治瀉痢後重心腹諸痛大小便氣秘痰氣喘急療諸瘧禦瘴癘（時珍）

發明 元素曰｜｜苦以破滯辛以散邪泄胸中至高之氣使之下行性如鉄石之沉重能墜諸藥至於下極故治諸氣後重如神也 時珍曰南人以｜｜禦瘴代茶酒後食之則寬氣下痰餘醒頓解飽後食

檳榔 八

寸白出　同蒼朮草果青皮甘草治山嵐
瘴氣發瘧
〔希雍曰〕氣虛者忌之下痢非後重者不宜
用心腹痛無留結及非虫攻咬者不宜用
瘧非山嵐瘴氣者不宜用
〔于按〕曰得木瓜治脚氣衝心

之則飲食快消按吳興章傑瘴說云嶺表之俗多食
｜｜日至數十夫瘴癘之作而因飲食過度氣痞積
結｜｜最能下氣消食去痰故人習於近利而闇於
遠患也夫嶺南地熱四時出汗人多黄瘠食之則臟
氣踈洩一旦病瘴不敢攻下發散豈盡氣候所致｜
｜蓋亦為患殆未思耳又東陽盧和云｜｜云能祛
瘴有瘴服之可也無瘴服之豈不
損正氣而有開門延寇之禍乎
方　嘔吐痰水｜｜一箇烘熟橘皮二錢半　傷寒痞
炙為末水煎温服　千金方
滿　陰病下早成痞按之虚軟而不痛｜｜只實
等分為末每服二錢川連煎湯下　宣明方　傷寒
結胸　已經汗下後者｜｜二兩酒二盞
煎一盞分二服　龐安時傷寒論　蚘厥腹痛方同
上　脚氣衝心　悶乱不識人用｜｜十二枚為末分二
服空心熱童便調下日二服或入薑汁
温酒同服　脚氣脹滿　非冷非熱或老人弱人病此用
廣利　｜｜仁為末以｜｜殼煎汁調

[昂曰]陰毛生虱世少良方惟以｜｜煎水
洗之即除

服二錢或茶飲蘸湯豉汁俱可甚利　外臺

寸白虫病｜｜二七枚為末先以水二升半煮｜｜皮取一升空心調服方寸匕盡日出出　千金方

小兒頭瘡水磨｜｜晒取末生油調塗　聖惠方

大腹皮[孫真人曰]鴆鳥多集檳榔樹上凡用宜先以酒洗後以大豆汁洗過晒乾用

辛微温治冷熱氣攻心腹大腸蠱毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入疏氣藥用之良　開寶　下一切氣止霍亂通大小腸健脾開胃調中　大明　降逆氣消肌膚中水氣浮腫脚氣壅逆瘴瘧痞滿胎氣惡阻脹悶　時珍

方　漏瘡惡穢｜｜｜煎湯洗之　直指

好古曰入肝經氣分鳴皋曰與桃仁入肝經血分稍異　宗奭曰凉大腸

希雍曰入手足陽明兼入足厥陰大腸胃肝

鳴皋曰功能明目治痄難催生及花能治吐血衄血仍屬肝經血分藥而兼主氣分之熱也功能治諸痔及下血及花能治腸風赤白痢仍屬大腸經血分藥也至於治瘡瘍楊梅等毒則又屬胃經藥也應是大腸主藥而兼入胃肝者也是血分藥而兼入氣分者也

又曰蘇頌云能主頭風補腦純陰之品豈能去風補腦仍是清陽明邪熱也陽明之脉上絡腦故陽明熱則頭痛陽明之邪熱清則頭目亦清故云去頭風明目補腦也

又曰能通大腸結閉

槐

又作櫰玉篇槐之別名

槐實苦寒治五內邪熱止涎唾補絕傷火瘡婦人乳瘕子臟急痛本經　久服明目治五痔瘡瘻以七月七日取之擣汁銅器盛之煎令可丸丸如鼠屎納竅中日三易乃愈又墮胎別錄　治大熱難產甄權　殺虫去風合房陰乾煮飲明目除熱淚頭腦心胸間熱風煩悶風眩欲倒心煩吐涎如醉瀁瀁如船車者藏器　治男女陰瘡濕痒催生吞七粒大明　疎導風熱宗奭　治口齒風涼大腸潤肝燥李杲

斅曰采得去單子及五子者只取兩子三子者烏牛乳浸一宿蒸過用

發明〔好古曰〕｜｜純陰肝經氣分藥也治證與桃仁同〔弘景曰〕｜｜以十月已日采相連多者新盆盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不白〔頌曰〕折嫩房角作湯代茗主頭風明目補腦水吞黑子以變白髮〔時珍曰〕槐者虛星之精十月上已日采子服之去百病梁書言庾肩吾常服槐實年七十餘髮黑目夜看細字亦其驗也古方以子入冬月牛胆中漬之陰乾百日每食後吞一枚云久服明目通神髮白還黑有痔及下血者尤宜服之

方

槐角丸 五腫腸風一應諸痔皆治｜｜一兩地榆當歸酒焙防風黃芩只殼各半兩為末酒丸梧桐子大每服五十九米飲下 和劑

內痔外痔｜｜一斗搗汁晒稠苦參末同煎丸梧子大每服十九兼作挺子納下部 外台

目熱昏暗｜｜川連為末蜜丸梧子大每服二十丸日二 聖濟

大熱心煩｜｜末炒酒服方寸匕 千金

槐實、花

〔鳴皐曰〕ㅣㅣ善去大腸濕熱炒煎服治肛門熱痔如神可知為陽明主藥陽明多氣多血故能止諸血而治痔瘻腸風也

槐花　苦平治五痔心痛眼赤殺腹臟虫及皮膚風熱腸風瀉血赤白痢並炒研服大明　凉大腸元素　炒香頻嚼治失音及喉痺又療吐血衄血崩中漏下時珍

〔宗奭曰〕未開時采收陳久者良入藥炒用

發明〔時珍曰〕ㅣㅣ味苦色黃氣凉陽明厥陰經血分藥也故所主之病多屬二經

方　舌衄出血　無故出血如線名舌衄ㅣㅣ炒研傳之　朱氏　吐血不止ㅣㅣ炒存性入射香少許研勻糯米飲下三錢　普濟　咯血唾血ㅣㅣ炒研糯米飲下三錢仰臥一時取效　朱氏　小便尿血ㅣㅣ鬱金煨各一兩為末每服二錢淡豆豉湯下立止　筐中秘家　大便下血　經驗　用ㅣㅣ荊穗等分為末酒服二錢　○集簡用側柏葉三錢ㅣㅣ六錢煎湯

日服○柚珍用||只猪大腸一條||
売等分炒研新汲水下 暴熱下血 填滿水煮加醋煮
爛搗丸彈子大當歸||半生半炒一兩
酒化下一丸 永類 酒毒下血|山梔焙五錢為末新
汲水下二錢 新||炒研酒服三錢日
經驗良方 臟毒下血 三或槐白皮湯下 普濟 婦
人漏血不止||炒存性研每服|||三
三錢食前酒下 聖惠方 血崩不止 兩黃芩
二兩為末每服五錢酒一盞銅秤錘 炒
柴火燒紅淬酒調服忌口 乾坤秘蘊 中風失音|
|三更後仰臥嚼 凡人中毒熱眼花頭運
嚥 危氏得效 癰疽發背 口乾舌苦心驚背熱四
支麻木覺有紅暈在背後者即取||子一大杪鉄
杓内炒褐色以好酒一盌浸之乘熱飲酒一汗即愈
如未退再炒一服極驗即成膿者亦無不愈彭 楊梅
辛瘡云此方三十年屢效者 劉松石保壽堂
毒瘡乃陽明積熱所生||四兩畧炒入酒二盞
煎數十沸熱服胃虛寒者勿用 集簡方 外
槐葉枝

十一

【嗎皋曰】見一人發便毒用核桃殼同全蝎燒研服即愈蓋蝎性善通經絡而以核桃引入腎經也疔瘡一方亦同此理

【皋曰】槐木所生木耳治腸紅止血崩神效蓋木耳能凉血止血得槐上者更妙

痔長寸 用｜｜煎洗並服自縮 同上 疔瘡 一切癰疽發背不問已成未成但焮赤痛者皆治｜｜微炒核桃仁各二兩無灰酒一大鍾煎十餘沸熱服甚效 醫方摘要 發背散血 ｜｜綠豆粉各一升同炒象牙色研末用細茶一兩煎一盞露一夜調末三錢傅之留頭勿犯女人手 攝生妙用 白帶不止 ｜｜炒牡蠣煅等分研為末酒下三錢 摘元

葉 苦平煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用 大明 產難絕傷及癮疹牙齒諸風采嫩葉食 孟詵

方 腸風痔疾 ｜｜一斤蒸熟晒乾研末煎茶代飲久服明目 食醫心鏡

槐枝 苦平洗瘡及陰囊下濕痒八月斷大枝候生嫩蘖煮汁釀酒治大風痿痹甚效 別錄 燒瀝塗癬煆黑

鳴泉曰此方當治蟲痛

揩牙去虫煎湯洗痔核（蘇頌）燒灰洗頭長髮（藏器）治赤目崩漏（時珍）

發明 頌曰劉禹錫傳信方著槐湯灸痔法甚詳以｜煎濃湯先洗痔便以艾灸其上七壯以知為度一人乘騾行路其痔大作狀如胡瓜熱氣如火至驛僵 郵吏用此法灸至三五壯忽覺熱氣一道入腸中因大轉瀉先血後穢痛甚瀉後其患若失登騾而馳

方 心痛 當太歲上取新生｜｜一握去兩頭 用水三大升煎一升頓服（千金方）

樹皮根白皮 苦平治爛瘡喉痹（別錄）煮洗陰囊腫墜漱口齒䘌疳䘌衄（甄權）治中風皮膚不仁洗痔洗瘡煎膏塗湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫（大明）煮汁服治下

血_{蘇頌}

方　中風身直不得曲伸反復者取槐皮黃白處切之以酒或水六升煮取二升稍〻服之

肘後方　痔有虫作痒或下膿血槐白皮濃煎先熏後洗大便當有虫出即愈　梅師

蠼螋瘡槐白皮醋浸半日洗之　千金翼　破傷中風避陰槐枝上皮刻取一片安傷處艾灸皮上不痛者灸至痛〻者灸至不痛　普濟

槐膠　苦寒治一切風化涎治肝臟風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不収頑痺或毒風周身如虫行或破傷風口眼喎斜腰背強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之　嘉祐

〔東垣曰〕入心小腸〔好古曰〕瀉膀胱〔昂曰〕能入肝舒筋〔杲曰〕亦入手厥陰心包經〔希雍曰〕亦入足陽明胃足太陰脾經

〔昂曰〕脾胃虛寒忌之

楝 又名苦楝圖經子名金鈴子

集解〔恭曰〕有雌雄兩種雄者無子根赤有毒服之使人吐不止有至死者雌者有子根白微毒入藥當用雌者〔頌曰〕楝實以川蜀者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭其實如彈丸〔時珍曰〕楝長甚速三五年即可作椽川産良

楝子 苦寒有小毒〔元素曰〕酸苦平 治温疾傷寒大熱煩狂殺三虫疥瘍利小便水道本經 主中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯使甄權 入心及小腸止上下部腹痛李杲 瀉膀胱好古 治諸疝虫痔時珍

〔時珍曰〕得酒煮良乃寒因熱用也茴香為之使

發明〔元素曰〕熱厥暴痛非此不能除〔時珍曰〕｜｜導
小腸膀胱之熱因引心包相火下行故心腹痛
及疝氣恃為要藥甄權乃言不入湯使則本經何以
有治熱狂利小便之文耶近方治疝有四治五治七
治諸
法

方　熱厥心痛　或發或止身熱足寒久不愈者先灸大溪昆侖引熱下行內服金鈴子散
苦｜｜延胡索各一兩為末溫
酒調下三錢　潔古活法機要　小兒冷疝　氣痛膚囊浮腫苦｜
｜去核五錢吳茱萸二錢半酒丸黍米
大鹽湯下二三十丸　全幼心鑑　癩疝腫痛　澹寮方楝
實丸用苦｜｜肉五兩分五分一用故紙二錢炒黃
一用小茴三錢食鹽錢半同炒一用萊菔子一兩同
炒一用牽牛子三錢同炒一用斑蝥七箇去頭足同
炒楝去斑蝥菔子食鹽牽牛只留故紙茴香為末酒
丸梧子大酒下五十丸○得效方治一切疝痛大有
神效苦｜｜酒浸取肉一斤分四分一用小麥一合

斑蝥四十九箇同炒去蝥一用小麥一合巴豆四十
九粒同炒去豆一用小麥一合巴戟肉一兩同炒去
戟一用小茴一合食鹽一兩同炒去鹽留茴加故紙
一兩酒炒木香不見火一兩研酒煮麪丸桐子大鹽
湯下五十丸○直指方楝實丸治外腎脹大麻木痛
破及奔豚疝氣用川楝子四十九箇分七分切取肉
七箇用小茴五錢同炒七箇用故紙二錢半同炒七
箇用黑丑二錢半同炒七箇用食鹽二錢同炒七箇
用菔子二錢半同炒七箇用巴豆十四箇同炒七箇
用斑蝥十四箇同炒楝去菔子斑蝥巴豆三味不用
入青木香五錢南木香官桂各二錢半為末酒煮
麪糊丸梧子大每服三十丸食前鹽湯下日三服**臟**
毒下血 川|||炒黄為末蜜丸梧子大米
飲下十丸至二十丸 經驗方 **腎消膏淋**
病在下焦川|||茴香等 **小兒五疳** 川|||芎藭等
分為末酒服一錢 同上 分猪胆汁丸米
飲下
摘元方
楝皮

十四

[嶋皐曰]若洗瘡疥似宜雄者更有力但不可服耳

根及木皮　苦寒微毒治蚘虫利大腸別録苦酒和塗癬疥甚良弘景治遊風熱毒風疹悪瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗大明

[大明曰]雄者根赤毒人不可誤服用雌者毎一兩可入糯米五十粒同煎殺毒若瀉以冷粥止之不瀉者以熱葱粥發之

方　消渇有虫　苦楝皮一握切焙入射香少許水煎空心飲之雖困頓不妨下虫如蚘而紅色其渇自止消渇有虫人所不知夷堅志　小兒蚘虫　根皮去粗皮為末米飲服二錢斗門方　小兒瘡疥　及癬並宜楝樹根皮為末猪胆汁調傅　千金方

蔓荊

昂曰｜｜｜入足太陽膀胱陽明胃厥陰肝經

希雍曰｜｜｜味辛氣温入三臟而去風寒濕之邪至輕身耐老之說恐非風藥之所能也

又曰頭目痛不因風邪由於血虛有火者忌之

中梓曰辛而微温足太陽藥也主太陽頭風頂痛㬥按覌李氏說是太陽主藥

集解［恭曰］｜｜生水濱苗蔓延長大餘春因舊枝而生小葉五月葉成似杏葉六月有花紅白色黃蕊九月有實黑斑大如梧子而輕虛冬則葉凋今人誤以小荊為｜｜以｜｜為牡荊也［大明曰］海鹽亦有之大如豌豆蒂有輕軟小蓋子七八月采之［頌曰］近汴京秦隴明越諸州多有之苗莖高四五尺對節生枝葉類小楝至夏盛茂有花作穗淡紅色蕊黃白色花下有青萼至秋結子舊說蔓生今所有並非蔓也［宗奭曰］諸家所解｜｜牡荊紛紛不一經既言蔓荊明是蔓生非高木也既言牡荊自是木上生又何疑焉［時珍曰］其枝小弱如蔓故曰蔓生

子 苦微寒［別錄曰］辛平温［元素曰］辛温 治筋骨間寒熱濕痹拘攣明目堅齒利九竅去白虫久服輕身耐老小荊實亦等［本經］頭風頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤［別錄］治

賊風長髭髮甄權利關節治癎疾赤目大明太陽頭痛頭沉昏悶除昏暗散風邪凉諸經血止目睛內痛元素摟

肝風好古

之才曰惡烏頭石膏斅曰凡使去蒂子下白膜一重酒浸蒸時珍曰尋常用只去膜打碎用之

發明元素曰｜｜｜辛溫氣清陽中之陰入太陽經胃虛人不可服恐生痰疾時珍曰｜｜｜氣清味辛體輕而浮上行而散故所主者皆頭面風虛之症恭曰小荊實即牡荊子其功與｜｜｜同故曰亦等也

方 頭風作痛｜｜｜一升為末絹袋浸斗酒中七日溫飲 千金乳癰初起｜｜｜炒為末酒服方寸匕渣傅之 危氏得效方

牡荊 又名黄荊圖經 小荊本經 楚

集解 弘景曰｜｜令人都無識者仙方用｜｜云必枝葉相對者是｜｜不對者非｜｜也莫詳虛實更須博訪 頌曰｜｜令眉州蜀州近汴京亦有之俗名黄荊是也枝莖堅勁作科不作蔓葉如蓖麻更踈瘦花紅作穗實細而黄如麻子大或云即小荊也按陶隱居登眞隱訣云荊木之葉華通神見鬼精註云荊有三種荊木即令作鞭箠者葉香亦有花子子不入藥方術則用｜｜其子入藥此人無識其木者天監三年天子將合神仙飲奉敕論｜｜曰荊花白多子子粗者歷歷踈生不過三兩莖多不能圓或扁或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多采｜｜｜｜汁冷而甜餘荊被燒則烟火氣而苦｜｜質實烟火不入其中主治心風第一於時遠近尋覓遂不値也 保昇曰陶氏不惟不別蔓荊並不識｜｜蔓荊蔓生｜｜樹生理自明矣 時珍曰｜｜山野處處都有樵采為薪年

希雍曰——入足陽明胃厥陰肝經

又曰苦温能通行散邪故利胃氣而除寒熱欬逆亦邪氣壅胃所致邪散氣下則欬逆止矣

久不樵者其樹大如盌也其木心方其枝對生一枝五葉或七葉々如榆葉長而尖有鋸齒五月杪開花成穗紅紫色其子大如胡荽子而有白膜皮裹之頌云葉似萞麻者誤矣有青赤二種青者為荊赤者為楛嫩條皆可為筥箘

牡荊子 苦温 時珍曰辛温 除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣 別錄 得柏實青葙术療風 之才 炒焦為末飲服治心痛及婦人白帶 震亨 用半升炒熟入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣甚效浸酒飲治耳聾 時珍

之才曰防已為之使畏石膏

根甘苦平 時珍曰微辛 水煮服治心風頭風肢體諸風解

肌發汗 別錄

發明 時珍曰牡荊苦能降辛溫能散降則化痰散則祛風故風痰之病宜之其解肌發汗之功世無知者按王氏寄方云一人病風數年予以七葉黃荊根皮五加根皮接骨草等分煎湯日服遂愈蓋得此意也

荊瀝 甘平 飲之去心悶煩熱頭風旋運目眩心頭瀁瀁欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾令人不睡 藏器 除風熱開經絡導痰涎行血氣解熱痢 時珍

發明 時珍曰丨丨氣平味甘化痰去風為妙藥故千金翼云凡患風人多熱常宜以竹瀝丨丨薑汁合五合和勻熱服以瘥為度陶弘景亦云牡荊汁治心風為第一延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用丨丨

荊瀝 紫荊

時珍曰入手足厥陰心包肝血分

震亨曰二汁同功並以薑汁助送則不凝滯但氣虛不能食者用竹瀝氣實能食者用｜｜

方 中風口噤｜｜每服一升范汪方 頭風頭痛之｜｜日〻服集驗方 喉痺腫痛｜｜細〻嚥之或以荊莖一握煎服千金翼 目中卒痛之｜｜點肘後方 心虛驚悸羸瘦者｜｜二升煎一升六合分四服日三夜一小品 赤白下痢｜｜每日服五合外臺 濕癬｜｜塗之深師方

紫荊 又名紫珠拾遺皮名肉紅綱目內消

集解 頌曰｜｜處〻有之人多種於庭院似黃荊葉小無椏花深紫可愛宗奭曰春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生於木身之上或附根上枝下花罷葉出光緊微圓時珍曰高樹柔條其花甚繁歲二三次皮入藥以川中厚紫味苦如胆者勝

「杲曰」凡物之紅紫者皆入血分以類相從也｜｜花紫艶殊常故能活血破血而治諸血症至於通小腸治五淋利小便則其性能下行又能解諸毒治諸癰瘡疽是亦外科之要藥

木及皮苦平「藏器曰」苦寒「大明曰」皮梗及花功用並同破宿血下五淋濃煮汁服開寶通小腸大明解諸毒物癰疽喉痹飛尸蠱毒丁腫下瘻蛇虺蚕虫狂犬毒並煮服亦以汁洗瘡腫除血長膚藏器活血行氣消腫解毒治婦人血氣疼痛經水凝濇時珍

發明「時珍曰」｜｜氣寒味苦色紫性降入手足厥陰血分寒勝熱苦走骨紫入營故能活血消腫利小便而解毒楊清叟仙傳方有冲和膏以｜｜為君蓋得此意也其方治一切癰疽發背流注諸腫毒冷熱不明者｜｜皮炒三兩獨活去節炒三兩赤芍炒二兩生白芷一兩木蠟炒一兩為末用葱湯調熱傅血得熱則行葱能散氣瘡不甚熱者酒調之痛甚者筋不伸者加乳香大抵癰疽流注皆氣血凝滯而成

十八

紫荊

時珍曰入手太陰肺足陽明胃經

遇溫則散遇涼則凝此方溫平｜｜皮破血消腫獨活止風動血引拔骨中毒去痹濕氣赤芍生血止痛木蠟消腫散血同獨活能破石腫堅硬白芷去風生肌止痛蓋血生則不死血動則流通肌生則不爛痛止則不焮風去則血自散氣破則硬可消毒自除矣

方

婦人血氣｜｜皮為末醋糊丸櫻桃大每酒化服一丸 熊氏補遺

鶴膝風攣｜｜皮三錢老酒煎服 直指

猘犬咬傷｜｜皮末沙糖調塗留口退腫口中仍嚼嚥杏仁以去毒

一切癰疽皆治單用｜｜皮見仙傳外科

發背初生為末酒調箍住自然撮小內服柞木飲子乃救貧良方也 仙傳外科

癰疽未成用白芷｜｜皮等分為末酒調服外用｜｜皮木蠟赤芍等分為末酒調作箍藥 同上

辛夷 又名辛雉 本經 侯桃 同上 房木 同上 木筆 拾遺

宗曰肺主鼻膽移熱於腦則鼻多濁涕而淵風客於腦則鼻塞經曰腦滲為涕王氏曰膽液不澄則為濁涕如泉不已故曰鼻淵又曰｜｜性走竄氣虛火甚者忌服

集解宗奭曰｜｜即木筆花也有桃紅紫色二種入藥當用紫者須未開時采之已開者不佳
時珍曰亦有白色者人呼為玉蘭
別錄曰去毛用毛射人肺令人欬
花辛溫治五臟身體寒熱頭風腦痛面䵟本經溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀〻如在車船之上者生鬚髮去白虫別錄通關脉治頭痛憎寒體噤瘙痒入面脂生光澤大明治鼻淵鼻鼽鼻窒鼻瘡及痘後鼻瘡並用研末入射香少許葱白蘸入數次甚良時珍
之才曰川芎為之使惡五石脂畏菖蒲〻黃〻連石膏黃環

〔鳴皋曰〕古人謂九竅不和皆屬胃病本此發明有至理

〔元素曰〕脾經氣分藥〔希雍曰〕入足太陰脾手太陽大腸太陽小腸經

鳴皋曰按——形狀味似即今所市之山櫻桃也　禹錫云五月始熟今北京櫻桃市能即市山櫻桃似櫻桃而有毛不光味甘酸濇未知即是——否俟考

希雍曰其主大腹水腫面目四支浮腫者經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰諸腹脹大

發明〔時珍曰〕鼻氣通於天天者頭也肺也肺開竅於鼻而陽明胃脈環鼻而上行腦為元神之府而鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不利——之辛溫走氣而入肺其體輕浮能助胃中清陽之氣上行通於天所以能溫中治頭面目鼻九竅之病軒岐之後能達此理者東垣一人而已

郁李 又名薁李詩疏 爵李別錄 車下李同上 爵李本經 雀梅詩疏 棠棣爾雅

集解〔弘景曰〕山野處處有之子熟赤色〔保昇曰〕樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸而香味濇〔宗奭曰〕——子如御李子紅熟堪啖微濇亦可蜜煎陝西甚多〔時珍曰〕其花粉紅色實如小李

核仁酸平〔權曰〕苦辛〔元素曰〕辛苦　治大腹水腫面目四肢浮腫

皆偏於熱脾虛而濕熱客之則小腸不利
水氣泛溢於面目四支辛苦能潤熱結降
下善道十摧閉小便利則水氣從之而出矣

〔昂曰〕治標之劑多服滲人津液

利小便水道本經腸中結氣關格不通甄權泄五臟膀胱
急痛宣腰胯冷膿消宿食下氣大明破癖氣下四肢水
酒服四十九粒能瀉結氣孟詵破血潤燥元素專治大腸
氣滯燥澀不通李杲研和龍腦點赤眼宗奭〔斅曰〕去皮尖蜜浸研
如膏
用

〔發明〕〔時珍曰〕郁李甘苦而潤其性降故能下氣利
水按宋史錢乙傳云一乳婦因悸而病既愈目
張不得瞑乙曰煮郁李酒飲之使醉即愈所以然者
目系內連肝膽恐則氣結膽橫不下郁李能去結隨
酒入膽結去膽下則目瞑矣此蓋得肯綮之妙者也
〔頌曰〕必效方療癖取車下李仁湯潤去皮及雙仁者
與乾麪相拌搗如餅若乾入水少許作餅大小一如
病人掌為二餅微炙使黃勿令至熟空腹吃一餅當

郁李仁　乾李子　二十

快利如不利更食一餅或飲熱米湯以利為度利不
止以醋飯止之利後當虛若病未盡一二日量力更
進一服以病盡為限不得食酪及牛馬等肉屢
試神效但須量病輕重以意加減小兒亦可用
方
小兒多熱 研ㄧㄧㄧ如杏酪日服 姚和衆至寶方
小兒秘結 大小便不
通並驚熱痰實大黃酒浸炒ㄧㄧㄧ研各一錢滑石
一兩搗和丸黍米大量兒大小加減服 錢乙直訣
腫滿氣急 不得卧ㄧㄧㄧ一大合搗末和麪作餅吃入口即大便通泄氣便愈 楊氏產寶
腳氣浮腫 心腹滿大小便不通氣急欬息者ㄧㄧㄧ十二分搗爛水研汁苡仁三合同煮粥食
獨行方

郁李子 又名楮李 錢氏 郁梓 別錄 山李子 圖經 牛李 別錄 皁李 蘇恭 趙李 同上 牛皁子 綱目 烏槎子 同上 烏巢子 圖經

集解〔頌曰〕即烏巢子也今川蜀多有之枝葉如李其實若五味子色黑其汁紫色熟時采日
乾〔宗奭曰〕即牛李也木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生生時青熟則紫黑色至秋葉落子尚在枝是處有今關陝及湖南江南江北甚多〔時珍曰〕生道路邊其實附枝如穗人采其嫩者取汁刷綠色〔又曰〕可以染綠故俗稱皂李

苦涼微毒治寒熱瘰癧本經水腫腹脹滿大明下血及碎肉除疝瘕積冷九蒸酒漬服三合日再服又搗汁傅牛馬六畜瘡中生蟲蘇恭豆瘡黑陷及癬疥有蟲時珍

發明〔時珍曰〕｜｜｜治痘瘡黑陷及出不快或觸穢氣黑陷古昔無知者惟錢乙小兒直訣必勝膏用之云牛李子即｜｜｜九月采黑熟者入砂盆擂爛生絹挍汁用銀石器熬成膏瓷瓶收貯常令透風

鼠李子

每服一皂子大煎桃膠湯化下如人行二十里再進一服其瘡自然紅活入射香少許尤妙如無生者以乾者為末水熬成膏又九籥衛生方亦云痘瘡黑陷用牛李子一兩炒研桃膠半兩每服一錢水七分煎四分服

皮苦微寒〔恭曰〕有小毒 治身皮熱毒別錄 風痺諸瘡寒熱大明 口疳齲齒及疳蟲蝕人脊骨者煮濃汁灌之神良蘇恭 忌鐵孟詵

發明〔頌曰〕劉禹錫傳信方治大人口中疳瘡發背萬不失一用山李根一名牛李野薔薇根各細切五升水煎濃汁再於銀石器中盛之重湯熬稠膏瓷器収貯每稍含嚥必瘥忌醬醋油膩熱麪及肉如發背以帛塗之神效襄州軍事柳崖妻竇氏患口疳十五年齒盡落不可近用此而愈

〔希雍曰〕入足太陽膀胱手陽明胃兼入足少陰腎經〔鳴臯曰〕自是少陰主藥

〔希雍曰〕濇可去脫脾虛滑洩不禁非濇劑無以固之膀胱虛寒則小便不禁腎與膀胱為表裏腎虛則精滑從小便出此藥氣温味酸濇入三經而收斂虛脫之氣故主

諸症

〔鳴臯曰〕用治胎滑易殞案見旱蓮草

〔介賓曰〕善治夢遺崩淋帶漏止吐血衂血生津液收虛汗斂虛火益精髓補五臟養血氣平咳嗽定喘急療怔忡驚悸止脾泄

金櫻子

又名刺梨子 開寶 山石榴 綱目 山雞頭子

〔時珍曰〕小蘗 杜鵑花 並名山石榴同名異物

集解

〔保昇曰〕｜｜在處有之花白子形似榅桲而小色黃有刺〔頌曰〕今南多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實今校之與營實殊別也〔時珍曰〕山林間甚多花最白膩其實大如指頭狀如石榴而長其核細碎而有白毛如營實之核味甚濇

酸濇平治脾洩下痢止小便利濇精氣久服令人耐寒輕身 蜀本

發明

〔頌曰〕洪州昌州在在有之煮其子作煎寄餽人服食家用煎和芡實粉為丸服名水陸二仙丹益氣補真最佳〔愼微曰〕沈存中筆談云｜｜｜止遺泄取其温且濇也世人待紅熟時取汁熬膏味甘全

小水不禁此固陰養陰之佳品而人忽之
可惜也【嵩皋按】濇以止脫故能治崩帶至
於治吐衄須善用之如火實血湧遽以濇
止之恐致於凝果係虛脫用之當有神效

失濇味失本性矣惟當取半黃者用之【宗奭曰】九十
月霜熟時采用不爾反令人利【震亨曰】經絡隧道以
通暢為平和而昧者取濇性為快熬｜｜｜膏食之
自作不靖咎將誰執【時珍曰】無故而服之以取快慾
則不可若精氣不固
者服之何咎之有

方 活血駐｜｜｜｜去刺去核熬膏似稀餳每酒服一匙其功不可備述 孫真人食忌

補血益精｜｜｜｜去刺及核焙四兩縮砂二兩煉蜜為丸每酒下五十丸 奇效方

久痢不止罌粟殼醋炒｜｜｜｜及花葉等分研末蜜丸芡子大每陳皮湯下五七丸 普濟方

葉 五月五日采同桑葉苧葉等分陰乾研末傅之治金瘡出血極妙名軍中一捻金 時珍

根 用東行者治寸白虫剉二兩入糯米三十粒水

寫皋曰———手太陰肺陽明大腸經藥

昂曰苦以泄氣消痰酸以斂肺降火濇以
收脫止瀉温以開胃調中
希雍曰苦所以洩濇所以收温所以通惟
斂故能主心腹脹滿惟温故能下食甄權
用以止水道蕭炳用以止久痢久洩蘇頌
用以治腸風下血帶下丹溪用以實大腸
無非苦濇收斂治標之功也

二升煎五合服須臾瀉下神效 大明

訶黎勒 音呵 又名訶子

集解 恭曰———生交州愛州 頌曰 今嶺南皆有
廣州最盛樹似木梡花白子似巵子橄欖青
黃色皮肉相着七八月熟時采六路者佳未熟時
風飄落者名隨風子暴乾收之益小者佳彼人尤
貴之 蕭炳曰 波斯舶上來者六路黑色肉厚者良
六路即六稜也 斅曰 凡使勿用毗黎勒箇箇毗頭
毗音比 白也
也———文只六路或多
或少並是雜路不堪用

苦温 權曰苦甘 炳曰苦酸 珣曰酸濇 温 王好古曰苦酸平苦重酸輕 治冷氣心腹脹
滿下食 唐本 破胸膈結氣通利津液止水道黑髭髮 甄權
下宿物止腸澼久洩赤白痢 蕭炳 消痰下氣化食開胃

〔昂曰〕能開音止渴肺斂則音開火降則渴止故古方有訶子清音湯

〔昂曰〕生用清金行氣煨用溫胃固腸

希雍曰訶子性溫味濇濇主收不主散故咳嗽因於肺有實熱泄瀉因於濕熱所致氣喘因於火逆衝上帶下因於虛熱而不因於虛寒及腸澼初發濕熱正盛小便不禁因於腎家虛火法並忌之至濕熱滯下實火喘嗽用之立致殺人

〔昂曰〕得人參治肺虛寒嗽得陳皮砂仁治冷氣腹脹佐白朮蓮子治虛寒久瀉佐樗

除煩治水調中止嘔吐霍亂心腹虛痛奔豚腎氣肺氣欬急五膈氣腸風瀉血崩中帶下懷孕漏胎及胎動欲生脹悶氣欬并患痢人肛門急痛產婦陰痛和蠟燒烟熏之及煎湯熏洗大明治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝蘇恭實大腸斂肺降火震亨

發明〔宗奭曰〕———氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖濇腸而又泄氣其味苦濇故耳〔杲曰〕肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之訶子苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用〔丹溪曰〕訶子下氣以其殊苦而性急肺苦急急食苦以瀉之謂降而下走也氣實者宜之若氣虛者似難輕服又治肺氣因火傷極遂一遏脹滿其味酸苦有收斂降火之功也〔時珍曰〕訶子同烏梅五倍子用則收斂同橘皮厚朴用則

皮治腸澼便血同蛇床五味山萸川斷杜仲治虛寒帶下同益智子止氣虛寒小水不禁

[暴曰]凡酸収之品未有不滯氣者如木瓜烏梅等藥是也惟｜｜｜酸収而又能下氣

下氣同人參用則能補肺治咳嗽東垣云嗽藥不用者非矣但嗽未久者不可驟用耳[珣曰]｜｜｜皮主嗽肉主眼濇痛波斯人將｜｜｜大腹等在船上用防不虞或遇大魚放涎滑水中數里船不能通乃煮此洗其涎滑尋化為水則其治氣消痰之功可知矣

[頌曰]｜｜｜主痢唐本草不載仲景治氣痢有方劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下痢諸藥服遍久不瘥轉為白膿令狐將軍傳此方用｜｜｜三枚兩炮一生並取皮末之以沸漿水一合服之若只水痢加甘草末一錢若微有膿血加三錢血多亦加三錢

方

下氣消食　｜｜｜一枚為末水煎三五沸如麵一塵色入少塩飲之　食醫心鏡

一切氣疾　宿食不消｜｜｜一枚入夜含之至明嚼嚥　千金方

氣嗽日久　生｜｜｜一枚含之嚥汁瘥後口爽不知味

嘔逆不食　｜｜｜皮二兩炒研糊丸梧子大白湯下二十丸　廣濟方

風痰霍亂　食不消大便濇｜｜｜三枚取皮為末和酒頓

訶黎勒　烏藥　二十四

[好古曰]入足陽明少陰胃腎經[景岳曰]上入脾肺下通腎經

[介賓曰]亦入三焦膀胱

服炒 外臺方

小兒霍亂｜｜｜一枚為末湯服一半未止再服 子母秘錄

小兒風痰壅閉語音不出氣促欲悶手足動搖｜｜半生半炮大腹皮等分煎服名二聖散 全幼心鑑

氣痢水瀉｜｜｜十枚麩煨去核研末米飲頓服亦可飯丸一加木香○長服方｜｜｜橘皮厚朴各三兩蜜丸桐子大白湯下二三十丸 圖經本草

下痢轉白｜｜｜三枚二炮一生為末白湯調服水痢加甘草末一錢 普濟

赤白下痢｜｜｜十二枚六生六熟為末赤痢生甘草湯下白痢炙甘草湯下 濟急

妬精下疳大｜｜｜燒灰入射香少許先以米泔洗淨搽之或以黃柏荊芥甘草馬鞭草葱白煎湯洗一人莖爛二寸用此愈 夷堅志

烏欒又名旁其 拾遺 鰟魮 綱目 矮樟 [時珍曰]葉狀似鰟魮鯽魚故名亦呼矮樟其氣似樟也

集解[藏器曰]｜｜生嶺南及江南樹生似茶高丈餘一葉三椏葉青背白根狀似山芍藥及烏

〔昂曰〕癰癤疥癘皆成於血逆故理氣亦可治之

樟根色黑褐作車轂紋橫生其直根者不堪用〔頌曰〕今台州雷州衡州皆有之以天台者為勝木似茶檟高五七尺葉微圓而尖面青背白有紋四五月開細花黃白色六月結實根有極大者嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並以八月采根如車轂紋形如連珠者佳或云天台者香白可愛不及南海者力大〔時珍曰〕吳楚山中極多人以為薪根葉皆香但根不甚大纔如芍藥耳嫩者肉白老者肉褐色

根辛溫治中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲〔藏器〕除一切冷霍亂反胃吐食瀉痢癰癤疥癘并鮮冷熱其功不可悉載猫犬百病並可磨服〔大明〕理

芳香洩纖也

昂曰厥逆痰壅口禁脈伏身温為中風身冷為中氣又有痰為中風無痰為中氣局方治此用｜｜順氣散許學士云暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆每得中氣症不可作中風治又曰氣虚氣熱者禁用

元氣好古中氣脚氣疝氣〻厥頭痛腫脹欬急止小便頻數及白濁時珍

發明宗奭曰｜｜性利氣少走泄多但不甚剛猛同沉香同磨作湯點服治胸腹冷氣甚穩當時珍曰｜｜辛温香竄能散諸氣故恵民和劑局方治中風中氣諸證用｜｜順氣散者先疎其氣〻順則風散也嚴用和濟生方治七情欝結上氣欬急用四磨湯者降中兼升瀉中帶補也其方以人參烏藥沈香檳榔各磨濃汁七分合煎細〻嚥之朱氏集驗方治虚寒小便頻數縮泉丸用同益智仁等分為丸服者取其通陽明少陰經也方見益智下

方　烏沉湯治一切氣一切冷補五藏調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺俯仰不利風水腫毒吐瀉轉筋癥癖刺痛中悪心痛鬼氣疰忤天行瘴疫婦人血氣痛用｜｜一百兩沉香五十兩人參

三兩甘草四兩為末每服　一切氣痛不拘男婦冷氣
半錢薑鹽湯點服　和劑　肥氣血氣息賁
伏梁奔豚搶心切痛冷汗欲息欲絕｜｜小者酒浸
一夜炒回香炒青橘皮去白炒良薑炒等分為末溫
水童便下　香烏散用香附｜｜等分為
衛生家寶方　男女諸病末每服一二錢飲食不進薑
棗湯下瘧疾乾薑白鹽湯下腹中有虫檳榔湯下頭
風虛腫清茶下婦人冷氣米飲下產後血攻心脾痛
童便下婦人血海痛男子疝　小腸疝氣｜｜一兩升
痛茴香湯下　乾坤秘韞　麻八錢水煎
露一宿空心熱　小兒慢驚昏沉或搐｜｜磨　氣厥頭
服　孫氏集效　水灌之　濟急方
痛不拘老少及產後頭痛烏藥川芎等分為末每
服二錢臘茶調下產後霹靂酒下　濟生方　咽
喉閉痛生｜｜以酸醋濃煎減半先
噙後嚥吐惡涎為愈　經驗　心腹氣痛｜｜水磨
濃汁一盞入橘皮一片
蘇葉一片煎服　集簡
烏藥　五加皮

二十六

鳴皋曰汪昂云｜｜｜療筋骨拘攣又云腎得其養則妄水去而骨壯肝得其養則邪風去而筋强駝則｜｜｜乃肝腎二經藥也

本雅曰入足少陰腎厥陰肝經

鳴皋曰仙經以地榆為玉豉以｜｜｜為金鹽

五加皮

又名五佳綱目五花炮炙論文章草綱目白刺同上追風使圖經木骨同上犲漆本經犲

節別錄

集解

頌曰江淮湖州郡皆有春生苗葉俱青作叢赤莖又似藤葛高三五尺上有黑刺葉生五枚作簇者良四葉三葉者最多為次每一葉下生一刺三四月開白花結青子至六月漸黑色根若荆根皮黃黑肉白色骨硬一說今有數種北地者大片類秦皮黃柏輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘無所用吳中乃剝野椿皮為五加柔韌而無味殊為乖失今江淮所生者根類地骨皮輕脆芳香其苗莖有刺類薔薇長者至大餘葉五出香氣如橄欖春結子如豆粒而扁青色得霜乃紫黑俗但名為追風使以漬酒治風乃不知為眞五加也今吳中往往以為藩籬正似薔薇金銀輩而北間不知用此種機曰生南地者類草故小生北地者類木故大時珍曰唐時惟取峽州者充

〔昂曰〕辛順氣而化痰苦堅骨而益精溫祛風而勝濕逐肌膚之瘀血療筋骨之拘攣

〔希雍曰〕觀本經所主諸症皆因風寒濕傷於二經之故而濕氣尤為最也其治疝氣腹痛療躄小兒不能行陰蝕瘡疽陰痿囊濕小便餘瀝女子陰痒脊痛腳痛痹風弱者何莫非二經受風寒邪所致經云傷於濕者下先受之又云地之濕氣感則害人皮肉筋脈肝腎居下而主筋骨故風寒濕之邪多自二經先受此藥辛能散風溫能除寒苦能燥濕二臟得其氣而諸症悉愈矣又濕氣浸淫則五臟筋脈緩縱濕氣留中則虛羸之氣濕邪去則中焦治而筋骨堅氣自益而中自補也

貢〔別録曰〕———五葉者良〔弘景曰〕四葉者亦好

根皮同莖辛溫主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒三歲不能行疽瘡陰蝕本經男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰癢及腰脊痛兩腳疼痹風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老別録破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟腳腰脊痛主多年瘀血在皮肌治濕痹內不足甄權明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷大明釀酒治風痹四肢攣急蘇頌浸酒飲治目僻眼䁲雷斆葉作蔬食去皮膚風濕大明

鳴皐曰遠志辛散能舒通心腎之氣故與相宜 千金方云忌醋

希雍曰得牛膝木瓜黄柏麥冬生地苡仁石斛虎脛骨山藥治濕熱痿痺腰脚不能行動　同川斷杜仲牛膝山萸巴戟故紙治腎虚寒濕客之作腰痛　同二朮川萆石菖蒲苡仁白蒺藜甘菊防風二活白鮮皮石斛治風寒濕成痺

之才曰遠志為之使惡蛇皮

發明 時珍曰｜｜｜治風濕痿痺壯筋骨其功良深造酒之法用｜｜｜去骨莖葉亦可煮汁和麴釀酒時時飲之亦可煮酒飲加遠志更良一方加木瓜談埜翁試驗方云神仙煮酒法用五加皮地榆刮去粗皮各一斤袋盛入無灰酒二斗中大罈封固安大鍋内文武火煮之罈上安米一合米熟為度取出渣晒乾為丸每旦服五十丸藥酒送下臨卧再服能去風濕壯筋骨順氣化痰添精補髓久服延年功難盡述王綸醫論云風病飲酒能生痰動火惟｜｜｜一味浸酒日飲數盃最有益蓋｜｜｜與酒相合也

方 虚勞不足 ｜｜｜地骨皮各一斗水一石五斗煮七斗分四斗浸麴三斗拌飯釀酒任飲

千金方 男女脚氣 骨節皮膚腫濕疼痛服此進飲食健氣力不忘事｜｜｜四兩遠志去心四兩浸酒春秋三日夏二日冬四日出渣日乾為丸梧子大每服四五十丸原酒下　見瑞竹堂方

希雍曰入手足陽明大腸胃本經
又曰丹溪言京而燥者其用自是散寒若
燥之藥

小兒行遲三歲不能行者用此便走｜｜｜五錢牛膝木瓜各二錢半為末每服五分米飲入酒數滴下見全幼心鑑

婦人血風勞憔悴困倦喘滿虛煩噏ゝ少氣發熱多汗口乾舌濇不思飲食名血風勞宜油煎散用五加皮赤芍藥或用牡丹當歸各一兩為末每用一錢水一盞用青錢一文蘸油入藥煎七分溫服和劑

五勞七傷五月五日採五加莖七月七日采葉九月九日取根篩研每酒服方寸匕日三久服去風勞千金

服石發毒或熱噤向冷地卧｜｜二兩水煮發時便服外台秘要

椿樗香者為椿臭者為樗又名虎目樹拾遺大眼桐

葉苦溫煮水洗瘡疥風疽樗木根葉尤良唐本白禿不生髮取椿桃楸葉心搗汁塗之時珍

〔昂曰〕醋炙蜜炙用忌肉麪

發明〔詵曰〕椿芽多食動風熏十二經脉五臟六腑令人神昏猪肉熱麪食則中滿蓋擁經絡也〔時珍曰〕椿葉無毒樗葉有小毒

白皮及根皮 苦溫〔震亨曰〕凉而燥〔藏器曰〕樗根有小毒 治疳䘌樗根尤良〔唐本〕 去口鼻疳蟲殺蚘虫疥䘌鬼疰傳尸蠱毒下血及赤白久痢〔藏器〕 得地榆止疳痢〔蕭炳〕 止女子血崩產後血不止赤帶腸風瀉血不止腸滑瀉縮小便蜜炙用〔大明〕 利溺濇治赤白濁赤白帶濕氣下痢精滑夢遺燥下濕去肺胃陳積之痰〔丹溪〕

〔斅曰〕凡使椿根不近西頭者為上〔時珍曰〕椿樗木皮根皮並刮去粗皮陰乾臨時切焙用樗根制硫黃砒

石黃
金

發明

［詵曰］女子血崩及產後血不止月信來多并赤
帶下宜取東引細椿根一大握洗淨以水一大
升煮汁分服便斷小兒疳痢亦宜多服仍取白皮一
握粳米五十粒葱白一握炙甘草三寸豉兩合水一
升煮半升以意服之枝葉功用皆同［震亨曰］椿根白
皮性凉而能濇血凡濕熱為病瀉痢濁帶精滑夢遺
諸證無不用之有燥下濕及去肺胃陳痰之功治瀉
痢有除濕實腸之力但痢疾滯氣未盡者不可遽用
宜入丸散亦可煎服不見有害予每用炒研糊丸看
病作湯使名固腸丸也［時珍曰］椿皮色赤而香樗皮
色白而臭多服微利人盖椿皮入血分而性濇樗皮
入氣分而性利不可不辨其主治之功雖同而濇利
之效則異正如茯苓芍藥赤白頗殊也凡血分受病
不足者宜用椿皮氣分受病有鬱者宜用樗皮此心
得之微也乾坤生意治瘡腫下藥用樗皮以無根水
研汁服二三碗取利數行是其驗矣故陳藏器言樗

昂曰按此方仍是作劑治樗皮止瀉痢仍是濇劑

鳴臯曰大腸連肛門甚痛係濕熱然則樗皮之性涼可証

皮有小毒蓋有所試也宗奭曰一婦年四十餘耽飲多食魚蟹積毒在臟日夜數十瀉便與膿血雜下大腸連肛門甚痛用止血痢藥不效用腸風藥益甚蓋腸風有血無膿也服熱藥則痛甚血多服冷藥則注瀉食減服溫平藥則若不知年餘待死或教服人参樗皮散二味等分研末酒或米飲調下遂愈

去鬼氣方 樗根一握細切以童便二升豉一合浸一宿絞汁煎一沸三五日一度服　陳藏器本草方

小兒疳疾 椿白皮日乾二兩為末以粟米濃汁和丸梧子大十歲三四丸米飲下量兒大小加減　子母秘錄

休息痢疾 日夜無度腥臭不可近臍腹撮痛東垣脾胃論用椿根白皮訶子各半兩母丁香三十箇為末醋丸梧子大每服五十丸米飲下○椿白皮用東南行根長流水漂三日去黃皮焙為末每一兩加木香二錢飯丸每米飲下一錢二分　經驗方

水穀下痢 久不愈兼腰痛樗皮一兩研細以麪和如皂子大每空心服十丸水煮熟服　傳信

下痢清血

時珍曰手足太陽三焦膀胱手陽明大腸經

腹中刺痛椿白皮晒研醋糊丸桐子大每早米飲下四十丸一加只壳蒼朮 經驗 臟毒下血溫白丸椿白皮酒浸晒研棗肉和丸桐子大每酒下五十丸 儒門事親 下血經年 樗白皮二錢水煎入酒半盞服作丸亦可虛者加參 仁存方 女人白帶 椿根白皮滑石等分為末粥丸梧子大空腹白湯下一百丸○又椿根白皮一兩半乾薑炒黑白芍炒黑黃柏炒黑各二錢為末粥丸服 丹溪 男子白濁 方同上

莢 又名鳳眼草 治大便下血 嘉祐

方 腸風下血 椿莢半生半燒為末米飲下二錢 普濟

榆白皮 甘平滑利治大小便不通利水道除邪氣 本經 療腸胃邪熱氣消腫治小兒頭瘡痂疕 別錄 通經脈

〔集曰〕榆皮性粘滑似人津液故行津液凡人津液足則胃中渣滓皆隨津液而滑下津液涸則粘乾於胃矣所以榆皮能消留着有形也但榆皮性涼而消不入氣分久服泄真氣之說似亦不然

擣涎傅癬瘡大明 滑胎利五淋治齁㱇𤸷不眠甄權 生皮

乳汁下出内結成腫名妬乳

擣和三年醋滓封暴患赤腫女子妬乳腫日六七易

效孟詵 利竅滲濕熱行津液消癰腫時珍

發明〔詵曰〕人擣白皮為末和菜葅食甚美令人能食日服丹石人亦服之取利關節故也〔時珍曰〕榆皮榆葉性皆滑利下降手足太陽手陽明經藥也故人小便不通五淋腫滿欬嗽不眠經脈胎產諸病宜之本草十劑云滑可去著冬葵子丨丨丨之屬是也蓋亦取其利竅滲濕熱消留著有形之物耳氣盛而壅者宜之若胃寒而虛者久服滲利恐洩真氣蘇頌謂榆粉久食不損人恐非確論榆莢作羹食令人多睡

嵇康養生論云榆令人瞑

方 齁喘不止丨丨丨陰乾焙為末每用二錢水五合煎如膠服日夜數次 食療 虛勞白濁丨丨丨二升水煮濃汁分服 千金 五淋澀痛丨丨丨陰乾焙為末每以二錢

煎如膠服普濟**渴而尿多**非淋也｜｜｜煎濃取汁服三合日三 外臺**身體暴**

腫｜｜｜末同米作粥食小便利良 備急**臨月易產**｜｜｜焙為末每服方寸匕日三產

極易 本草別說**胎死腹中**或母病欲下胎｜｜｜煮汁服二升 子母秘錄**癰疽**

發背｜根｜｜切清水洗搗極爛和香油傅之留頭出氣燥則以苦茶頻潤不粘更換新者將愈以

桑葉嚼爛隨大小貼之神效 救急

葉 嫩者作羹食消水腫利小便下石淋壓丹石 藏器

煎汁洗酒皶鼻同酸枣仁等分蜜丸日服治胆熱虛

勞不眠 時珍

莢 作羹食令人多睡和牛肉作羹食主婦人帶下

榆白皮 海桐 三十一

「布雅曰」入足太陽明脾胃經

「鳴皋曰」｜｜諸家罕言之然自為要藥
痛痺家不可缺也觀其所主功在去風濕

藏器

海桐 又名刺桐

集解「頌曰」海桐生南海及雷州近海州郡亦有之
葉大於手作三花尖皮若梓白皮而堅韌可
作繩及水不爛又云嶺南有刺桐葉如梧桐其花
附幹而生側數如掌形若金鳳枝幹有刺花色深
紅江南有赬桐紅花無實「時珍曰」｜｜皮有巨刺
如黿甲之刺或云即刺桐皮也按嵇含南方草木
狀云九真有刺桐布葉繁密三月開花赤色照映
三五房凋則三五房復發陳翥桐譜云刺桐生山
谷中文理細密而性喜拆裂體有巨刺如欓樹其
實如楓赬桐身青葉圓大而長高三四尺便有花
成朶而繁紅色如
火為夏秋榮觀

皮苦平「大明曰」溫　治霍亂中惡赤白久痢除疳𧏾疥癬牙

惟去風濕故又殺虫東壁言能行經絡達
病所是亦以通為用之品也

齒虫痛並煮服及含之浸水洗目除膚赤 開寶 主腰脚
不遂血脉頑痺腿膝疼痛赤白瀉痢 李珣 去風殺虫煎
湯洗赤白 時珍

發明 頌曰古方多用浸酒治風蹶南唐筠州刺史王
紹顏續傳信方云頃年余在姑熟得腰膝痛
不可忍醫以腎臟風毒攻刺諸藥莫療因覧劉禹錫
續傳信方備有此驗脩服一劑便减五分其方用｜
｜｜二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘
草半兩苡仁二兩生地黄十兩並淨洗焙乾剉以綿
包裹入無灰酒二斗浸之冬二七夏一七空心飲一
盞每日早午晚各一次常令醺醺此方不得加减禁
毒食 時珍曰｜｜｜能行經絡
達病所又入血分及去風殺虫

方 風癬有虫 ｜｜｜蛇床子等分為末以臘
猪脂調搽之 艾元英如宜方 風虫

海桐皮 蜜蒙花

希雍曰｜｜｜厥陰肝家正藥

牙痛｜｜煎漱 聖惠 中惡霍亂｜｜煮服 聖濟

密蒙花 又名水錦花 炮炙論

集解 頌曰｜｜｜蜀中州郡皆有樹高丈餘葉似冬青葉而厚背白有細毛又似橘葉花微紫色二三月采花曬乾 宗奭曰 利州甚多葉多不凋亦不似冬青柔而不光潔不深綠其花細碎數十房成一朶

冬生春開

甘平微寒治青盲膚翳赤腫多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼 開寳 羞明怕日 劉守真 入肝經氣分潤肝燥 好古

酒浸或蜜拌蒸

方 目中障翳｜｜｜黄柏根各一兩為末水丸梧子大每卧時湯服十丸或十五丸

聖濟方

木芙蓉 又名地芙蓉圖經木蓮綱目華木同上桃木音化拒霜

葉花 微辛平清肺涼血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛 時珍

發明 時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎粘其治癰疽之功殊有神效近時瘍醫秘其名為清涼膏清露散鐵箍散皆此也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗於腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易斂妙不可言或加生赤小豆研末尤妙

方 **久欬羸瘦** 九尖拒霜葉為末以魚鮓蘸食屢效 危氏得效方 **經血不止**

芙蓉花蓮蓬壳等分為末每米飲下二錢 婦人良方

偏墜作痛 芙蓉花葉黃柏各三錢為末以木鱉子仁一箇醋磨塗陰囊其痛自止 簡便方

癰疽腫毒 重陽前取芙蓉葉研末端午前蒼耳燒存性研末等分蜜水調塗四圍其毒自不走散名鐵井闌 簡便

頭上癩瘡 芙蓉根皮為末香油調塗先以松毛椰枝煎湯洗 醫學集成

山茶花 甘微辛寒(此據汪昂備要綱目彙味缺)治吐血衄血腸風下血並用紅者為末入童便薑汁及酒調服可代鬱金 震亨

湯火傷 研末麻油調塗 時珍

木槿 椵(音假) 爾雅 櫬 同上 日及 綱目 朝開暮落花 同上 藩籬草 同上 花奴 玉蒸 蕣 詩

〔時珍曰〕川中來者佳厚而色紅

皮及根　甘平滑〔大明曰涼〕止腸風瀉血痢後熱渴作飲服之令人得睡並炒用〔藏器〕治赤白帶下腫痛疥癬洗目令明潤燥活血〔時珍〕

發明　時珍曰木槿皮及花並滑如葵花故能潤燥色如紫荊故能活血川中來者氣厚力優故尤有效

方

赤白帶下　槿根皮二兩以白酒一椀半煎一椀空心服之甚妙〔纂要奇方〕

頭面錢癬　槿樹皮為末醋調重頓如膠傳之〔王仲勉經效方〕

牛皮癬　川槿皮一兩大風子仁十五箇半夏五錢剉河水井水各一椀浸露七宿入輕粉一錢禿筆掃塗覆以青衣數日有臭涎出妙忌沐浴夏月用尤妙〔扶壽方〕

癬瘡有蟲　川槿皮煎入皂角浸水頻頻擦之或以槿皮浸水磨

希雍曰入心脾二經心為君主之官脾為萬物之母脾虛則五臟不安心氣躁則拂鬱甘主益脾脾實則五臟安甘可緩心氣心氣舒則神明暢矣

嵇康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂

雄黃尤妙簡便方 痔瘡藩籬草根煎湯先熏後洗直指 脫肛槿皮煎洗後以白礬五倍子末傅之救急方

花甘平滑治腸風瀉血赤白痢並焙入藥作湯代茶治風大明消瘡腫利小便除濕熱時珍

方下痢噤口紅木槿花去蒂陰乾為末麪餅蘸食 趙宜真濟急方 風痰擁逆木槿花研末每服一二匙空心沸湯下白花尤良 簡便 反胃千葉白槿花陰乾為末陳糯米湯調送三五口不轉再服 袖珍

合歡皮又名合昏唐本夜合日華青裳圖經萌葛綱目烏賴樹 崔豹古今注云欲蠲人之忿贈以青裳謂植之庭除使人不忿

〔又曰〕子合橘核木瓜牛膝能治疝濕熱加黄柏寒濕加茴香〔孝按〕子能治疝並治孕婦腰腸痛則合歡之入肝經可証矣

鳴皋曰嘗見一孕婦患腰腸痛服藥不效武傳一單方用合歡莢炒熱研末燒酒冲服即愈則此藥亦能通厥陰肝絡也觀冠氏折傷疼痛之用則通行之性可知

〔鳴皋曰〕同雞仁服能治不眠

甘平安五臟和心志令人歡樂無憂明目本經煎膏消癰腫續筋骨大明殺虫搗末和鐺下墨生油調塗蜘蛛咬瘡用葉洗衣垢藏器折傷疼痛研末酒服二錢匕寇氏和血消腫止痛時珍

發明〔震亨曰〕合歡補陰之功甚捷長肌肉續筋骨與白蠟同入膏用神效而外科家不見録用何也

方　肺癰唾濁心胸煩錯取夜合皮一掌大水三升煮取一半分二服獨行方　撲損折骨ーーー去粗皮炒黑色四兩芥菜子炒一兩為末每服二錢溫酒卧時服以渣傳之接骨甚妙　小兒撮口ーー枝煎濃汁拭口中并洗之子母秘録　中風攣縮百一方ーー枝酒ーーー枝柏枝槐枝桑枝石榴枝並生剉各五兩羌活二兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗

希雍曰 入足陽明經

鳴皋曰 杉木芳香能除邪穢之氣辛溫能散寒濕之藥時為風家所資尤為濕家所時

煎五枝取二斗五升浸糯米五升黑豆五升蒸熟入麪與防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉常令有酒氣 奇效良方

杉 又名煔(音杉) 爾雅 沙木 綱目 椺木

木 辛微溫治漆瘡煮湯洗之無不瘥 別錄 煮水浸脚氣腫滿服之治心腹脹痛去惡氣 蘇恭 治風毒奔豚霍亂上氣並煎湯服 大明

發明 丹溪曰 ||節浸捋脚氣腫滿尤效 頌曰 柳子厚纂救死方云得脚氣夜半痞絕脇有塊大如石且死困不知人搐搦上視家人號哭滎陽鄭洵美傳||湯服半食頃大下三行氣通塊散方用||節一大升橘葉一大升無葉則以皮代大腹檳榔七枚連子碎之童便三大升共煮一大升半分為兩服

希雍曰入手足陽明經大腸胃

希雍曰本經味苦氣溫日華子言涼然詳其用應是辛苦溫之藥與巴豆牽牛大略相似

若一服得快即停後服死病會有救者乃得不死恐人病此故傳之

方 肺壅痰滯 上焦不利卒然欬嗽||眉一兩皂角去皮酥炙三兩為末蜜丸桐子大米飲下十丸一日三服 聖惠 肺壅失音 ||燒炭用湯淋下飲湯音出乃止 集簡 臁瘡黑爛 多年老||節燒灰麻油調傅箬葉隔之絹包定甚效 救急

烏臼木 又名鵶臼

集解 藏器曰葉可染皂子可壓油作燭 時珍曰南方平澤甚多今江西人種植采子蒸煮取脂澆燭子上皮脂勝於仁也

根白皮 苦涼有毒治暴水癥結積聚 唐本 療頭風通大小便 大明 解蛇毒 震亨

〔鴻舉曰〕李氏擬以大戟主性凉繆氏擬諸巴豆牽牛主性溫觀其能傳頭瘡治腫毒鮮砒毒則性凉可証

發明〔時珍曰〕烏臼根性沉而降陰中之陰利水通腸功勝大戟一野人病腫滿氣壯令掘此根搗爛水煎服一碗連行數行而病平氣虛人不可用之此方出太平聖惠方言其功效神聖但不可多服耳誠然或慢火炙黃用

方 **小便不通** 烏臼根皮煎湯飲 肘後 **大便不通** 烏臼根皮方長一寸切水一盞煎半盞服立通不用多吃其功神聖兼治水 斗門 **二便關格** 二三日則殺人烏臼東南根皮乾為末熟水服二錢先以芒硝二兩煎湯服取吐甚效 肘後 **水氣虛腫** 小便澀烏臼根皮梹榔木通各一兩為末每服二錢米飲下 聖惠 **脚氣濕瘡** 極癢有虫烏臼根為末傳之有涎出良 摘元 **尸注中惡** 心腹痛刺沉默錯亂用烏臼根皮煎濃汁一合調硃砂末一錢服 肘後 方無硃砂 永類 **暗疔昏狂** 瘡頭凸紅烏臼根經行路者取二尺許去皮搗爛井華水調服

杲曰極能瀉下凡患腫毒中砒毒者不拘根皮枝葉搗汁多飲得大利即愈虛人忌用

好古曰入厥陰肝 時珍曰入太陰陽明肺大腸兼入足厥陰肝

希雍曰頭風淚出者皆厥陰風木為病｜｜主之金能勝木也

杲曰厥陰脈絡陰器其客肝經則為囊結

一盞待瀉過以三角銀杏仁浸油搗罨患處 聖濟 小兒胎瘡滿頭用水边烏臼根研入雄黃少許生油調搽 飛蛾砒毒根皮半兩擂水服 醫方大成 經驗良方

皂角 又名皂莢本經 雞栖子綱目 烏犀同上 懸刀外丹本草

集解 時珍曰皂樹有三種一種小如猪牙一種長而肥厚多脂而粘一種長而瘦薄枯燥不粘以多脂而粘者佳樹多刺難采以篾箍其樹一夜自落亦一異也有不結實者樹鑿一孔入生鐵三五斤泥封之即結莢人以鐵砧槌｜｜即自損鐵碾｜｜之久則成孔鐵鍋爨之多爆片落豈｜｜與鐵有感召之情耶

辛鹹溫有小毒治風痹死肌邪氣頭風淚出利九竅殺精物本經 療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落

烏臼 皂角 三十七

嗎皋曰||服之多吐痰結肺經者可以
此吐之

好古曰審炙酥炙絞汁燒灰各隨方用

希雍曰稀涎散風邪暴病氣實者用之殊
效第似中風症由於陰虛火炎煎熬津液

明目益精可爲沐藥不入湯別錄通關節頭風消痰殺
虫治骨蒸開胃中風口噤大明破堅癥腹中痛能墮胎
又將浸酒中取盡其精煎成膏塗帛貼一切腫痛甄權
瘴暑久雨時合蒼朮燒烟辟瘟疫邪濕氣宗奭燒烟熏
久痢脫肛汪機搜肝風瀉肝氣好古通肺及大腸氣治咽
喉痹塞痰氣喘欬風癘疥癬時珍

之才曰柏實爲之使惡麥冬畏人參苦參 機曰伏丹
砂粉霜硫黃硇砂 斅曰新汲水浸一宿銅刀刮去
皮酥炙
透用

發明 好古曰||厥陰之藥活人書治陰 正氣散
日內用||引入厥陰也 時珍曰||屬金入手

結而為痰熱極生風以致猝仆人多用稀
涎散吐之大損津液
鳴皋曰如繆氏所指又屬控涎丹之症也

太陰陽明之經金勝木燥勝風故兼入足厥陰治風
木之病其味辛而性燥氣浮而散吹之導之則通上
下諸竅服之則治風濕痰欬腫滿殺虫塗之則散腫
消毒搜風治瘡按龐安時傷寒總病論云元祐五年
自春至秋蘄黃二郡人患急喉痹十死八九速者半
日一日而死黃州推官潘昌言得黑龍膏方救活數
千人其方治九種喉痹急喉痹纏喉風結喉爛喉遁
虫〻蝶重舌木舌飛絲入口用大丨丨四十梃切水
三斗浸一夜煎至一斗半入人參末半兩甘草末一
兩煎至五升去渣入無灰酒一升釜煤二匕煎如餳
入瓶封埋地中一夜每溫酒化下一匙或掃入喉內
取惡涎盡為度後含甘草片又孫用和家傳祕寶方
云凡人卒中風昏〻如醉形體不收或倒或不倒或
口角流涎出斯須不治便成大病此證風涎潮於上
胸痹氣不通宜用救急稀涎散吐之用大丨丨肥實
不蛀者四挺去黑皮白礬光明者一兩為末每用半
錢重者三字溫水調灌不大嘔吐只是微〻稀冷涎
或出一升二升當待醒〻乃用藥調治不可便大吐

皂角　三十八

[昂曰]凡卒中不省人事口噤不能進藥者急提頭髮手掐人中用｜｜末或半夏末吹鼻有生無嚏死蓋肺氣絕也

之恐過劑傷人屢效不能盡述[宗奭曰]此法用｜｜一兩生白礬末半兩膩粉半兩水調一二錢過咽即吐涎用礬者分膈下之涎也

方｜中風口噤 痰涎潮壅｜｜一挺去皮猪脂塗炙黃色為末每服一錢溫酒調下氣壯者二錢以吐出風痰為度 簡要濟衆

中暑不省 ｜｜一兩燒存性甘草一兩微炒為末溫水調一錢灌之 澹寮

鬼魘自縊 等暴卒｜｜末吹之嚏則甦 千金

溺死 ｜｜絹裹末納下部候須臾出水即活 外臺秘要方

急喉痺 逡巡不救｜｜生研末以少許點患處外以醋調厚封項下須臾便破出血即愈或挼水灌之亦良○直指用｜｜｜｜肉半截水醋半盞煎七分服出血

咽喉腫痛 ｜｜去皮醋浸炙七次勿令太焦每吹少許吐涎即止 聖濟

愈

風邪癎疾 ｜｜燒存性四兩蒼耳根莖葉日乾四兩蜜陀僧一兩為末丸梧子大硃砂為衣每服三四十丸棗

〔吊曰〕老人風秘取中脘湯泡服即通

湯下日二服稍退只丨丨三十挺去皮切
服二十丸　永類　**胸中痰結**　水五升浸一夜挼取
汁慢火熬至可丸丸梧子大每食後鹽湯下十丸○
釣痰膏用半夏醋煮過以丨丨膏和勻入明礬少許
以柿餅搗膏丸彈　**欬逆上氣**　唾濁不得臥丨丨丸用
子大含之　聖惠　丨丨炙去皮子研末蜜
丸梧子大每服一丸棗膏　**痰欬咳嗽**　長丨丨三條去
湯下日三夜一　仲景　皮子一莢入巴
豆十粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用薑汁
製杏仁麻油製巴豆蜜製半夏一處慢火炙黃色為
末每用一字臨臥以薑　**卒寒咳嗽**　丨丨燒研末豉湯
汁調之吃下效　選奇　服二錢　千金
痰欬　喉中作水雞聲用丨丨兩挺酥炙取肉為末蜜
丸豆大每服一丸取微利為度不利更服日一
服　**腫滿入腹**　脹急丨丨去皮子炙黃為末酒一斗
必效　石器煮沸服一升日三服　肘後方
二便關格　千金用丨丨燒研粥飲下三錢立通○宣
明方鉄脚丸用丨丨炙去皮子為末酒麪

皂角　三十九

糊丸每服五十丸酒下○聖恵用
丨丨燒烟於桶内坐上熏之即通　食氣黄腫氣欲胸滿用不
蛙丨丨去皮于醋塗炙焦為末一錢巴豆七粒去油
膜以淡醋研好墨和丸麻子大每服三丸食後陳橘
皮湯下日三服隔一日増　卒熱勞疾丨丨續長一尺
一丸以愈為度　經驗　以上酥一兩微
塗緩炙酥盡擣篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十五
丸漸加至二十丸重者不過兩劑愈　崔元亮海上
方　急勞煩熱體瘦三皂丸用丨丨皂刺皂樹皮各一
斤同燒灰以水三斗淋汁再淋如此三
五度煎之候少凝入射香一分以童子小
便浸蒸餅丸小豆大每服七丸　聖恵　傷寒初得
不問陰陽以丨丨一挺肥者燒赤為末
以水五合和頓服之陰病極效　千金　時氣頭痛煩熱
用丨丨燒研新汲水一盞薑汁蜜各
少許和二錢服之取汁即愈　聖恵　風虫牙痛用丨末
塗患處吐　牙痛丨丨食塩等分為末　霍亂轉筋丨丨
涎　外臺　日揩之　千金方　末吹

鼻取啶即｜｜燒研綿果
安　深師　下部慝瘡　導之　肘後　外腎偏墜｜｜疼痛
末傳之　便毒｜｜炒焦水粉炒等分研末以熱醋調
梅師　塗患處頻以水潤之○又方用牙｜｜
七片煨黃去皮弦為末空　袖珍方用猪牙
心酒下五錢　袖珍方　婦人吹乳｜｜蜜炙為末
酒服一錢○又詩云婦人吹乳法如何｜｜燒
灰蛤粉和熱酒一盃調八字管教立刻笑呵呵　大風
諸癩長｜｜二十條炙去皮子以酒煎稠濾過候
冷入雪糕和丸梧子大酒下五十丸　直指　積
年疥瘡　猪肚內放｜｜煮熟　丁瘡惡腫｜｜酥炙為
去｜｜食之　袖珍　末入射香少
許人糞少許和塗五　小兒頭瘡　白禿｜｜燒黑為末
日後根出　普濟　去痂傳之不過三次
愈　筆　小兒惡瘡｜｜水洗淨以麻油　腎囊風痒　以
峰雜興　搗爛塗之　肘後　稍
草燒｜｜烟熏十餘
次即止　濟急仙方
皂角　皂刺

四十

皂刺 一名天丁

辛溫米醋熬嫩刺作煎塗瘡癬有奇效 蘓頌 治癰腫妬乳風癘惡瘡胎衣不下殺虫 時珍

發明 楊士瀛曰｜｜能引諸藥性上行治上焦病 震亨曰能引至癰疽潰處甚驗 時珍曰｜｜治風殺虫功與莢同但其銳利直達病所為異耳神仙傳云崔言一旦得大風惡疾双目昏盲眉毛脫落鼻梁崩倒勢不可救遇異人傳方用｜｜三斤燒灰蒸一時久日乾為末食後濃煎大黃湯調一匕飲之一旬眉髮再生肌潤目明 又劉守真保命集云癘風乃營氣熱風寒客於脉而不去宜先用樺皮散服五七日後灸承漿穴七壯三灸後每旦早服樺皮散午以升麻葛根湯下錢氏瀉青丸晚服一聖散用大黃半兩調｜｜刺灰三錢乃緩踈泄血中之風熱也仍戒房室三年樺皮散見樺皮下又追風再造散即一聖散

云服之便出黑虫為驗数日再服即候
虫盡為絶根也新虫嘴赤老虫嘴黑
丨丨灰入朴硝或氷片少許　小便淋
方　小兒重舌　掺舌下涎出自消　聖惠
閉　丨丨燒存性破故紙等分　腸風下血　便前近肝腎
為末無灰酒下　聖濟録　便後近心肺
丨丨灰二兩胡桃仁破故紙炒槐花炒各　腸風下痢
一兩為末每服一錢米飲調下　普濟
風傷久不已而下痢膿血日数十度用丨丨枳實麩
炒槐花生用各半兩為末蜜丸桐子大米飲下三十
九　胎衣不下　丨丨燒為末每服一　乳癧　丨丨燒存
袖珍　錢酒下　熊氏補遺　性一兩蚌
粉一錢和研每酒　乳結乙毒　丨丨蔓荆子各燒存性
下一錢　直指方　等分為末每酒服二錢
袖　腹内生瘡　在腸臟不可藥治者取丨丨不拘多
珍　少好酒一椀煎至七分温服其膿血
恙從小便出不飲酒　瘡腫無頭　丨丨燒灰酒服三錢
水煎亦可　蘭氏方　嚼葵子三五枚其處
皂刺　皂角子　四十一

時珍曰通陽明燥金大腸

鳴皐曰皂子大腸主藥去風潤燥皮中白肉入治肺藥者肺與大腸為表裏腸氣通則肺氣降也

如針刺為效儒門事親

大風癩瘡選奇方用黃柏末｜｜灰各三錢研勻空心酒服取下虫物並不損人食白粥二三日服補氣藥數劑名神效散忌一切魚肉動風之物取下虫一二升病乃愈也

存仁發背不潰｜｜麥麩炒黃一兩綿黃芪炙一兩甘草半兩為末每服一二錢酒一椀乳香一塊煎七分服本事方

皂角子辛溫炒舂去皮以水浸軟煮熟糖漬食之疎導五臟風熱壅宗奭核中白肉入治肺藥核中黃心嚼食治膈痰吞酸蘇頌仁和血潤腸李杲治風熱大腸虛秘瘰癧腫毒瘡癬時珍

斅曰煮熟剝去硬皮取向裏白肉去黃用其黃消人腎氣

發明機曰｜｜燒存性治大便燥結其性得濕則滑〻則燥結自通也時珍曰皂莢味辛屬金能

通大腸陽明燥金乃辛以
潤之〻義非得濕則滑也

方

腰脚風痛 不能履地｜｜｜千二百箇以少酥
熬香為末蜜丸梧桐子大空心蒺藜
子棗仁湯下三十丸 千金

大腸虛閉 風人虛人脚氣人大腸或
秘結或利用上方服至百
丸以通為度 同上

下痢不止 諸藥不效服此三服宿垢去盡
即變黃色屢驗｜｜｜瓦焙為
末米糊丸梧子大每服四五
十丸陳茶下 醫方摘要

裏急後重 新皂角子米
糠炒香只殼
炒等分為末飯丸桐子大
米飲下三十丸 普濟方

腸風 ｜｜｜槐實各一兩
穀糠炒香去糠為末
米飲下一錢

小兒流涎 脾熱有痰｜｜丶仁半兩半
夏薑湯泡七次一錢二分為
名神效散
末薑汁丸麻子大每
湯下五丸 聖濟録

産難 ｜｜｜二箇
吞之 千金

多年瘰癧 ｜｜
｜百枚米醋一升硇砂二錢同煮乾炒令酥看癧子
多少如一箇服一粒十箇服十粒細嚼米飲下酒浸
皂角子 肥皂角

罕二

[昂曰]｜｜治無名腫毒頗有奇功不拘奇瘍惡瘡用生｜｜去皮弦及筋搗爛釀醋和傳立愈不愈再傳奇驗此方々書不載若貧人僻地無藥者用之甚便

[希雍曰]｜｜｜入足陽明經胃

煮服亦可○聖濟錄言虛人不可用硇砂也

肥皂角 [時珍曰]其樹高大葉如檀及皂角葉結角長三四寸而肥厚多肉十月采角煮熟搗爛和白麪及諸香作丸澡身面去垢其膩潤勝於皂角也

辛溫微毒去風濕下痢便血瘡癬腫毒 時珍

方 下痢噤口｜｜｜一箇盐實其內燒存性為末以少許入粥內食之效 乾坤生意

眉癬諸瘡｜｜｜煆存性一錢枯礬一分研勻香油調塗 摘元

臘梨頭｜｜獨核｜｜｜去核填沙糖入巴豆二箇盐泥煆存性入檳榔輕粉五分研勻香油調搽先以灰水洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效 普濟

玉莖濕痒｜｜｜燒存性香油調搽即愈 攝生方

樺木皮 又作檴 [藏器曰]晉王珉傷寒身驗方中作樺字[時珍曰]｜｜｜燒烟熏紙作古畫

鶴皋曰其皮輕虛像肺宜入肺故治肺風毒瘡惟入肺清肺故治小便熱短也

希雍曰五疸皆濕熱鬱於陽明所致苦平能除濕熱故主之其治傷寒時行熱毒瘡又治肺風毒皆取其苦涼能散風邪熱毒之義也

鶴皋曰觀其治五疸並為瘡癰要藥又治小便熱短其為苦涼可証

集解〔藏器曰〕｜｜似山桃皮可為燭宗奭曰皮上有紫黑花勻者裹鞍弓鐙〔時珍曰〕樺木生遼東及臨洮河州西北諸地其皮厚而輕虛軟柔皮匠用襯靴裏及為弓靶之類謂之暖皮以皮裹蠟可作燭點

苦平治諸黃疸濃煮汁飲之良開寶 煮汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良即今豌豆瘡也藏器 燒灰合他藥治肺風毒宗奭 治乳癰時珍

方 乳癰初發腫痛結硬欲破一服即瘥以北來真｜｜｜燒存性研和無灰酒溫服方寸匕即臥醒即瘥沈存中靈苑方 乳癰腐爛靴內年久｜｜｜燒灰酒服一錢 唐瑤經驗

肺風毒瘡遍身瘡疥如癘及癮疹瘙痒並用樺皮散主之｜｜｜燒灰四兩只殼燒四兩荊芥

樺木皮 樺木

四三

寫眷曰｜｜辛烈香竄能逐邪惡所謂芳
香逐穢也通關利竅故能驅濕李氏用為
吐藥既能上通復能旁達故特良也但乾
霍亂有由於熱結者切不可妄用
又曰腰脚痛外治特為要藥見一船婦失
跌傷足以｜｜煎水洗並燒烟熏之次日
即愈

穗二兩炙草半兩杏仁水煮過去皮尖二兩研爛研
匀每服二錢食後酒下瘡疥甚者日三服　和劑

小便熱短｜｜｜濃煮
汁飲　集簡

樟木

辛溫治惡氣中惡心腹痛鬼疰霍亂腹脹宿食不消
常吐酸臭水酒煮服無藥處用之煎湯浴脚氣疥癬
風癢作履除脚氣　藏器

發明　時珍曰霍亂及乾霍亂須吐者以｜｜屑煎濃
汁吐之甚良又中惡鬼氣卒死者以｜｜燒烟
熏之待醒乃用藥此物辛烈
香竄能去濕氣辟邪惡故也

方　手足痛風｜｜屑一斗急流水一石煎極滾泡
之乘熱安足於桶上熏之以被圍不

可令湯氣入目其功甚
捷　虞博醫學正傳

三木節散 治風勞面色青白肢節沉重膂間痛或寒或熱或躁或嗔思食不能食被虫侵蝕證狀多端天靈蓋酥炙研二兩牛黄人中白焙各半兩射香二錢為末別以一一瘤節皂莢木瘤節槐木瘤節各為末五兩每以二錢水一盞煎減半去渣調前藥末一錢五更頓服取下虫物為效　聖惠方

樟腦 又名韶腦　出韶州以樟木切片井水浸煎成

辛熱通關竅利滯氣治中惡邪氣霍亂心腹痛寒濕脚氣疥癬風瘙齲齒殺虫辟蠹着鞋中去脚氣 時珍

發明　時珍曰一一純陽與焰硝同性水中生火其燄益熾今丹爐及烟火家多用之辛熱香竄禀龍火之氣去濕殺虫此其所長故燒烟熏衣篋席簟能辟壁虱虫蛀博物志云脚弱病人用杉木為桶濯足

樟木　樟腦　楠木　四十四

排丨丨於兩股間用帛束定月餘甚妙王璽醫林集
要方治脚氣腫痛用丨丨二兩烏頭三兩為末醋丸
彈子大每置一丸於足心踏之下以
微火烘之衣被圍覆汗出如涎為效
方丨小兒禿瘡丨丨一錢花椒二錢脂麻二兩為末以退猪湯洗後搽之簡便　牙
齒虫痛普濟用丨丨硃砂等分搽之神效〇選奇方用丨丨黄丹肥皂去皮核等分研勻蜜丸塞孔中

楠木又作柟

辛微温藏器曰苦温　治霍亂吐下不止煮汁服別錄　煎湯洗
轉筋及足腫大明

方　水腫自足起丨丨桐木屑煮汁漬足並飲少許日日為之肘後　心腹脹

〔帀曰〕苦能泄熱濇可收脱燒黑能止血紅
見黑則止也不可燒過｜｜｜側柏葉巻
柏燒存性飯丸止遠年下血甚妙失血初
起者未可遽用

痛未得吐下｜｜屑三四
兩煮汁飲之肘後

椶櫚又名栟櫚〔時珍曰〕三月於木端莖中出数黄
苞ゝ中有細子成列狀如魚子謂之椶魚亦曰
椶筍漸長出苞則
成花穗結子如豆

皮 苦濇平止鼻衄吐血破癥治腸風赤白痢崩中
帶下燒存性用大明 主金瘡疥癬生肌止血李珣

發明〔宗奭曰〕｜｜燒黑治婦人血露及吐血須佐
以他藥〔時珍曰〕椶灰性濇若失血去多瘀滯已
盡者用之切當所謂澀可去脫也與
亂髮同用更良年久敗椶入藥尤妙

方 血崩不止椶皮燒存性空心酒服三錢
或加燒白礬婦人良方 血淋不
止｜｜｜半燒半炒為末每
服二錢甚效衛生家寶 小便不通｜｜｜燒存
性以水酒服

椶櫚 四十五

好古曰入足太陰脾經血分少陰腎厥陰肝經氣分鳴泉曰｜｜｜入肝經氣分最速一婦人半身疼痛不能轉側或作肝氣治與左金丸一服即定

二錢即通累試甚驗 摂生方

吳茱萸

集解 頌曰今處處有之江淮蜀漢尤多或云顆粒緊小經久色青綠者是｜｜｜粒大經久色黄黑者是食茱萸恐亦不然按周處風土記云九月九日茱萸熟氣烈色赤可折其房以插頭云辟惡氣又續齊諧記云汝南桓景隨費長房學道長房曰九月九日爾家有厄宜各作絳囊盛茱萸繫臂登高飲菊花酒此禍可消如其言舉家登高山夕還見雞犬一時皆暴死故人至此日登高飲菊花酒戴茱萸囊沿以為俗時珍曰｜種粒大一種粒小小者入藥為勝

辛温有小毒 權曰辛苦大熱有毒 温中下氣止痛除濕血痺逐風邪開腠理欬逆寒熱 本經 利五臟去痰冷逆氣飲食

[時珍]曰止嘔黄連水炒治疝鹽水炒治血醋炒

不消心腹諸冷絞痛中惡心腹痛(別錄)霍亂轉筋胃冷吐瀉腹痛產後心痛治遍身𤸷痹刺痛腰脚軟弱利大腸壅氣腸風痔疾殺三蟲(甄權)殺惡虫毒牙齒虫䘌鬼魅疰氣(藏器)下產後餘血治腎氣脚氣水腫通關節起陽健脾(大明)主痢止瀉厚腸胃肥健人(孟詵)治痞滿塞胸咽膈不通潤肝燥脾(好古)開鬱化滯治吞酸厥陰痰涎頭痛陰毒腹痛疝氣血痢喉舌口瘡(時珍)

熱者慎用

血多慎用

[之才]曰蓼實為之使惡丹參消石白堊畏紫石英

[宗奭]曰凡用｜｜｜須深湯中浸去苦烈汁七次始可焙用[斆曰]凡使去梗葉每十兩以鹽二兩投東流水四斗中洗盡涎日乾用若用醋煮者每十兩用醋

〔昂曰〕｜｜｜辛熱故性上氣味俱厚故善
降然走氣動火昏目發瘡血虛有火者禁
用
〔寫皋曰〕｜｜｜仍是降氣之品謂其性上
者乃過服則積熱上沖非性上也〔寇氏〕謂
下氣最速東垣謂多用損元氣誠然余弟
子安腹偶痛不過小恙一醫遽與｜｜｜
三錢腹痛雖愈氣餒十日乃復元〔又曰〕多
服久服大燥津液損陰偶用治病中肯有所長善於開通氣分
立地之效
〔希雍曰〕陽厥似陰手足雖逆冷而口渴喜
飲大小便秘小便或通亦赤澀短少此火
極似水誤用殺人嘔吐吞酸屬胃火者不
宜用欬逆上氣非風寒及冷痰宿水者不
宜用腹痛屬血虛有火者不宜用下痢因
暑邪入於腸胃而非酒食生冷停滯積垢
者不宜用疝氣非驟感寒邪及初發者不

一鎰煮三十沸入
｜｜｜熬乾用
發明〔頌曰〕段成式言椒氣好下茱萸氣好上言其衝
膈不可為服食之藥故多食衝眼又脫髮也〔宗
奭曰〕此物下氣最速腸虛人服之愈甚〔元素曰〕氣味
俱厚浮而降陽中陰也其用有三去胸中逆氣滿塞
止心腹感寒㽲痛消宿酒為白豆蔻之使也〔杲曰〕濁
陰不降厥氣上逆咽膈不通食則令人口開目瞪陰
寒隔塞氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨脹
下利宜以｜｜｜之苦熱洩其逆氣用之如神諸藥
不可代也不宜多用恐損元氣〔好古曰〕衝脈為病逆
氣裏急宜此主之震坤合見其色綠故仲｜｜｜湯
當歸四逆湯方治厥陰病及溫脾胃皆用此也〔時珍
曰〕｜｜｜辛熱能散能溫苦熱能燥能堅故其所治
之症皆取其散寒溫中燥濕解鬱之功而已案朱氏
集驗方云中丞常子正苦痰飲每食飽或陰晴節變
率同十日一發頭痛背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不
食服藥罔效後得吳仙丹服之遂不復作每遇飲食

宜用霍亂轉筋由於暑熱而非寒濕者不
宜用一切陰虛及有熱無寒者法所咸忌

過多腹滿服五七十丸便已少頃小便作茱萸氣酒
飲皆隨小便而去前後痰藥甚多無及此者用||
|湯泡七次茯苓等分為末煉蜜丸梧子大每熟水
下五十丸梅楊卿方只用||酒浸三宿以茯苓
末拌之日乾每吞百粒酒下又咽喉口舌生瘡者以
|||末醋調貼兩足心移夜便愈其性雖熱而能
引熱下行亦從治之義或謂||之性上行不下
行者似不然也又治小兒痘瘡口噤嚙||一二
粒擦之即開亦
取其辛散耳

方

賊風口偏不能語者|||一升薑豉三升清
酒五升和煎五沸待冷服半升日三
服得汗即瘥

吐涎頭痛||湯用||一升棗二十
枚生薑一兩人參一兩水五
升煎三升服七合 金匱 食療本草

嘔吐胸滿上同

腳氣衝心|||生薑搗
汁飲良 孟詵

腎氣上噦腎氣自腹中起上築於咽喉逆氣連屬而
不能出或至數十聲上下不得喘息此由

吳茱萸

寒傷胃脘腎虗氣逆上乘於胃與氣相併難經謂之
噦素問云病深者其聲噦宜服此方如不止灸期門
關元腎俞穴用｜｜｜醋炒橘皮附子去皮臍炮各
一兩為末麪為丸梧子大薑湯下六七十丸　孫氏
仁存

心腹冷痛｜｜｜酒煎二錢沸服　千金

冷氣腹痛｜｜｜打糊酒一杯調之用香油一杯入鍋煎熱入茱酒煎一滚服立止　唐瑶經驗方

脾元氣痛發歇不可忍用｜｜｜一兩桃仁一兩和炒茱萸焦去萸取桃仁去皮尖研細葱白三莖煨酒浸温服　經驗

小腸疝奪命丹治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍下撮痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長及陰間濕癢成瘡用｜｜｜一斤分四分四兩酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸一夜同焙乾澤瀉二兩為末酒丸桐子大每服五十丸空心鹽湯或酒下一名星斗丸　和劑

食已吞酸胃氣虛冷者｜｜｜湯泡七次焙乾薑炮等分為末每服一二錢湯酒任下　聖惠

多年脾瀉老人多此謂之水土

同化｜｜｜泡過煎湯入鹽少許通口服蓋｜｜
能暖膀胱水道既清大腸自固他藥雖熱不能分觧
清濁也　孫｜｜｜泡炒川連炒　赤白下
氏仁存方　下痢水瀉等分煎服　聖惠
痢　戊已丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用｜｜
｜川連白芍各一兩同炒為末蒸餅丸米飲下
和劑　赤痢腹痛｜｜｜合黑豆煎飲　千金　蛇咬毒瘡｜｜｜一兩為末作三服
冷水下立｜｜｜一升酒煮｜
安　勝金　風瘡痒痹　溫洗立效　孟詵　頭風作痛｜
｜濃煎蘸拭髮　｜｜｜三升擣和酒煮熟
根　千金翼　腹中癥塊　布裹熨癥上冷更炒熱更
互熨之癥移走逐熨之消　塗足心
乃止　姚僧坦集驗方　口瘡口疳　見發明　咽喉作
痛　同上　牙痛　煎酒含漱　孟詵　陰下濕痒　煎湯洗　外臺
葉　辛苦熱治霍亂下氣止心腹痛冷氣內外臂鈎

痛塩碾罨之神驗乾即易轉筋者同艾搗以醋和罨之大明治大寒犯腦頭痛酒拌袋盛蒸熱更互熨之痛止為度時珍

枝　治大小便卒關格不通取南行枝如手第二指中節含之立下出姚僧坦集驗方

根　性味同葉殺三虫本經治喉痹欬逆止注瀉食不消瘰白癬別錄殺牙虫止痛藏器治中惡腹中刺痛療漆瘡甄權

方　寸白蟲茱萸東北陰細根大如指者四寸洗切以水酒各一升漬一夜平旦分服當取

時珍曰手足太陰肺脾命門氣分藥

下虫

千金方　肝勞生虫　眼中赤脉吳茱根為末一兩半粳米半合鷄子白三箇化蠟一兩半和丸小豆大米湯下三十丸當取下虫

川椒　又名蜀椒本經巴椒別錄漢椒日華南椒炮炙論蓎藙

椒紅　辛溫有毒　別錄曰大熱多食令人乏氣歎促閉口者殺人　治邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒熱痹痛下氣久服頭不白輕身　本經　除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺虫魚毒久服開腠理通血脉堅齒髮明目調關節耐寒暑可作膏藥　別錄　治頭風

下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石水治欬嗽腹
内冷痛除漱之齒痛甄權破癥結開胸治天行時氣產後宿
血壯陽療陰汗暖腰膝縮小便止嘔逆大明利五臟下
乳汁滅瘢生毛髮孟詵散寒除濕解鬱結消宿食通三
焦溫脾胃補右腎命門殺蚘虫止泄瀉時珍
之才曰杏仁為之使得鹽佳畏款冬花防風附子雄
黃可汉水銀中其毒者凉水麻仁漿解之 宗奭曰
凡用椒微炒出汗擣
去裏面黃殼取紅用
發明 頌曰段成式言椒氣下達餌之益下不上衝也
時珍曰||純陽之品乃手足太陰右腎命門
氣分之藥其味辛而麻其氣溫而熱稟南方之陽受
西方之陰故能入肺散寒治咳嗽入脾除濕治風寒

濕痺水腫瀉痢入右腎命門補火治陽衰洩數足弱
久痢諸證一婦年七十病瀉五年百藥不效余以感
應丸五十丸投之大便二日不行再以平胃散加丨
丨茴香棗肉為丸與服遂愈每因怒食舉發服之即
止此除濕消食温脾補腎之驗也但丨丨丸雖云補
腎不分水火未免誤人大抵此方惟脾胃及命門虛
寒有濕鬱者相宜若肺胃素熱者大宜遠之故丹溪
云椒屬火有下達之能服之既久則火自水中生故
世人服椒者無不被其毒也又清訣云凡人吃飯傷
飽覺氣上衝心胸痞悶者以水呑生椒一二十粒即
散取其能通三焦引正氣下惡氣消宿食也又戴原
禮云凡人嘔吐服藥不納者必有蚘虫在膈間蚘聞
藥則動々則藥出而蚘不出但於嘔吐藥中加炒丨
丨十粒良盖蚘見椒則頭伏也觀此則仲景治蚘厥
烏梅丸中用丨丨亦此義也許叔微云凡腎氣上逆
須以丨丨引之歸經則安李廷飛曰久食令人失明
傷血

脉

川椒

方

椒紅丸　治元臟虛憊目暗耳聾服此身輕少睡足有力益智悅顏色黑髭髮用川椒去目及閉口者炒出汗日乾擣取紅一斤以生地熬膏和椒丸梧子大每酒下三十丸合藥勿令婦人鷄犬見

腹內虛冷　川椒四十粒漿水浸一宿空心新汲水吞下閉口者不用久服煖臟腑進食　斗門

心腹冷痛　以布裹椒安痛處用熨斗熨之令椒出汗即止　孫真人

呃逆不止　川椒炒研麪糊丸梧子大每服十丸醋湯下神效　即以正經驗方

傳尸勞瘵　最殺勞蟲用真川椒去子及閉口者以紙隔之炒出汗取放地上以砂盆蓋之以火炭密圍四旁約一時許為細末去肉殼以老酒浸白糕和丸梧子大每服四十九服至一斤其疾自愈此藥兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛茴香湯下　陳三囙方

寒濕腳氣　以布袋盛椒踏腳　大全良方

諸瘡受風　川椒一升濕麪裹之勿令透氣作兩裹於煻火灰中燒熟剌頭作孔對瘡熏之令椒氣射入瘡中冷即易須臾

瘡中出水及身出冷汗即愈 獨行方

夏月濕瀉 川椒炒取紅肉豆蔻煨各一兩為末粳米飯丸小丸量人與服

飧瀉不化及久痢 川椒一兩蒼朮二兩炒研醋丸每米飲服五十丸 普濟

洩瀉不愈 川椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙研甆器收每米飲下二錢

風虫牙痛 川椒四錢牙皂七箇醋煎漱之 總録

小兒暴驚 啼哭絕死川椒左顧牡蠣各六銖以酢漿水一升煮五合每灌一合 千金方

蝎螫 川椒嚼塗之微麻即止 杏林摘要

腎囊風痒 川椒杏仁研膏塗手心合陰囊而卧甚效 直指

椒目

苦寒 權曰苦辛

治水腹脹滿利小便 藴菴

治十二種水氣及腎虛耳卒鳴聾膀胱急 甄權

止氣欬 丹溪

發明 權曰椒氣下達故椒目能治腎虛耳鳴用巴豆菖蒲同碾細以松脂黃蠟溶和為挺納耳中抽

之治腎虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒聾者一日一易神驗〔宗奭曰〕椒目治盜汗有功將目微炒碾細用半錢以生猪上唇煎湯一合睡時調服無不效蓋椒目能行水又治水蠱也〔丹溪曰〕諸歇不止用椒炒研二錢白湯調服二三服以止劫之後乃隨療火用藥〔李時珍曰〕椒目性下達能行滲道不行穀道所以能下水燥濕定歇消蠱也

方　水氣腫滿　椒目炒研細酒服方寸匕　千金　留飲腹痛　椒目二兩巴豆一兩去心皮熬擣棗肉和丸麻子大每服二九吞下其痛即止　肘後　痔漏腫痛　椒目研細空心水服三錢如神　海上方　崩中帶下　椒目炒研溫酒服　金匱鈎元　眼生黑花年久不可治者　椒目炒一兩蒼朮炒一兩為末醋糊九梧子大每服二十九醋湯下　本事方

葉　辛熱治奔豚伏梁氣及內外腎釣并霍亂轉筋

〔鳴皋曰〕——辛入肺温暖胃肺胃藥也

和艾及葱碾以醋拌罨之大明殺虫洗脚氣及漆瘡時珍

胡椒 辛大温下氣温中去痰除臟腑中風冷唐本去胃中虚冷氣宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝李珣調五臟壯腎氣治冷痢殺一切魚鼈蕈毒大明去胃寒吐水大腸寒滑宗奭暖腸胃除寒濕反胃虚脹冷積陰毒牙齒浮熱作痛時珍

發明〔宗奭曰〕——去胃中寒痰治食已則吐水甚效大腸寒滑亦可用須以他藥佐之過劑則走氣也〔丹溪曰〕——性燥食之快膈積久則脾胃肺氣大傷凡病氣疾人益大其禍也牙痛必用——蓽茇者散其浮熱也〔時珍曰〕——大辛熱之物腸胃寒濕者宜之有熱人食之動火傷氣陰受其害時珍自少嗜

張從正儒門事親云噎膈之病或因酒或因氣或因胃火醫者不察火裏燒薑湯中煮桂丁香末已豆蔻繼之華茇末已｜｜繼之雖曰和胃々本不寒雖曰補胃々本不虛況三陽既結食必上潮只宜湯丸小々潤之可也時珍云此說亦是然亦有食入反出無火之症又有痰氣鬱結得辛熱則開之症不可執一也

鳴皋曰噎膈因酒因氣者多陰火與實火熬乾胃液食入澀滯不下復反吐出再用辛熱藥不更枯胃汁乎張氏之說是也至李時珍云無火之症乃胃寒反謂與噎膈兩症臨症者審之

之歲々病目後痛絶之目病遂止纔食一二粒便發近醫每與綠豆同用治病有效蓋一寒一熱陰陽配合得宜且豆能制椒毒也

珣曰多食損肺令人吐血

方 **心下大痛** ｜｜四十九粒乳香一錢研勻男用薑湯女用當歸酒下○又方｜｜綠豆各四十九粒研爛酒下神效 壽域

霍亂吐利 ｜｜四十九粒綠豆一百四十九粒研勻木瓜煎湯下一錢 直指方

反胃吐食 戴元禮用｜｜醋浸日乾如此七次為末酒丸桐子大每服三四十丸醋湯下○百一方用｜｜半夏湯泡等分為末薑汁糊丸薑湯下三十丸

赤白下痢 ｜｜綠豆等分為丸服 集簡

大小便閉 關格不通脹悶二三日則殺人｜｜二十一粒打碎水一盞煎六分入芒消半兩煎化服 總錄

小兒虛脹 塌氣丸｜｜一兩蝎尾半兩為末麪糊丸粟米大每服五七丸米飲下一加萊菔子半兩 錢乙

風虫牙痛 衛生易簡

方||蓽茇等分為末蠟丸塞蛀孔中〇醫通治風
虫客寒三般牙疼呻吟不已用||九粒綠豆十一
粒研末以絲綿裹一粒 沙石淋痛 ||朴硝等分為
咬患處涎出吐去立愈 末每服二錢白湯
下名三拗 阿伽陀丸用||紫檀香欝金
散 普濟 婦人血崩 茜根黃蘗皮等分為末水丸梧
子大每服二十
丸阿膠湯下

||出摩伽陀國阿伽陀丸攷見訖摩為阿

碧澄茄 又名毘澄茄 開寶 毗陵茄子 〔珣曰〕||
|生南海諸國乃嫩胡椒也〔時珍曰〕與胡椒
一類二種
實辛溫〔珣曰〕辛 苦溫 下氣消食去皮膚間風心腹間氣脹
令人能食療鬼氣 藏器 治一切冷氣痰澼并霍亂吐瀉
肚腹痛腎氣膀胱冷 大明 暖脾胃止嘔吐噦逆 時珍

胡椒|| 碧澄茄 茶

五十三

好古曰入手足厥陰經 心腎

方 噎食不納 ｜｜｜白豆蔻等分為末乾舐之 壽域神方 反胃 吐出黑汁治不愈者｜｜｜為末米糊丸梧子大每服三四十丸薑湯下愈後服平胃散 永類鈐方 傷寒呃逆 日夜不定用｜｜｜高良薑等分為末每服二錢水六分煎十沸入醋少許服之 蘇頌圖經

茶 又名茗 檟 蔎音設 荈音舛 頌曰郭璞云早采為茶晚采為茗一名荈蜀人謂之苦搽陸羽云其名有五一茶二檟三蔎四茗五荈

苦甘微寒治瘻瘡利小便去痰熱止渴令人少睡悅志 神農食經 下氣消食作飲加茱萸葱薑良 蘇恭 破熱氣除瘴氣利大小腸 藏器 清頭目治中風昏憒多睡不醒 好古 治傷暑合醋治泄痢甚效 陳承 炒煎飲治熱毒赤白痢

同川芎葱白煎飲止頭痛 吳瑞 濃煎吐風熱痰涎 時珍

時珍曰服威靈仙

土茯苓者忌飲茶

發明 好古曰｜氣寒味苦入手足厥陰經治陰症湯
藥内入此去格拒之陰及治伏陽大意相似經
云苦以泄之其体下行所以能清頭目機曰頭目不
清熱上薰也苦泄其熱則上清矣｜采摘之時芽蘗
初萌得春升之氣味雖苦而氣則薄陰中之陽可升
可降所以能清頭目楊士瀛曰薑｜治痢薑助陽｜
助陰並能消暑解酒食毒且一寒一熱調平陰陽
不問赤白冷熱用之皆良眞｜生薑等分濃煎服

方 氣虛頭痛 用上春｜末調成膏置瓦盞内覆轉
以巴豆四十九粒燒烟作二次熏之
晒乾乳細每服一字別以好茶 熱毒下痢 臘｜末以
末食後煎服立效 醫方大成 白梅肉和
丸赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下各百丸○一方建
｜和醋煎服即止○經驗良方用蠟茶二錢湯點入
茶 蘊木

〔鴻臚曰〕――辛涼入血分自係心肝二經藥

麻油一蜆殼和服須臾腹痛大下即止一少年用之有效

大便下血 榮衛氣虛或受風邪或飲食過度熱積腸間下利清血臍腹作痛裏急後重並治之用細―半斤研末川百藥煎五箇燒存性每服二錢半飲下日二 普濟方

產後秘寒 以蔥涎調臘―末丸百丸茶服自通 郭氏婦人方

年久心痛 煎湖―以頭醋和勻服之 兵部手集

痘瘡作癢 房中宜燒―烟熏之

月水不通 ―清一瓶入沙糖少許露一宿服之雖三月胎亦通不可輕視 鮑氏

痰歂欬嗽 不能睡臥好―末一兩白僵蠶一兩為末放盞內盞定傾沸湯一小盞臥時再添湯點服 瑞竹堂方

藊木 又名藊方木 唐本 藊方國名

甘鹹平 〔杲曰〕甘鹹涼〔好古〕甘鹹平〔曰〕甘微酸辛性平 **破血治產後血脹悶欲死**

〔鴻舉曰〕此吐法其妙蓋乳香最能引吐又能去血中之風丨丨破血又能去血中之風也又丨丨能止嘔逆者熱結血分只理氣分無效故以丨丨通血分甚有理

〔鴻舉曰〕產後有邪熱不得用芎歸等溫藥丨丨最佳以其辛涼而行血也

者水煮五兩取濃汁服唐本 婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血噤赤白痢并後重急痛大明 虛勞血癖氣壅滯產後惡露不行心腹攪痛及經絡不通男女中風口噤不語並宜細研乳香末方寸匕以酒煎蘇木調服立吐惡物瘥海藥 霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服藏器 破瘡瘍死血產後敗血李杲 〔昂曰〕忌鐵

發明 〔元素曰〕丨丨性涼味微辛發散表裏風氣宜與防風同用又能破死血產後血脹腫滿欲死者宜之〔時珍曰〕丨丨乃三陰經血分藥少用則和血多用則破血

蘇木 沉香

〔鳴皐曰〕氣歘一方理具神妙產後必虛人參為要藥又恐參補住瘀血濃｜｜一補氣虛一行血滯且肺居至高之分血藥所不能達惟參能達之以參引｜｜入肺故神效也凡產後有瘀不能不行氣虛不能不補又脉數有熱難用芎歸之辛溫上升者此方俱可參用

方

產後血運｜｜三兩水五升煎取二升分服

產後氣歘面黑欲死乃血入肺也用｜｜二兩水兩椀煮一椀入人參末一兩調服隨時加減神效不可言　胡氏方

破傷風足見治風之功｜｜為散三錢酒服立效名獨聖散　普濟

脚氣腫痛｜｜鷺鷥藤等分細剉入定粉火許水煮熏洗　同上

偏墜腫痛｜｜二兩好酒煮熟頻飲立效　集簡

金瘡接指凡刀斧傷及指斷者｜｜末敷之外以蚕繭包好數日如故　攝生方

沈香

又名沈水香　綱目　蜜香

集解〔恭曰〕｜｜青桂雞骨馬蹄煎香同是一樹出天竺諸國〔藏器曰〕｜｜枝葉並似椿其枝節不朽沈者為沈香其肌理有黑脉浮者為煎香鷄骨馬蹄並是煎香並無別功止可熏衣〔頌曰〕｜｜青桂等香出南海諸國及交廣崖州沈懷遠南越志云交廣蜜香樹彼人取之先斷其積年老木根

經年其外皮幹皆朽爛木心與枝節不朽堅黑沉
水者即丨丨也半沉半浮與水面平者為鷄骨香
細枝緊實不爛者為青桂香其幹為棧香其根為
黃熟香其根節輕而大者為馬蹄香六物同是一
樹有精粗之異耳又丁謂天香傳云海北竇化高
雷皆出香之地止海南者優劣不侔既所孿不同
復售者多而取者速其香不待稍成乃趍利賊伐
之深也非同璚管黎人非時不妄代故木無夭札
必得異香焉宗奭曰嶺南諸郡悉有傍海處尤多
交幹連枝岡嶺相接千里不絕葉如冬青大者數
抱木性虛柔山民以構茅廬為橋梁為飯甑有香
者百無一二蓋香得水方結多在折枝枯幹中或
為沉或為煎或為黃熟自枯死者謂之水盤香南
息高竇等惟產生結香蓋山民入山以刀斫曲幹
斜枝成坎經年得雨水浸漬遂結成香乃鋸取之
其香結為斑點名鷓鴣斑燔之極清烈香之良者
惟任瓊崖等州俗謂之角沉黃乃枯木得者宜入
藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中年

[宗奭曰]諸木皆浮||獨沉故能下氣而降痰氣香故能理諸氣而調中色黑體陽故入命門暖精助陽行氣而不傷氣溫中而不助火其性能降又能升東垣云上至天下至泉用為使最相宜

久不待創剔而成薄片者謂之龍鱗削之自捲咀之柔韌者謂之白蠟沉尤難得

辛微溫咀嚼香甜者性平辛辣者性熱[珣曰]苦溫[大明曰]辛熱[時珍曰]治風水毒腫去惡氣[別錄]主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰氣清人神並宜酒煮服諸瘡腫宜入膏中[李珣]調中補五臟益精壯陽暖腰膝止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痹骨節不任風濕皮膚瘙癢氣痢[大明]補右腎命門[元素]補脾胃治痰涎血出於脾[李杲]益氣和神[元素]治上熱下寒氣逆喘急大腸虛閉小便氣淋男子精冷[時珍]

[敩曰]凡使||不枯如觜角沉水者為上半沉者次之不可見火[時珍曰]入丸散磨粉用煎劑磨汁臨時

〔元素曰〕入手太陰肺足少陰腎通行陽明胃大腸經

入之

方 胃冷久呃 ||紫蘇白豆蔻各一錢為末柿蒂湯下五七分 活人心統

心神不足 火不降水不升健忘驚悸用朱雀丸方見茯神

胞轉不通 非小腸膀胱厥陰受病乃強忍房事過忍小便所致當治其氣則愈非利藥所能通也||木香各二錢為末白湯空心服 醫壘元戎

轉胞治其氣是亦一法

大腸虛閉 因汗多津液耗涸者||一兩肉蓯蓉酒洗二兩各研末以麻仁研汁糊丸梧桐子大蜜湯下百丸 濟生方

檀香

一名旃檀 綱目 真檀

辛溫〔大明曰〕熱 消風熱腫毒 弘景 治中惡鬼氣殺虫 藏器 煎服止心腹痛霍亂腎氣痛水磨塗外腎并腰腎痛處 大明

散冷氣引胃氣上升進飲食元素治噎膈吐食又面生黑子每夜以漿水洗拭令赤磨汁塗之甚良時珍

發明 杲曰||調氣引芳香之物上至極高之分最宜橙橘之屬佐以薑棗輔以葛根縮砂益智豆蔻通行陽明之經在胸膈之上處咽喉之間為理氣要藥 時珍曰白檀塗身能除一切熱惱杜宝大業錄云隋有壽禪師妙醫術作五香飲濟人沈香飲||飲丁香飲澤蘭飲甘松飲皆以香為主更加別藥有味而止渴兼補益人也

紫檀 鹹微寒摩塗惡毒風毒別錄刮末傅金瘡止血止痛治淋弘景醋磨傅一切卒腫大明

發明 時珍曰白檀香辛溫氣分之藥也故能理衛氣調脾肺利胸膈||鹹寒血分之藥故能和營

鳴皋按葉天士治吐血多用降香末以止之蓋金瘡出血者外之皮肉傷故血外溢也吐血者内之脉絡傷故血内溢也降香既可止血外溢則用以止内溢之血亦同此理

氣消腫毒而治金瘡

降香 又名紫藤香 綱目 雞骨香

集解 珣曰生南海山中及大秦國其木似蘇方木燒之初不甚香得諸香和之則特美入藥以番降紫而潤者良 時珍曰今廣滇漢中湖南安南占城暹羅琉球諸番皆有之

辛溫燒之辟天行時氣宅舍怪異小兒帶之辟邪惡氣 李珣

療折傷金瘡止血定痛消腫生肌 時珍

發明 時珍曰降香唐宋本草失收唐慎微始增入而不著其功用今折傷金瘡家多用其節云可代沒藥血竭按名醫別錄云周崈被盜刃傷血出不止筋如斷骨如折用花蕊石散不效軍士李高用紫金散掩之血止痛定明日結痂如鐵遂愈且無瘢叩其方乃用紫藤香瓷瓦刮下研末紫藤香即降香最佳

王好古曰入手太陰肺足少陰腎陽明胃經

者曾救萬人羅天益
亦取此方云甚效

方　金瘡血出｜｜｜五倍子銅花等分為末傳之醫林集要

丁香　又名丁子香嘉祐雞舌香〔時珍曰〕雄為丁香雌為鳩舌

集解〔珣曰〕｜｜生東海及崑崙國實小者為丁香大者如巴豆為母丁香〔志曰〕｜｜生交廣南番按廣州圖上｜｜樹高丈餘木類桂葉似櫟葉花圓細黄角凌冬不凋其子出枝蕊上如釘長三四分紫色其中有粗大如山茱萸者俗呼為母｜｜二八月采或云盛冬生花子至次年春采之

辛溫〔時珍曰〕辛熱　溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳䘌能發諸香開寶　風䘌骨槽風口臭殺勞虫辟惡治奶頭花止五色毒痢五痔李珣　治口氣冷氣冷勞反胃鬼疰

吊同熟症忌用

蠱毒殺酒毒消疰癖療腎氣奔豚氣陰痛腹痛壯陽暖腰膝大明療嘔逆甚效保昇去胃寒理元氣〻血盛者勿服元素治虛噦小兒吐瀉痘瘡胃虛灰白不食時珍

斆曰雌者力大若用雄者須去丁盖乳子發人背癰也不可見火畏鬱金

雞舌香即母丁香辛微温時珍曰治風水毒腫霍亂心痛去惡熱別錄吹鼻殺腦疳甄權同薑汁塗拔去白鬚孔中即生黑者甚效藏器喜忌同丁香

發明好古曰丁香與五味子廣茂同用治奔豚之氣亦能泄肺能補胃大能療腎宗奭曰丁香治口氣治脾胃冷氣不和甚良母丁香氣味尤佳震亨曰口居上地氣出焉脾有鬱火溢入肺中失其清和之

意而濁氣上行發為口氣若以丁香治之是揚湯止沸也惟香薷治之最捷時珍曰宋太醫陳文中治小兒痘瘡不光澤不起發或脹或瀉或渴或氣促表裏俱虛之症並用木香散異功散倍加丁香官桂甚者丁香三五十枚官桂一二錢亦有服之而愈者此丹溪所謂立方之時必運氣在寒水司天之際又值嚴冬鬱遏陽氣故用大辛熱之劑發之者也若不分氣血虛實寒熱經絡一槩用之殺人必矣抱朴子云凡百病在目以鷄舌香川連乳汁煎注之皆愈此得辛散苦降之妙

方

暴心氣痛 鷄舌香末酒下一錢 肘後

乾霍亂病 不吐不下丁香十四枚為末沸湯一升和之頓服不瘥再作 千金

小兒吐瀉 丁香橘紅等分蜜丸黃豆大米湯化下 劉代小兒

小兒嘔吐 不止丁香生半夏各一錢薑汁浸一夜晒乾為末薑汁打麪糊丸黍米大量用 見全幼心鑑

小兒冷疳 面黃腹大食即吐者丁香七枚為末乳汁和蒸三次薑湯

下氣厥不通母丁香三箇陳皮一
易簡 胃冷嘔逆 塊去白水煎熱服 十便良方 反胃
吐食 母丁香一兩為末鹽梅肉搗和 氣噎
丸芡子大每含一丸 袖珍方 反胃關格 不通
丁香木香各一兩每服四錢水一盞半煎一盞先以
黃泥做成盏濾汁於內食前服此方甚效土盏取其
助脾也 德 傷寒呃逆 及歲逆不止丁香一兩乾柿
生堂經驗方 帶焙為末每服一錢煎人參
湯下 簡 鴉舌香青木香薰陸香麝香各
要濟衆方 毒腫入腹 一兩水四升煮二升分二服
時 婦人産難 母丁香三十六粒乳香三錢六分為末
後 同活兎腦和搗千下丸作三十六丸每
好酒化下一丸名如意丹 乳頭破裂 丁香為末敷 妬
立驗 順真堂經驗方 之 梅師
乳〻痛 丁香末水服方 癰疽惡肉 丁香末傅外以膏
寸匕 同上 藥護之 見怪症

奇方

〔震亨〕曰善竄入手少陰心經〔昂〕曰能通十二經

〔杲〕曰||沒藥治婦人血氣痛果有奇效

〔昂〕曰亦治顛狂以能去風散瘀也靈苑辰沙散辰砂一兩乳香棗仁各五錢酒下恐

乳香 又名薰陸香〔別錄〕馬尾香〔海藥〕天澤香〔內典〕摩勒香〔綱目〕〔宗奭〕曰||即薰陸香垂滴如乳頭者鎔塌在地者爲塌香皆一也

集解〔恭〕曰薰陸香形似白膠香出天竺者色白出單于者夾綠色香亦不甚〔承〕曰西出天竺南出波斯等國西者色黃白南者色紫赤〔時珍〕曰||今人多以楓香雜之惟燒之可辨

微溫無毒〔大明〕曰辛熱微毒〔元素〕曰苦辛 主風水毒腫去惡氣伏尸癮疹癢毒〔別錄〕治耳聾中風口噤不語婦人血氣止大腸洩澼療諸瘡令內消能發酒理風冷〔藏器〕下氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉〔大明〕治不眠〔之才〕補腎定諸經之痛〔元素〕仙方

飲沉醉臥睡一二日勿動驚醒驚醒則不
可治本事方加人參一兩名寧志膏

用以辟穢李珣消瘡疽諸毒托裏護心活血定痛伸筋
治婦人產難折傷時珍

發明[時珍曰]丨丨之竄能入心經活血定痛故為瘡
疽瘡瘍心腹痛要藥素問云諸瘡痛癢皆屬心
火是矣產科諸方多用之亦取其活血之功耳陳自
明婦人良方云施少卿得神寢丸方云婦人臨產月
服之令胎滑易生極有效驗用通明丨丨半兩枳殼
一兩為末煉蜜丸梧子大空心酒服三十丸李嗣立
治癰疽初起內托護心散云香徹瘡孔中能使毒氣
外出不內攻也方見下按抱朴子云南海淳炎洲出
薰陸香結掘啖之此獸所刺不死以杖打之皮不傷
而骨碎乃死觀此則丨丨之治折傷雖能活血止痛
亦性然也楊清叟曰凡人筋不伸者敷藥宜加用之
其性能伸筋〇[頌曰]丨丨性粘難碾以繒袋掛於窗
隙間良久取研乃不粘[大明曰]入丸散微炒殺毒則
不粘[時珍曰]或言以灯心同研則易細或言以糯米

子接曰得真茶鹿血治心疼痛

数粒同研或言以人指甲数片同研或言以乳鉢坐
熱水中研皆易細外丹本草云｜｜以韭實葱蒜煆
伏成汁最柔五金丹
房鑑源云｜｜啞銅。
方　口眼喎斜｜｜燒烟熏之以順
其血脉　證治要訣　祛風益顏｜｜二斤
白蜜三斤甕器合煎如餳　急慢驚風｜｜半兩甘遂
每旦服二匙　奇效方　半兩同研末每
服半錢｜｜湯下童便　小兒內釣　腹痛用｜｜沒藥
亦可　王氏博濟方　木香等分水煎服
阮氏　產難催生　簡要濟衆方用黃明｜｜五錢母
小兒方　猪血和丸梧子大酒下五丸〇海
上方用｜｜硃砂等分為末入　骨鯁｜｜一錢研服
射香少許酒服一錢良久自下　衛生月筋方
痛不可忍者梅師用｜｜嚼嚥汁立瘥
出牙　〇聖惠用｜｜枯礬等分爍丸塞之　痘斑不
｜｜研細猪心血和丸芡子大每以　瘧疽寒戰｜
快　溫水化服一丸　聞人規痘疹論　｜

昂曰入十二經　嗚皋曰好古云補心膽虛肝血不足是亦足少陽手少陰足厥陰主藥也

半熟水研服戰發於脾｜｜入脾故也　直指

内托護心散　凡瘡症一日至三日宜連進十餘服方免變症使毒氣外出服之稍遲毒內攻漸生嘔吐或鼻生瘡菌不食即危矣四五日後亦宜間服用眞綠豆粉一兩｜｜半兩燈心同研和勻以生甘草湯濃煎調下一錢時時呷之若毒已衝心有嘔吐之症大宜服此服至一兩則香徹瘡孔眞神藥也　李嗣立外科方

沒藥　又名末藥

集解　志曰｜｜生波斯國其塊大小不定黑色似安息香　頌曰今南海諸國及廣州或有之木之根株皆如橄欖葉青而密歲久者則有脂液流滴在地下凝結成塊或大或小類安息香

苦平　破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中翳暈疼痛膚赤　開寶　破癥瘕宿血損傷瘀血消腫痛

【希雍曰】同延胡乳香乾漆鱉甲琥珀為末治産後血暈有神效　加參澤蘭生地益母蘇木作湯送前藥治兒枕痛及惡露未盡腹痛寒熱等症立效　同乳香白及白斂紫花地丁夏枯草忍冬連翹甘菊貝母治一切癰疽疔腫　同乳香當歸牡丹皮牛膝川斷川芎降香山甲治內傷胸臆骨痛

【又曰】孕婦不宜服凡骨節與胸脇腹痛非瘀血停留而因於虛者不宜用産後惡露多腹中虛痛者不宜用瘡已潰不宜用

【鳴泉曰】一婦人殞胎不下腹痛不止病甚因與乳香末藥痛止胎下或有因虛痛者亦不防與補劑兼用

大明 心胆虛肝血不足 好古 墮胎及産後心腹血氣痛並入丸散服 李珣 散血定痛生肌 時珍

修治　同乳香

發明 【權曰】凡金刃所傷打折踠跌墜傷筋骨疼痛心腹血瘀者並宜爛研熱酒調服推陳致新能生好血 【宗奭曰】｜｜大概通滯血々滯則氣壅瘀氣壅瘀則經絡滿急經絡滿急故痛且腫凡打撲踠跌皆傷經絡氣血不行瘀壅作腫痛也 【時珍曰】乳香活血｜｜散血皆能止痛消腫生肌故二藥每々相兼而用

方 歷節諸風 骨節疼痛晝夜不止｜｜末半兩虎脛骨酥炙為末三兩每服二錢溫酒調服 圖經本草方 筋骨損傷 米粉四兩炒黃入｜｜乳香各半兩為末調成膏貼 御藥院方 金刃傷 未透膜者乳香｜｜各一錢以童便酒溫化服 奇效良方 小兒盤腸氣痛 乳香｜｜等分為末木香磨水煎沸調下一錢立瘥 嬰兒寶鑑 婦人腹痛 內傷瘀刺

丨丨末一錢酒服
立止　圖經本草　婦人血運　方同
上　血氣心痛　丨丨末
二錢水
半酒半煎服
醫林集要　產後惡血　丨丨血竭末各一錢童便溫
酒各半煎服良久再服惡血
自下痛便止
婦人良方　女人異疾　女人月事退出皆作禽獸形
欲來傷人先將綿塞陰戶乃
頻服丨丨末一兩白
湯調下　危氏方

蘓合香

集解　恭曰今出西域及崑崙紫赤色與紫真檀相
似堅實極芳香性重如石燒之灰白者好頌
曰今廣州雖有丨丨丨但類蘓木無香氣藥中只
用如膏油者極芬烈梁書云中天竺國出丨丨丨
是諸香汁煎成非自然一物也又云大秦國人采
得丨丨丨先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸國
賈人是以展轉來達中國者不大香也然則廣南
貨者其經煎煮之餘乎今用如膏油者乃合治成

〔時珍曰〕以筋挑起縣絲不斷者真

者耳〔時珍曰〕寰宇志云蘓合油出安南三佛齊諸國樹生膏可為藥以濃而無滓者為上劉夢得傳信方言||多薄葉子如金色按之即少放之即起良久不定如蟲動氣烈者佳如此則全非今所用者宜精攷之

甘温辟惡殺鬼精物温瘧蠱毒癇痓去三蟲除邪令人無夢魘〔別錄〕

發明〔時珍曰〕||能通諸竅臟腑故其功能辟一切不正之氣沈括筆談云太尉王文正公氣羸多病宋真宗面賜藥酒一瓶令空腹飲之可以和氣血辟外邪公飲之大覺安健次日稱謝上曰此||酒也每酒一斗入||丸一兩同煮極能調和五臟却腹中諸疾每冐寒夙興最宜飲一杯此方遂盛行於時千金外臺謂治疾有殊效

方 蘓合香丸 治傳尸骨蒸肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白痢瘀血月閉痃癖丁腫小兒驚癇客忤大人中風中氣狐狸等病用｜｜｜油一兩安息香末二兩好酒熬成膏入蘓合油內白朮香附青木香白檀香沉香丁香麝香蓽茇訶子肉煨朱砂犀角屑各二兩龍腦薰陸香各一兩為末以香膏和鍊蜜為丸蠟皮裹収每服旋丸梧子大早起化服四丸老人小兒一丸井華水溫水俱可下 和劑

水氣浮腫 ｜｜｜白粉水銀等分擣勻蜜丸小豆大每服二丸當下水出

附後方

楓脂香

又名白膠香

集解 【恭曰】｜｜｜所在大山中皆有【頌曰】今南方及關陝甚多樹甚高大似白楊葉圓而作歧有三角而香二月開花白色着實大如鴨卵八九月熟時暴乾可燒其脂為白膠香說文解字云楓

木漢宮殿中多植之霜後葉丹可愛故稱楓宸任昉述異記云南中有楓子鬼木之老者為人形亦呼為靈楓蓋癭瘤也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異【保昇曰】王瓘軒轅本紀云黃帝殺蚩尤於黎山擲其械於大荒之中化為楓木之林爾雅註云其脂入地千年化為琥珀【時珍曰】孫炎爾雅正義云楓子鬼乃攝木上寄生枝高三四尺天旱以泥塗之即雨也荀伯子臨川記云嶺南楓木歲久生瘤如人形遇暴雷大雨則暗長三五尺謂之楓人宋齊丘化書云老楓化為羽人數說不同大抵癭瘤之

說猶有理也

辛苦平治癮疹風癢浮腫煮水浴之又主齒痛唐本一切癰疽瘡疥金瘡吐衄咯血活血生肌止痛解毒燒過揩牙永無牙疾時珍

時珍曰凡用以齏水煮二十沸
入冷水中揉扯數十次晒乾用
發明
震亨曰其性疎通故木易有虫穴外科要藥近
世不知誤以松脂之清瑩者為之甚謬宗奭曰
楓香松香皆可亂乳香但楓香微白黃色燒之可見
真偽時珍曰楓香松香其功雖次於乳香亦彷彿相
近
方 吐血不止｜｜｜為散每服二錢
新汲水下 簡要濟衆 吐衂｜｜｜蛤粉等
分為末薑汁調
服 百一選方 吐血咯血｜｜｜炙黃一兩新綿一
兩燒灰為末每服一錢米
飲下 金瘡斷筋｜｜｜傅之 瘰癧軟癤｜｜｜一
聖惠方 危氏方 兩化開以
蓖麻子六十四粒研入成 諸瘡不合｜｜｜輕粉等
膏攤貼 儒門事親方 分猪油和塗
直指 惡瘡疼痛｜｜｜膩粉等分為末漿 小兒疥癬｜｜
水洗淨貼之 養老書
楓脂香 氷片

〔鳴皋曰〕ㅣㅣ香竄無所不入古方之入心經東垣言入骨治骨痛則又腎經藥也

ㅣ黃柏輕粉等分研末羊骨髓和搽 儒門事親

氷片 又名龍腦香 唐本 片腦 綱目 羯婆羅香 衍義 婆律香 〔恭曰〕龍腦是樹根中乾脂婆律香是根中清脂舊出婆律國故名

集解 〔恭曰〕龍腦香出婆律國樹形似杉木腦形似白松香明淨者善 〔頌曰〕今惟南海番舶貨之南海山中亦有之今南海多用火逼成片其中雜偽入藥惟貴生者狀若梅花片者佳 〔時珍曰〕相感志言以杉木炭養之瓷器中則不耗今人多以樟腦升打亂之不可不辨

辛苦微寒 〔珣曰〕溫 治婦人產難研少許新汲水服立下 別錄 心腹邪氣風濕積耳聾明目去赤膚翳 唐本 內外障眼鎮心秘精治三虫五痔 李珣 散心盛有熱 好古 入骨治

希雍曰一一性善竄無往不入芳香之氣能辟一切邪惡辛溫之性能散一切風濕故主心腹邪氣及風濕積聚也

又曰凡中風非外來之風邪乃因氣血虛者忌之小兒急驚屬實熱可用慢驚屬虛寒切不可服目疾屬肝腎虛者切不可點

介賓曰用此宜少而暫多則走洩真氣大能損人

昂曰余幼時聞叔建侯公曰薑性何如叔曰體熱而用涼蓋味辛多然風熱必藉辛以散之風熱散則涼矣此即本草所云冰片性涼之義

鶴皋曰東垣謂風在骨髓及引風入骨髓之說似不盡然風之所傷不過氣血經絡皮肉筋骨而已何以即入髓乎然往往有服腦射而致患者默思而知其故凡人之中風非如中風寒之風也皆痰火為患耳火升則痰湧火動則風生乃自生之風也蓋中風之人必有一二經虛極乎是痰火因虛而入遂至壅塞而成偏癈遽用腦射

骨痛李杲治脫肛元素療喉痺腦痛鼻瘜齒痛傷寒舌出小兒痘陷通諸竅散鬱火時珍

發明 宗奭曰此物大通利關隔熱塞大人小兒風涎閉塞及暴得驚熱甚為濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功萬物中香無出其右者震亨曰龍腦屬火世知其寒而通利然未達其熱而輕浮飛越喜其香而貴細動輒與麝同為桂附之助然人之陽易動陰易虧不可不思杲曰龍腦入骨風病在骨髓者宜之若風在血脉肌肉輒用腦射反引風入骨髓如油入麪莫之能出也王綸曰龍腦大辛善走故能散熱通利結氣目痛喉痺下疳諸方多用之者取其辛散也人欲死者吞之為氣散盡也世人誤以為寒不知其辛散之性似乎寒耳豈有香之至者而反寒乎時珍曰古方眼科小兒科皆言龍腦辛涼能入心經故治目病驚風方多用之痘瘡心熱血瘀倒黶者用引猪血直入心竅使毒氣宣散於外則血活

以散之通之壅塞輕亦或通散而愈壅塞重者通散不動反致竄烈之性衝入不壅塞之經而別經受傷矣別經俱受傷則經氣難復而此壅塞之經愈不能動遂成錮疾此東垣所以有引風入髓之說也他如真中風類中風之強分雖古大家亦不無誤說足見此事難知矣惟喻氏嘉言葉氏天士謂自生之風不可驅宜有以熄之所見獨超千古今業醫者能不以中風二字泥諸胸中斯可耳

又曰嘗見一人暑月于金山寺閣上當風而卧醒後抽搦幾廢服風藥數月始愈此等乃可謂之中風

又曰｜｜通經絡去壅塞亦中風痰之要藥惟在能審病體之輕重酌藥力之大小善為配合亦建殊功倘執前議而不敢用使良藥見弃亦固矣

痘發其說皆似是而實未當也目病驚病痘驚皆火病也火鬱則發之從治之法辛主發散故耳其氣先入肺傳於心脾能走能散使壅塞通利則經絡條達而驚熱自平瘡毒能出用猪心血能引龍腦入心經非龍腦能入心也沈存中良方云痘瘡周密盛則變黑者用生猪血一橡白斗龍腦半分温酒和服潘氏云一女病發熱腰痛手足厥逆日加昏悶形症極惡疑是痘症時暑月急取屠家敗血倍用龍腦和服得睡須臾一身瘡出而安若非此方則橫夭矣又宋文天祥賈似道皆服腦子求死不得惟廖瑩中以熱酒服數握九竅流血而死此非腦子有毒乃熱酒引其辛香散溢經絡氣血拂亂而然耳

方 目赤生膜｜｜雄雀屎各八分為末人乳調匀日點之無不驗 聖惠 頭腦疼痛｜｜一錢捲紙燒烟熏鼻吐出痰涎即愈 壽域方 瘜肉點之自入 集簡 傷寒舌出過寸者｜｜半分為末摻之隨手即愈 夷堅志 中風口噤無門下藥者用開關

時珍曰||手足厥陰藥心包肝

散端午日午時用||南星等分為末每以一字揩牙二三十遍其口自開

痘瘡狂躁心煩氣紛妄語或見鬼神其瘡色赤未透者經驗方用||一錢研細以猪心血和丸芡子大紫草湯下一丸少時心神定得睡瘡發○總微論用豶猪第二番血清半盞酒半盞和勻入||一分溫服良久利下瘀血一二行瘡即紅活此治黑靨

婦人產難方見大註

痔瘡惡候醫所不治者百發百中||一二分葱涎化搽之　見簡便方

夢漏口瘡經絡中火邪夢漏恍惚口瘡咽燥||三錢黃柏三兩為末蜜丸梧子大每麥冬湯下十丸　摘元

血竭 又名騏驎竭 唐本

集解〔珣曰〕南越志云騏驎竭是紫鉚樹之脂也欲驗真偽但嚼之不爛如蠟者為上〔頌曰〕今南番諸國及廣州皆出之木高數丈婆娑可愛葉似櫻桃而有三角其脂液從木中流出如膠飴久凝

[希雍曰]甘主補鹹主消乃散瘀血生新血之要藥
[又曰]此藥難得真者理折傷有奪命之功
[又曰]同乳香沒藥自然銅麻皮灰狗頭骨煅存性䗪虫骨碎補治一切打撲傷損同血餘灰乳香沒藥冰片輕粉象牙末紅粉霜為細末掺一切金瘡及腫毒生肌止痛

乃成竭作血色舊說與紫鉚大都相類而別是一物功力亦殊[斅曰]凡使勿用海母血真相似只是味鹹并腥氣騏驎竭味微鹹耳似巵子氣也[時珍曰]騏驎竭是樹脂紫鉚乃此樹上虫所造成今分入虫部多出大食諸國今人試之以透甲者為真獨孤滔丹房鏡源云以火燒之有赤汁涌出久而灰不變本色者真

甘鹹平治心腹卒痛金瘡血出破積血止痛生肉去五臟邪氣唐本 傷折打損一切疼痛血氣攪刺內傷血聚補虛並宜酒服李珣 補心包絡肝血不足好古 益陽精消陰滯氣太清修煉法 傅一切惡瘡疥癬久不合性急不可多使却引膿大明 散滯血諸痛婦人血氣小兒瘛瘲

時珍

大明曰得蜜陀僧良 斆曰先研作粉入丸散中同衆藥擣則化作塵飛也

發明 時珍曰騏驎竭木之脂液如人之膏血其味甘鹹而走血盖手足厥陰藥也肝與心包皆主血故耳劉河間曰一一除血痛為和血之聖藥是矣乳香沒藥雖主血病而兼入氣分此則專入血分也

方 白虎風痛 走注兩膝熱痛腫用一一硫黃末各一兩溫酒服一錢 聖惠 新久

腳氣 一一乳香等分同研以木瓜一箇剜孔入藥在內以麪厚裹沙鍋煮爛連麪打丸梧子大每服三十丸溫酒下 忌生冷 奇效 慢驚瘛瘲 定魄安魂益氣一一半兩乳香二錢半同研人參湯下 御藥院方 鼻衄 一一蒲黃等分為末吹之 醫林集要 金瘡出血 一一末傅之立止 廣利方 產後血運 不知人及狂語用一一一兩為末每服二錢酒下 太平聖惠方

血竭 質汗 六十八

產後血衝心胸滿欲命在須臾用丨丨沒藥各一錢研細童便和酒服　醫林集要

瘡口丨丨一字射香少許大棗燒灰半錢同研津調塗之　究原方

臁瘡不合丨丨末傅之以乾爲度

濟急仙方

腹中血塊丨丨沒藥各一兩滑石丹皮一兩同煮過醋丸梧子大服之　摘元方

質汗汗音韓

集解〔藏器曰〕丨丨出西蕃煎檉乳松淚甘草地黄并熱血成之蕃人試藥以小兒斷一足以藥納口中將足踏之即時能走者良

甘温治金瘡折傷瘀血內損補筋肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並以酒服之亦

[鳴皋曰]芳香可以逐穢凡中惡及鬼氣勞瘵傳尸等症皆穢也繆氏謂主藏神通神明故能辟邪主鬼疰惡氣是入手少陰此說亦未必然

傳傷處 藏器

方 寶女經閉 血結成塊心腹攻痛||薑黄川大黄炒各半兩為末每服一錢溫水下

聖濟方

安息香

集解[恭曰]|||出西戎狀如松脂黄黑色為塊新者亦柔軟[珣曰]生南海波斯國樹脂也狀若桃膠[時珍曰]今安南三佛齊諸番皆有葉廷珪香錄云此乃樹脂形色類胡桃瓤不宜於燒而能發衆香故人取以和香[機曰]或言燒之能集鼠者為真

辛苦平治心腹惡氣鬼疰 唐本 邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒霍亂風痛男子遺精暖腎氣婦人血噤並產後

〔昂曰〕｜｜脾胃藥

血運（大明）婦人夜夢鬼交同臭黄燒熏丹穴永斷（李珣）燒之去鬼來神（蕭炳）治中惡魘寐勞瘵傳尸（時珍）

阿魏 又名阿虞（綱目）薰渠（唐本）哈昔泥 形虞

集解〔恭曰〕｜｜生西番及崑崙苗葉根莖似白芷搗根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者次之體性極臭而能止臭亦奇物也西國人常食用之云去臭氣〔珣曰〕按廣志云生昆崙國是木津液如桃膠色黑者不佳黄散者為上〔頌曰〕今惟廣州有之云是木膏液滴釀結成與蘇恭所說不同按酉陽雜俎云｜｜木生波斯國及北天竺枝汁出如飴久乃堅凝名｜｜其說與廣州所上者相近〔承曰〕｜｜合在木部今二浙人家亦種之但淡薄無膏液耳〔時珍曰〕｜｜有草木二種草者出西域可晒可煎蘇恭所說是也木者出南番取其脂汁李珣蘇頌所說是也一統志所載有此二種云出

火州及沙鹿海牙國者草高尺許根株獨立枝葉
如蓋臭氣逼人取汁熬膏名｜｜出三佛齊及暹
羅者樹不甚高土人納竹筒於樹內俟脂滿冬月
破筒取之或云其脂最毒人不敢近每來時以羊
繫於樹下自遠射之脂毒着羊羊斃即為｜｜觀
此則有二種明矣繫羊射脂之說俗亦相傳但無
實據諺云黃芩無假｜｜無真以其多偽也劉純
詩云｜｜無真却有真臭而止臭乃為珍〔炳曰〕人
多言煎蒜白為假者〔斅曰〕驗法以半銖安熟銅器
中一宿沾｜｜處白如銀汞無赤色或將一銖安
於柚樹上樹立乾便是真者凡
用乳鉢研細熱酒器上熄過用

辛平無毒殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼
蠱毒（唐本）治風邪鬼疰心腹中冷痛（李珣）傳尸冷氣辟瘟
治瘧主霍亂心腹痛腎氣瘟瘴禦一切蕈菜毒（大明）解

自死牛羊馬肉諸毒 汪機 消肉積 震亨

發明［炳曰］——下細虫極效［時珍曰］——消肉積殺小虫故能解毒辟邪治瘧痢瘵疳尸注冷痛諸症按王璆百一選方云夔州譚遠病瘧半年故人竇藏叟授方用真——好丹砂各一兩研勻米糊和丸皂子大每空心人參湯化服一丸即愈世人治瘧惟用常山砒霜毒物多有所損此方平易人所不知周密云此方治瘧以無根水下治痢以黃連木香湯下瘧痢亦多起於積滯故耳

方 辟鬼除邪 ——棗許為末以牛乳或肉汁煎五六沸服之至暮以乳服安息香棗許久者不過十日忌一切菜 唐崔行功纂要 惡疰腹痛 不可忍者——末熱酒下一二錢即止 永類 尸疰中惡 遁死尸惡氣入腹終身不愈——二錢拌麪作餛飩煮食日三服七日永除忌五辛油膩等物 聖惠 小兒盤腸 內吊腹痛不止用——為末大蒜半瓣爛熟研爛為

時珍曰一一厥陰肝經藥

昂曰味苦色綠音眞

丸麻子大每艾湯服五七丸 總微

痞塊有積 一一五錢五靈脂炒烟盡五錢為末以雄黃犬胆汁和丸黍米大空心津唾送下三十丸忌羊肉醋䴵 扶壽精方

噎膈 方同上

痎瘧寒熱 一一胆脂各一豆大研勻以蒜泥和覆虎口上男左女右 聖濟

盧會 又名奴會 開寶 訥會 拾遺 象胆 藏器

集解 珣曰一一生波斯國狀似黑錫乃樹脂也 頌曰今惟廣州有來者 時珍曰一一向在草部藥譜及圖經所載皆言是木脂而一統志云爪哇三佛齊諸國所出者乃草屬狀如鱟尾采之以玉器搗成膏與前說不同何哉豈亦木質草形乎

苦寒治熱風煩悶胸膈間熱氣明目鎮心小兒驚癇療五疳殺三虫及痔瘡瘻疾解巴豆毒 開寶 主小兒諸

保昇曰小兒脾胃虛寒作瀉者勿服

疳熱李珣單用殺疳蚘吹鼻殺腦疳除鼻癢甄權研末傅䘌齒甚妙治濕癬出黃水蘇頌

發明時珍曰｜｜乃厥陰經藥也其功專於殺蟲清熱以上諸病皆熱與蟲所生也頌曰劉禹錫云余少年患癬初在頸間後延上左耳遂成濕瘡浸淫用斑蝥犬膽桃根諸藥其瘡轉盛一人教用｜｜一兩炙草半兩研末先以溫漿水洗之拭淨傅之立乾便瘥真神奇也

方 小兒脾疳｜｜使君子等分為末米飲服二錢易簡

胡桐淚又名胡桐鹼綱目胡桐律時珍曰律當作瀝

集解恭曰｜｜出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹脂淪入土石鹼鹵地者其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪器用保昇曰涼州以西有之

其津入地與土石相染狀如薑石極鹹苦得水便
消若礬石消石之類〔天明曰〕此有二般木律不堪
入藥惟用石律石上采之形如小石片子黃色者
為上〔時珍曰〕木淚乃樹脂流出者其狀若膏油石
淚乃脂入土石間者其狀成塊
以其得鹵斥之氣故入藥為勝

鹹苦大寒治大毒熱心腹煩滿水和服之取吐牛馬
急黃黑汗水研三二兩灌之立瘥（唐本）主風蟲牙痛殺
火毒麪毒（大明）風疳䘌齒骨槽風勞能軟一切物多服
令人吐（李珣）瘰癧非此不能除（元素）咽喉熱痛水磨掃之
取涎（時珍）

發明〔頌曰〕古方少用今治口齒家多用為最要之藥
〔時珍曰〕石淚入地受鹵氣故其性寒能除熱其

胡桐淚 燕萬

七十二

希雍曰察其所主雖能除風濕邪氣之爲害而其功則長于走腸胃殺虫消積故小兒疳冷痢所必資

味鹹能入骨軟堅

方 濕熱牙疼 喜吸風｜｜｜入射香摻之 牙痛出血｜｜｜半兩研末夜夜貼之或入射香少許 聖惠 走馬牙疳｜｜｜黃丹等分爲末摻之 醫林集要 牙疳宣露膿血臭氣者｜｜｜一兩地骨皮一升煎水熱漱○又｜｜｜葶藶子等分研摻 聖惠 牙齒𧏾黑乃腎虛也｜｜｜一兩丹砂半兩射香一分爲末摻之 聖濟

蕪荑 音啼 又名莁荑 爾雅 無姑 本經 𧋊蘠 木名楩 時珍曰按說文楩山枌榆也有刺其實爲｜｜

集解 別錄曰｜｜生晉山谷 弘景曰今出高 狀如榆莢氣臭如犼彼人以醬食性殺虫置物中辟蠹但患其臭 恭曰今延州同州者甚好 珣曰按廣州記云生大秦國是波斯｜｜也 藏器曰｜｜氣羶者良乃山榆仁也 時珍曰｜｜有大小兩種小者即榆莢也揉取仁醞爲醬味尤辛人多以

外物相和不可不擇去之
入藥皆用大丨丨別有種
辛平〔權曰苦平〕〔珣曰辛溫〕治五內邪氣散皮膚骨節中淫〻濕
行毒去三虫化食本經逐寸白散腸中嗢〻喘息別錄主
積冷氣心腹癥痛除肌膚支節中風淫〻如虫行蜀本
五臟皮膚肢節邪氣長食治五痔殺中惡蠱毒諸病
不生孟詵治腸風痔瘻惡瘡疥癬大明殺虫止痛治婦人
子宮風虛孩子疳瀉冷痢得訶子豆蔲良李珣和猪脂
擣塗熱瘡和蜜治濕癬和沙牛酪或馬酪治一切瘡
張

昂
燕羨

七十三

昂曰諸虫皆由濕而生氣食皆曰寒而滯
ㅣㅣ辛能散滿苦能殺虫溫能燥濕化食
亦能袪五臟支節間風濕

發明 詵曰作醬甚香美功尤勝於榆仁可少食之過多食發熱為辛故也秋月食之尤宜人

方 **脾胃有虫** 食即作痛面黃無色ㅣㅣ仁二兩和麪炒黃為末米飲下二錢 千金

制殺諸虫 生ㅣㅣ生檳榔各四兩為末蒸餅丸桐子大每下二十丸 本事

疳熱有虫 瘦悴久服充肥ㅣㅣㅣ川連等分猪胆汁入盞內飯上蒸之九蒸乃入射香半錢湯浸蒸餅丸小豆大每服七丸至二十丸 錢乙

小兒虫痛 胃寒虫上諸症危惡與癇相似用ㅣㅣ乾漆燒存性等分研為末米飲下一字至一錢 杜壬

結陰下血 ㅣㅣㅣ一兩搗爛紙壓去油雄猪胆丸桐子大每服九丸煎甘草湯下日五服三日斷根 普濟方

脾胃氣泄 久患不止ㅣㅣ五兩為末飯丸梧子大每空心米飲下三十丸久服去三虫益顏益神 王氏續傳信方

腹中鱉瘕 平時嗜酒血入於酒則為酒鱉平時多氣血凝於氣則為氣鱉虛勞痼冷敗血雜痰則為血鱉搖頭掉尾如虫

之行上侵人咽下蝕人肛或附脇背或隱胸腹大則如鱉小或如錢治法惟用｜｜炒煎服之兼用暖胃益血理中之類乃可殺之徒用雷丸錫灰之類無益　仁齋直指方

小兒驚瘖　風後失瘖不能言肥兒丸｜｜炒神曲炒麥芽川連炒各一錢為末猪胆丸黍米大每服十丸木通湯下　全幼心鑑

衛矛

又名鬼箭　別錄　神箭　廣雅

集解　別錄曰生霍山山谷　普曰葉如桃箭如羽　弘景曰山野處處有之削取皮羽入藥　頌曰今江淮州郡亦有之三月以後生莖莖長四五尺許其幹有三羽狀如箭羽葉似山茶青色　宗奭曰山谷皆有平陸未見也葉絶少其莖黃褐色若蘗皮三面如鋒刃人家多燔之遣祟　時珍曰｜｜生山谷閒小株成叢春長嫩條條上四面有羽如箭羽視之若三羽耳葉似野茶對生味酸濇三四月開碎花黃綠色結實大如冬青山人不識棋采之

苦寒大明曰甘澁權曰有小毒治女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰本經中悪腹痛去寸白蟲消皮膚風毒腫令陰中鮮別録治婦人血氣大效蘓恭破陳血能落胎主百邪鬼魅甄權通月經破癥結止血崩帶下殺腹臟虫及産後血吹腹痛大明

斆曰采得只使箭頭拭去赤毛以酥緩炙用

發明

頌曰古方崔氏療悪疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯姚僧坦集驗方治卒暴心痛忽中悪氣毒痛大黄湯亦用之並大方也見外臺千金諸書中時珍曰凡婦人産後血運血結血聚於胸中或偏於少腹或連於脇肋者四物湯四兩倍加當歸加鬼箭羽紅花延胡索各一兩研為末煎服

方

産後敗血硬塊痛及新産乘虛風寒内搏悪露不快臍腹堅脹當歸散用當歸炒一

〔昂曰〕損傷必有瘀血停滯漆能化瘀血為水故能續筋骨絕傷

〔希雍曰〕｜氣味俱厚通行腸胃入肝行血之藥也凡風寒濕邪之中人留而不去則腸胃鬱而生虫久則五臟六腑皆受病或為癰瘍或為拘攣所自來矣此藥能殺虫消散逐腸胃一切有形之滯積腸胃清則五臟安痿緩痹急自調矣又損傷一證專從血論蓋血者有形者也形質受病惟辛溫散結而兼鹹味者可入血分而消之瘀血消則絕傷自和而筋骨自續矣至于咳嗽有瘀血停留發為骨蒸勞瘵以致咳嗽者得其消散瘀血之力則骨蒸退而咳嗽亦除也

｜去中心木紅花各一兩每服三錢酒一椀煎七分服　和劑

鬼瘡｜｜穿山甲燒灰各二錢半為末每以一字發時嗃鼻○又法｜｜一兩砒黃一錢五靈脂一兩為末發時冷水下一錢　並聖濟錄

漆　說文作桼〔弘景曰〕｜桶中自然乾者狀如蜂房孔ゝ隔者為佳

辛溫無毒〔權曰〕辛鹹〔宗奭曰〕苦〔元素曰〕平有毒治絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒濕痹生漆去長虫　本經

乾漆治咳嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蚘虫　別錄

殺三虫主女人經脉不通　甄權

治傳尸勞除風　大明

削年深堅結之積滯破日久凝結之瘀血　元素

〔之才曰〕半夏為之使畏鷄子忌油脂〔弘景曰〕生｜毒烈人以鷄子和服之去虫猶自嚙腸胃也〔大明曰〕毒漆

七十五

發飲鉄漿並甘豆湯吃蟹並可制之時珍曰貨丨者多雜桐油故多毒淮南云丨見蟹不乾相感志云漆得蟹成水蓋物性相制也凡人畏丨者嚼川椒塗鼻則可免生丨瘡者杉木湯紫蘇湯漆姑草蟹湯浴之良大明曰乾丨搗碎炒熟不爾損人腸胃若是生丨煎乾更好亦有燒存性用者

發明 弘景曰仙方用蟹消漆為水鍊服長生抱朴子云淳丨不粘者服之通神長生九虫悉下惡血從鼻中出震亨曰丨性急而飛補用為去積滞之藥中節則積滞去後補性内行人不知也時珍曰丨性毒而殺虫降而行血所主諸病雖繁其功只在二者而已

方 小兒虫病 胃寒危惡症與癇相似者乾丨炒烟盡白蕪荑等分為末米飲服一字至一錢 杜壬方 九種心痛 及腹脇積聚滞氣乾丨一兩炒烟盡研末醋煑麪糊丸梧子大每服五九至九丸酒下 簡要濟衆 女子血氣 婦人不曾生長血氣痛不可忍及治丈夫疝氣小腸

氣撮痛者並宜服二聖丸生丨一兩熬一食頃入乾
丨一兩和丸梧子大每服三四丸怕丨人不可服

經閉 經驗 指南方萬應丸治女子經閉繞臍寒疝痛徹及產後血氣不調癥瘕等病乾丨一兩炒烟
盡牛膝末一兩生地汁熬膏和丸梧子大每服一丸
加至三五丸○產寶治月經不利血氣上攻欲嘔不
得睡用當歸四錢乾丨燒研三錢家丸梧子大每服
十五丸酒下○千金治經閉臍下堅如盃時發熱往
來下痢羸瘦此為血瘕若生肉瘕便不可治乾丨
燒研生地膏和丸梧子大每服三丸空心酒下

五勞七傷 補益方用乾丨柏子仁山萸肉棗仁各等分
為末蜜丸梧子大每服二七丸酒下日二

鮮蠱毒 千金 平胃散末以生丨和丸梧子大
酒下七十丸至百丸　直指方

漆葉 治五尸勞疾殺虫暴乾為末日用酒服一錢

時珍

漆葉　巴豆

七十六

發明〔頌曰〕華佗傳云彭城樊阿師事佗佗授以｜｜
青黏散服之去三虫利五臟輕身益氣後阿壽
二百歲人問之秘其說因醉誤說人始得之多效後
人無復識青黏者或云即黃精之正葉者也〔時珍曰〕
抱朴子云｜｜青黏樊阿服之得壽二百耳目聰明
猶持針治病此近代之實事或云青黏即葳蕤也

巴豆 又名巴菽本經 剛子炮炙 老陽子 〔時珍曰〕
此物出巴蜀故名兩頭尖者為剛子緊小者是
雌有稜及兩頭尖
者是雄雄者峻利

集解〔頌曰〕嘉州眉州戎州皆有木高一二丈葉如
櫻桃而厚大初生青色後漸黃赤十二月葉
漸稀二月復生四月舊葉落盡新葉齊生即花發
成穗微黃色五六月結實生青八月熟黃類白豆
蔻一房有二瓣一瓣一子或三子子仍有殼用之
去殼戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩
三道土人呼為金線｜｜為上等他處少有〔時珍
曰〕｜｜房似大風子殼而脆薄子及仁皆似海松

子與白豆蔻殊不類

辛溫有毒〔別録曰〕有大毒〔元素曰〕性熱味苦〔杲曰〕性熱味辛〔時珍曰〕氣熱味辛治傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹蕩練五臟六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚〔本經〕療女子月閉能爛胎治金瘡膿血不利丈夫殺斑蝥蛇虺毒〔別録〕治十種水腫痿痺落胎〔藥性〕宣通一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹臟虫治惡瘡瘜肉及疥癩丁腫〔日華〕導氣消積去臟腑停寒治生冷硬物所傷〔元素〕治瀉痢驚

癇，心腹痛，疝氣，風喎，耳聾，喉痺，牙痛，通利關竅。時珍

〔之才曰〕芫花為之使。畏大黃〻連、蘆筍、菰筍、藜蘆、醬豉、冷水。得火良。惡蘘草。與牵牛相反。中其毒者，以冷水、黃連汁、大豆汁解之。〔時珍曰〕｜｜氣熱味辛，生猛熟緩，能吐能下，能止能行，可升可降藥也。不去膜則傷胃，不去心則作嘔，以沉香水浸則能升能降，與大黃同用瀉人反緩，其性相畏也。〔弘景曰〕新者佳，用之去皮心，熬令黃黑，擣如膏，乃和丸散。〔大明曰〕凡入丸散，炒用不如去心膜，換水煮五度，各一沸也。〔時珍曰〕｜｜有用仁者，用殼者，用油者，有生用者，醋煮者，燒存性者，有研爛以紙包壓去油者，謂之｜｜霜。

發明〔元素曰〕｜｜乃斬關奪門之將，不可輕用。〔震亨曰〕｜｜去胃中寒積，無寒積者勿用。〔元素曰〕世以｜｜熱藥治酒病膈氣，以其辛熱能開腸胃鬱結也。但鬱結雖開，而亡血液，損其真陰。〔從正曰〕傷寒風濕，小兒瘡痘，婦人產後，用之下膈，不死亦危。奈何庸人畏大黃而不畏｜｜，以其性熱而劑小耳。豈知以

昂曰｜｜稟火烈之性爛人肌肉試以少許擦皮膚即生一泡况腸胃耶不可輕用

鳴皋曰人之腸胃全恃涎液故乾物入胃得涎液之滑則下行所謂真陰也峻利之藥雖能推蕩陳積而涎液亦蕩去故食物不得涎液粘滯于胃而不能消此元素從正所以有損陰留毒之戒也但｜｜稟悍烈之性攻堅陷陣力無與侔猜鋼腸胃非此不能通用之得當亦有起死之能故元素從正言其過其過當戒也好古時珍言其功其功亦不可輕也

蠟匱之猶下後使人津液枯竭胃熱口燥耗却天真留毒不去他病轉生故下藥宜以為禁藏器曰｜｜主癥癖痃氣痞滿積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹吞一枚去殼勿令白膜破并四邊不得有傷損吞之以飲壓令下少頃腹內熱如火利出惡物雖利而不虛若久服亦不利人白膜破者勿用好古曰若急治為水穀道路之劑去心膜油生用若消痞磨堅緩治之劑炒去烟令紫黑用可以通腸可以止瀉世所不知也張仲景治百病客忤備急丸用之時珍曰｜｜峻用則有戡亂劫病之功微用亦有撫緩調中之妙譬之蕭曹絳灌乃勇猛武夫而用為相亦能輔治太平海藏言可以通腸可以止瀉此發千古之秘也一老婦年六十餘病溏泄已五年肉食油膩生冷犯之即作痛服調脾升提止澀諸藥入腹則瀉反甚余診之脉沈而滑此乃脾胃久傷冷積凝滯所致王太僕所謂大寒凝內久利溏泄愈而復發綿歷歲年者法當以熱下之則寒去利止遂用蠟匱｜｜丸五十丸與服二日大便不通亦不

巴豆

六十八

利其泄遂愈自是每用治泄痢積滯諸病皆不瀉而
病愈者近百人妙在配合得宜藥病相對耳用之不
當則犯損
陰之戒矣
方寒澼宿食不消大便閉塞||仁一升清酒五
升煮三日三夜研熟合酒微火煎令
可丸如豌豆大每服一丸食癨積癨||去皮心二
水下欲吐者二丸　千金　錢皂角去皮子
六錢檮丸如綠豆大一服　腹痛裏急杏仁
一丸冷湯吞下　肘後方　積滯瀉痢　去皮尖||去
皮心各四十九粒同燒存性研泥溶蠟和丸綠豆大
每服二三丸煎大黃湯下間日一服一加百草霜三
錢　劉　夏月水瀉不止||一粒燒存性化蠟和　伏
河間　作一丸倒流水下　危氏得效
暑霍亂傷冷吐利煩渴水浸丹用||二十五粒去
皮心及油黃丹炒研一兩二錢半化黃蠟和
丸綠豆大每服三五丸水浸少　心腹脹痛
頃別以新汲水下　和劑局方　乾霍亂病不吐不利

昂曰纏喉急痺緩治則死用解毒丸雄黃
一兩鬱金一兩巴豆十四粒去皮去油為
丸每服五分津嚥嚥下雄黃破結氣鬱金
破惡血巴豆下稠涎然屬厲劑不可輕用
或紙撚蘸巴豆油吹息刺喉或搗巴豆綿
裹塞鼻中吐出惡涎紫血即寬鼻少生瘡
不礙
希雍曰同白礬枯過去豆單用礬研細吹
入喉中吐去熱毒涎治急喉痺如神

欲死｜｜一枚去皮心熱青橘皮一片包
水研服得吐利即定也　寒痰氣欬｜｜一箇麻札
定火上燒存性研末薑汁和酒一鍾　風濕中痰人坐
呷服到口便止神方也　張杲醫說　密室
中將新｜｜四十九粒研如泥紙壓去油分作三餅
如病在左令病人將右手仰置掌上安藥於掌心以
盆安藥上傾熱水於盆內水涼即換良久汗出立
見神效病在右安左手一云隨左右安之　保壽　陰
毒傷寒　心結按之極痛大小便秘但出氣稍緩者急
取｜｜十粒研入麪一錢捻作餅安臍內以
小艾炷灸五壯氣達即通　喉痺垂死　以綫穿｜｜納
此太師陳𠃊山方　直指　入喉中牽出即
醒　千　三物備急　方見大　一切惡瘡｜｜三十箇香
金方　黃下　油煎黑去豆以
油調琉黃輕粉末　癰疽惡肉　烏金膏解一切瘡毒及
頻塗取效　普濟　腐化瘀肉最能推陳致
新｜｜炒焦研膏點痛處則解毒塗瘀肉上則自化
加乳香少許亦可若毒深不能收歛者宜作撚紝之
巴豆　七十九

不致成瘻　不可拔者用新||罨炒與

見外科精義　箭鏃入肉　蜣螂同研塗之斯須痛定微

癢忍之待極癢不可忍便撼動拔之取出速以生肌

散傅之亦治瘡腫一婦病背瘡呻吟不已夏侯鄭用

此方試之即痛　小兒痰欬||一粒杵爛綿裹塞鼻

止也　經驗　男左女右痰即自下　龔

氏醫

鑑

穀　消積滯治瀉痢　時珍

方　一切瀉痢脉浮洪者多日難已脉微者服之立

止名勝金膏巴豆皮楮葉同燒存性

研化蠟丸綠豆大每甘草湯

下五丸　劉河間宣明方

樹根　治癰疽發背腦疽鬢疽大患掘取洗搗傅患

處留頭妙不可言乾者臨時水搗亦可　時珍　出楊誠經驗方

大風子

集解〔時珍曰〕今海南諸番國皆有之按周達觀眞臘記云一一一乃大樹之子狀如椰子而圓中有核數十枚大如雷丸子中有仁白色久則黃而油不堪入藥

仁 辛熱有毒治風癬疥癩楊梅諸瘡攻毒殺虫時珍

〔時珍曰〕取油法用子三斤去殼及黃油者研極爛瓷器盛之封口入滚湯中蓋鍋密封勿令透氣文武火煎至黑色如膏名大風油

發明〔震亨曰〕粗工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者〔時珍曰〕大風油治瘡有殺虫刼毒之功盖不可多服用之外塗其功不可沒也

方 大風諸癩一一一油一兩苦參末三兩入少酒糊丸桐子大每服五十丸空心温酒

下仍以苦參湯洗　普濟

大風瘡裂|||燒存性和麻油輕粉研塗仍以穀煎湯洗之　嶺南衛生方

楊梅惡瘡　方同上

相思子　又名紅豆

集解　時珍曰|||生嶺南樹高丈餘白色其葉似槐花似皂莢其莢似扁豆其子大如小豆半紅半黑彼人以嵌首飾或言用子收龍腦香令香不耗

苦平有小毒吐人通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛風痰瘴瘧殺腹臟及皮膚內一切虫除蠱毒取二七枚研服即當吐出　時珍

方　**瘴瘧寒熱**|||十四枚水研服取吐立瘥　千金　**蠱毒**　用|||十四枚研

末溫水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大吐輕者但服七枚神效 外台

柳 又名小楊 說文

集解 弘景曰｜即今水楊柳也 恭曰｜與水楊全不相似水楊葉圓濶而尖枝條短硬柳葉狹長而青，枝條長軟陶以｜為水楊非也 藏器曰 楊樹枝葉短｜樹枝葉長 時珍曰 楊枝硬而揚起故謂之楊柳枝弱而垂流故謂之柳蓋一類二種蘇恭之說是

葉 苦寒治惡疥痂瘡馬疥煎煮洗之立愈又療心腹內血止痛 別錄 洗漆瘡 弘景 天行熱病傳尸骨蒸勞熱下水氣煎膏續筋骨長肉止痛治服金石人發大熱悶湯火瘡毒入腹熱悶及丁瘡 日華 治白濁解丹毒 時珍

方　小便白濁煎湯代茶集簡　卒得惡瘡｜｜或皮水煮汁入少鹽洗之

肘後方　痘爛生蛆嫩柳葉鋪席上臥之蛆盡出　李樓奇方

枝及根皮　苦寒治痰熱淋疾為浴湯洗風腫瘙癢

煮酒漱齒痛蘇恭　煎服治黃疸白濁酒煮熨諸痛腫去

風止痛消腫時珍

發明　頌曰柳枝及根皮肘後方治癰疽腫毒妬乳等多用之　宙獨行方主下瘡及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥牙齒藥亦用之為最要藥時珍曰柳枝去風消腫止痛削為牙杖甚妙

方　走注氣痛氣痛之病忽有一處如打撲之狀不可忍走注不定靜時其處冷如冰此暴寒傷之也酒煮柳白皮熨之有赤點處鑱去血炒凡諸急痛卒腫熨之皆即止　姚氏集驗　風毒

卒腫同上黄疸初起柳枝煮濃汁半升頓服外台

柳絮　苦寒治風水黄疸面熱黑本經痂疥惡瘡金瘡

柳實主潰癰逐膿血子汁療渴別錄花主止血治濕痹

四肢攣急膝痛甄權

發明宗奭曰實及子汁之文諸家不解今人亦不見用時珍曰本經主治風水黄疸者柳花也別錄主治惡瘡金瘡潰癰逐膿血藥性論止血治痹者柳絮及實也花乃嫩蕊可搗服子與絮連難以分別惟可貼瘡止血裹痹之用所謂子汁療渴者則連絮浸漬研汁服之耳又崔寔四民月令言三月三日及上除日采絮愈病則入藥多用絮

方　吐血咯血——焙研米飲下一錢經驗　金瘡血出——封之即止外

面上膿瘡 台 丨丨膩粉等分以灯盞油調搽 普濟

水楊 又名青楊 綱目 蒲柳 爾雅 蒲楊 古今注 蒲移 音移 移柳 同上 雈 音丸蒲

集解 [恭曰] 丨丨葉圓濶而尖枝條短硬與柳全別柳葉狹長條枝長軟 [頌曰] 爾雅楊蒲柳也其枝勁韌可為箭笴河北沙地多生之楊柳之類亦多古今注云白楊葉圓青楊葉長柳葉長而細移楊葉圓而弱 丨丨 即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊莖可作矢赤楊霜降則葉赤材理亦赤然令人鮮能分別 [機曰] 蘊恭說水楊葉圓濶雈豹說蒲楊似青楊青楊葉長似不類 [時珍曰] 按陸機詩疏云蒲柳有二種一種皮正青一種皮正白可為矢北地尤多花與柳同

枝葉 苦平久痢赤白擣汁一升服日二大效 唐本 主癰腫痘毒 時珍

「鳴皋曰」嘗見一小兒痘悶不出昏悶不哭醫用芫荽煮水上安一蒸籠緩緩蒸之上覆以被水不宜過熱 冷再加熱湯蒸一二時許兒啼痘出矣此博愛心鑑法同一理也

發明「時珍曰」水楊根治癰腫故近人用枝葉治痘觸直博愛心鑑云痘數日陷頂漿滯不行或風寒所阻者宜用水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜煎湯温浴之如冷添湯良久照見纍起有暈絲者漿行也如不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴不起者氣血敗也不可再浴始出及痒塌者不可浴痘不行漿乃氣澀血滯腠理固密或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢鬱蒸氣血通徹每隨暖氣而發行漿貫滿功非淺也若内服助氣血藥藉此升之其效更速風寒亦不得而阻之矣直見一嫗在村中用此有驗叩得其方行之百發百中慎勿易之誠有燮理之妙羣書皆無此法故詳著之

白皮及根苦平治金瘡痛楚乳癰諸腫痘瘡時珍

發明「時珍曰」李仲南永類鈐方云有人治乳癰持藥一根生搗貼瘡其熱如火再貼便平求其方乃水楊根也葛洪肘後治乳癰用柳根則楊柳性不遠可以通用也

水楊 白楊

八十三

方　金瘡苦痛 楊木白皮炒燥碾末水服方寸匕仍傳之日三次 千金方

白楊【恭曰】||葉圓大蒂小無風自動【藏器曰】||北地甚多人種墟墓間樹大皮白【頌曰】葉圓如梨葉皮白色木似楊【宗奭曰】陝西甚多居人修蓋多此木風纔至葉如大雨聲

木皮　苦寒【大明曰】酸冷　治毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣游移在皮膚中痰癖等症酒漬服之 唐本　去風痹宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍及皮膚風瘙腫雜五木為湯浸損處 藏器　治撲損瘀血並煎酒服煎膏可續筋骨 大明　煎湯日飲止孕痢煎醋含漱止牙痛煎漿水入鹽含漱治口瘡煎水釀酒消癭氣 時珍

希雍曰入足陽明手太陰少陰胃肺心經近世以治痲疹熱毒不能出用為發散之神藥蓋熱毒熾于肺胃則發斑疹于肌肉閒以肺主皮毛胃主肌肉也此藥正入肺胃心三經三經毒解則邪透肌膚而內熱自消此皆開發升散甘鹹微溫之功用也

方

妊娠下痢白楊皮一斤水一斗煮二升分三服千金

癭氣秫米三斗炊熟取圓葉白楊皮十兩勿令見風切水五升煮二升漬麴末五兩釀酒每旦飲一杯日二崔氏

枝 消腹痛治吻瘡時珍

方

吻瘡白楊嫩枝鐵上燒灰和脂傅之外臺

檉柳音偵 又名赤檉日華 赤楊古今注 河柳爾雅 雨師詩疏 垂絲柳綱目 俗名觀音柳長壽仙人柳西河柳三春柳或訛為山川柳

集解禹錫曰爾雅檉河柳也郭璞注云今河旁赤莖小楊也陸機詩疏云皮赤如絳枝葉如松

時珍曰｜｜小幹弱枝赤皮細葉如絲婀娜可愛一年三次作花花穗長三四寸水紅色如蓼花色段成式酉陽雜俎云涼州有赤白檉為炭其灰汁可煮銅

〔昂曰〕西河柳能使痘疹毒外出末服四錢治沙疹不出喘嗽煩悶沙糖調服治疹後痢

〔希雍曰〕同石膏知母薄荷荊芥牛蒡元參麥冬連翹黃芩甘草之屬治斑疹不出或雖發不透如熱甚毒熾舌生芒刺大渴譫語斑色紫黑者加入三黃石膏湯内大效

枝葉 甘鹹温消痞解酒毒利小便 時珍

方 **腹中痞積** 丨丨煎湯露一夜五更空心飲數次痞自消 衛生易簡 **一切諸風** 不問遠近丨丨半斤切枝亦可荊芥半斤水五升煮二升澄清入白蜜五合竹瀝五合瓶盛封好入重湯煮一伏時每服一小盞日三 普濟 **酒多致病** 長壽仙人柳晒乾為末每服一錢温酒調下 衛生易簡

梓 又名木王〔時珍曰〕木莫良於丨故書以丨材名篇禮以丨人名匠帝以丨宮名棺屋有此木則餘材皆不震其為木王可知

集解〔頌曰〕人家園亭亦多植之木似桐而葉小花紫爾雅云椅丨郭璞注云即楸也詩云椅桐丨漆陸機注云楸之疏理白色而生子者為丨丨實桐皮為椅大同而小異也入藥當用有子者〔大

明曰|有數般惟楸|皮入藥佳餘皆不堪【機曰】
賈思勰齊民要術以白色有角者為|即角楸也
其角細長如箸其長近尺冬後落葉而角猶在樹
【時珍曰】|有三種木理白者為|赤者為楸|之
美文者為椅楸之小者為榎諸家疏
注殊欠分明桐亦名椅與此不同

梓白皮　苦寒治熱毒去三蟲本經療目中疾主吐逆
皮胃小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡煎湯浴之并擣傅別錄
煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒大明治温病復
感寒邪變為胃啘煮汁飲之時珍

方　時氣温病頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裏白皮一升水二升半煎汁
每服八合
肘後

葉　療手足火爛瘡時珍　別錄云葉飼猪肥大三倍

楸又名榎

集解見梓下周憲王曰丨有二種一種刺丨其樹高大皮色蒼白上有黄白斑點枝梗間多大刺葉似丨而薄味甘嫩時煠熟可食時珍曰丨有行列莖幹直聳可愛至上垂條如線謂之丨線其木濕則脆燥則堅故謂之良材即梓之赤者宜作棋枰

白皮　苦小寒珣曰微温　治吐逆殺三虫及皮膚虫煎膏傅惡瘡疽瘻癰腫疳痔除膿血生肌長筋骨藏器　消食澀腸下氣治上氣欬嗽李珣　口吻生瘡貼之頻易取效時珍

方 瘻瘡 楸枝作煎頻洗取效 肘後 白癜風 楸白皮五斤煎膏日三摩之 聖濟

葉 苦小寒搗傅瘡腫煑湯洗膿血冬取乾葉用之

諸瘡腫潰及内有刺不出取葉十重貼之 蔵器

發明 時珍曰 楸乃外科要藥而近人少知葛常之韻語陽秋云有人患發背潰壞腸胃可窺一醫用太陽未升時采楸葉熬膏傅其外内以雲母膏作小丸服盡四兩不累日而愈也東晋名醫范汪亦稱楸葉治瘡腫之功則楸有拔毒排膿之力可知

方 一切毒腫 不問硬軟取楸葉十重敷瘡上舊帛裹之日三易之當重〻有毒氣為水流在葉上冬取乾葉鹽水浸軟或取根皮搗爛傅之皆效止痛消腫食膿血勝於衆 范汪方 瘰癧瘻瘡 楸煎神 秋分前後早晚摘楸葉取十五斤以水一石煎取三斗換鍋煎取七八升再換鍋煎

取二升乃納瓷器中用時先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消化又取杏仁七粒生薑少許同研米粉二錢同入膏中攪匀先塗瘡上經二日乃拭去即以蔥子匀塗楸煎滿瘡上以帛裹之且日一拭更上新藥不過五六上已破者即生肌未破者即內消愈後須將慎半年采藥及煎時禁雞犬婦人僧道孝子見之奩中方

頭癢生瘡 楸葉汁頻塗聖惠

桐 又名白桐弘景 黃桐圖經 泡桐綱目 椅桐弘景 榮桐爾雅

時珍曰本經桐葉即白桐也其華成筒故曰桐其材輕虛色白而有綺文故俗謂之白桐泡桐古謂之椅桐也先華後葉故爾雅謂之榮桐或言其華而不實者未之察也陸璣以椅為梧桐郭璞以榮為梧桐並誤

集解 弘景曰桐樹有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐皮白葉似青桐而有子子肥可食白桐一名椅桐人家多植之與岡桐無異但有花子二月開花黃紫色禮云三月桐始華者也堪作琴

瑟岡桐無子是作琴瑟者本草用桐應是白桐〔頌
曰陸機言白桐宜為琴瑟雲南牂牁人取花中白
毳漬績為布似毛服謂之華布椅即梧桐也今作
桐油者即岡桐也有子大如梧子〔宗奭曰本經桐
葉不指定何桐致難執用但四種各有治療白桐
葉開三杈開白花不結子無花者為岡桐不中作
琴體重荏桐子可作桐油梧桐結子可食〔時珍曰
陶注桐有四種以無子者為青桐岡桐有子者為
梧桐白桐寇注言白桐岡桐皆無子蘇注以岡桐
為油桐而賈思勰齊民要術言實而皮青者為梧
桐華而不實者為白桐白桐冬結似子者乃是明
年之華房非子也岡桐即油桐也其說與陶氏相
反以今咨訪互有是否蓋白桐即泡桐也葉大徑
尺最易生長皮色粗白其木輕虛不生虫蠹作器
物甚良二月開花如牽牛花而白色結實大如巨
棗長寸餘殼內有子片輕虛如榆莢葵實之狀老
則殼裂隨風飄揚其花紫色者名岡桐荏桐即油
桐也青桐即梧桐之無實者按陳翥桐譜分別白

桐岡桐甚明云白花桐文理粗而體性慢喜生朝陽之地因子而出者一年可起三四尺由根而出者可五七尺其葉圓大而尖長有角光滑而毳先花後葉花白色花心微紅其實大二三寸內為兩房〻內有肉〻上有薄片即其子也紫花桐文理細而體性堅亦生朝陽之地不如白桐易長其葉三角而圓大如白桐色青多毛而不光且硬微赤亦先華後葉花色紫其實亦同白桐而微尖狀如訶子而粘房中肉黃色二桐皮色皆一但花葉小異體性堅慢不同耳

桐葉　苦寒治惡蝕瘡着陰本經消腫毒生髮時珍

方　手足浮腫｜｜煮汁漬之并飲少許或加小豆尤妙　聖惠　癰疽發背大如盤臭腐不可近｜｜醋蒸貼上退熱止痛生肉收口極驗秘方也　醫林正宗

梧桐

葉　治發背炙焦研末蜜調傳乾即易附後

罌子桐　又名荏桐何羲虎子桐拾遺油桐

集解　時珍曰油桐枝幹花葉並類岡桐而小花亦微紅但其實大而圓每實中有二子或四子大如大風子其肉白色味甘而吐人亦或謂之紫花桐人多蒔之收子為油入漆家用

桐油　甘微辛寒有大毒摩瘡疥虫獼虫瘡毒瘡毒鼠至死藏器塗脛瘡湯火傷吐風痰喉痺時珍

時珍曰｜｜吐人得酒即解

方　臁瘡胡粉煅過研｜｜調作隔紙膏貼之○又方用船上陳｜｜石灰煅過又以人髮拌｜｜炙乾為末仍以｜｜調作膏塗紙上刺孔貼之

解砒毒｜｜二升灌之吐即毒解簡便方

桐　梧桐　桐油　竹　八十八

元素曰涼心經

希雍曰入足陽明手少陰經 胃心

昂曰葉生在竹上故治上焦之病

希雍曰陽明熱客則胸中生痰痰熱阻滯則欬逆上氣辛寒解陽明熱故痰消氣下而欬逆止

華陀危病方

竹

集解 弘景曰竹類甚多入藥用䈽竹次用淡竹苦竹又有一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以筍為佳於藥無用 頌曰䈽竹淡竹苦竹三種人多不能盡別按竹譜䈽竹堅而節促體圓而質勁皮白如霜大者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫甘竹似篁而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作笛自有一種苦竹亦有二種一出江西閩中本極粗大筍味殊苦不可啖一出江浙肉厚而葉長闊微有苦味俗呼甜苦筍是也今人燒瀝惟用淡竹一品肉薄節間有粉者

䈽竹葉 苦平 大寒 別錄曰 治欬逆上氣筋急惡瘍殺小虫 本經 除煩熱風痓喉痺嘔吐 別錄 煎湯熨霍亂轉筋 時珍

（權曰）淡竹葉止嘔噦亦能發汗仲景治傷寒發熱大渴有竹葉石膏湯乃假其辛寒以散陽明邪熱也

淡竹葉　辛甘大寒（權曰甘寒）治胸中痰熱欬逆上氣（別錄）吐血熱毒風止消渴壓丹石毒（甄權）能入心涼血 消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風止驚悸瘟疫迷悶妊婦頭旋倒地小兒驚癇（大明）喉痹鬼疰惡氣煩熱殺小虫（孟詵）涼心經除熱緩脾益元氣（元素）前濃汁漱齒中出血洗脫肛不收（時珍）

苦竹葉　苦寒治口瘡目痛明目利九竅（別錄）治不眠止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風瘖瘂（大明）殺虫燒末和猪胆塗小兒頭瘡耳瘡疥癬和雞子白塗一切惡瘡頻用取效（時珍）

竹葉　根　八十九

〔希雍曰〕前湯調棗仁炒熟末五錢臨卧服治心虛不得眠　同麥冬棗仁遠志丹參茯神丹砂犀角治心經有熱虛煩不眠入白虎湯治傷寒煩熱大渴引飲

發明〔詵曰〕竹葉篁苦淡甘之外餘皆不堪入藥不宜人淡竹為上甘竹次之〔宗奭曰〕諸筍性寒故知其葉一致也仲景竹葉湯所用淡竹〔杲曰〕竹葉辛苦寒可升可降陽中陰也其用有二除新久風邪之煩熱止喘促氣勝之上衝

方　上氣發熱 因奔趁走馬後飲冷水所致者竹葉三斤橘皮三兩水一斗煎五升細服之三日一劑 肘後方

時行發黃 竹葉五升切小麥七升石膏三兩水一斗半煮取七升細服盡劑愈 肘後方

篁竹根　益氣止渴下氣 本經 消毒 別錄　淡竹根　除煩熱解丹石發熱渴煮汁服 藏器 消痰去風熱驚悸迷悶小兒驚癇 大明 同葉煮湯洗婦人子宮下脫 時珍　甘

希雍曰淡竹茹入足陽明經胃
昂曰淡竹茹開胃土之鬱清肺金之燥治上焦煩熱能涼血故治吐血崩中肺痿尿血等症能清胃熱故止嘔吐能涼胎氣故治胎動
又曰皮主肺故入肺治上焦○溫膽湯用之

竹根　煮汁服安胎止產後煩熱 時珍　苦竹根　治心肺五臟熱毒氣剉一斤水五升煮一升分三服 孟詵

方　產後煩熱 逆氣用甘竹根切水一斗五升煮取七升去滓入小麥二升大棗二十枚煮三四沸入甘草一兩麥冬一升再煎至二升每服五合 婦人良方

淡竹茹　甘微寒治嘔啘溫氣寒熱吐血崩中 別錄 止肺痿唾血衄血治五痔 甄權 勞熱 大明 噎膈 孟詵 傷寒勞復婦人胎動小兒熱癇 能散肝火 時珍　苦竹茹　下熱壅 孟詵 水煎服止尿血 時珍

方　傷寒勞復 病後交接勞復卵腫股痛｜｜一升水三升煮五沸服汁 南陽活人書

昂曰竹之有瀝猶人之有血故能養血益
陰清大而行經絡又曰和米煮粥能治反

婦人勞復 病愈因勞動致熱氣衝胸手足搐搦如中風狀ーー半斤栝樓二兩水二升煎一升分服 產後煩熱 內虛短氣甘竹茹湯甘竹茹一升人參茯苓甘草各二兩黄芩二兩水六升煎二升分服日三 婦人良方 婦人殞胎 孕八九月或墜傷或牛馬驚傷心痛用青竹茹五兩酒一升煎五合服 子母秘錄 月水不斷 青竹茹炙每用三錢水一盞煎服 普濟 小兒熱病 口噤體熱竹茹三兩醋三升煎一升服一合 子母秘錄 齒血不止 生竹茹醋浸令人含之噀其背三過以茗汁漱之 千金 牙宣 竹茹當歸尾煎湯入鹽含漱 永類 飲酒頭痛 竹茹二兩水五升煮三升入鷄子三枚煮三沸食之 千金 傷損內痛 兵杖木石所傷血在胸背脇下刺痛用竹茹亂髮各一團炭火炙焦為末酒一升煮三沸服三服愈 千金

淡竹瀝 甘大寒治暴中風〻痹胸中大熱止煩悶

希雍曰——性滑流利走竅逐痰故為中風家要藥凡中風之証莫不由于陰虛火旺煎熬津液結而為痰壅塞氣道不得升降熱極生風以致猝然僵仆或偏痺不仁此藥能走經絡捜剔一切痰結兼之甘寒能益陰而除熱痰之熱既袪則氣道通利經脉流轉外症自除矣觀古人治中風用——則知中風未有不因陰虛痰熱所致如果外來風邪安得用此甘寒滑利之藥哉

鳴皋曰凡古名手治中風無不云陰虛火炎乃自生之風非外來之風奈何今之庸醫咬定中風二字專用風藥醫者殺人而不罹病者被殺而不恐哀哉

希雍曰同貝母栝楼仁霞天膏白芥子橘紅欝金童便麥冬治中風口眼喎邪言語蹇澀半身不遂等症

消渴勞復 別錄 中風失音不語養血清痰風痰虛痰在胸膈使人癲狂痰在經絡四肢及皮裏膜外非此不達不行 震亨 治子冒風痓解射罔毒 時珍 筀竹瀝 治風痓 別錄 苦竹瀝 治口瘡目痛明目利九竅 別錄 功同淡竹 大明 治牙疼 時珍

發明 弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦筀竹者 敩曰久渴心煩宜投竹瀝 震亨曰竹瀝滑痰非助以薑汁不能行諸方治胎產金瘡口噤與血虛自汗消渴小便多皆是陰虛之病無不用之產後不碍虛胎前不損子本草言其大寒似與石膏黃芩同類而世俗因弃而不用經云陰虛則發熱竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱寒而能補與山藥寒補義同世人食笋至老未有因寒而病者瀝即笋液何寒如此之盛乎

但能食者用剎瀝不能食者用竹瀝【時珍曰竹瀝性寒滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之若寒濕胃虛腸滑之人服之則反傷腸胃也筍性滑利多食瀉人僧家謂之刮腸篦即此義也神仙傳云姜公服竹汁餌桂得長生蓋竹汁性寒以桂濟之亦與用薑汁佐竹瀝之意相同淡竹令人呼為水竹有大小二種此竹汁多而甘

方

中風口噤 竹瀝薑汁等分服 千金方

小兒口噤 身熱竹瀝二合暖飲 見兵部手集

產後中風 口噤身直面青手足反張竹瀝飲一二升即醒 梅師

破傷風 凡折傷金刃諸瘡受風發痓口噤項急甚危急飲竹瀝二三升忌冷飲食及酒竹瀝須溫飲 外臺

小兒傷寒 竹瀝葛根汁各六合細細服之 千金

小兒狂語 夜後便發竹瀝與服 至寶方

妊娠胎動 因火者雖困飲竹瀝一升即愈 產寶

孕婦子煩 竹瀝頻飲

〔昂曰〕凉心鎮肝〔又曰〕片〻如竹節者眞

〔昂曰〕利竅豁痰
〔希雍曰〕小兒驚風天吊諸風熱者亦猶大

○梅師方茯苓二兩竹瀝一升水四升煎二升分三服未愈再作　時氣煩躁五六日不解竹瀝半盞煎服厚覆取汗　千金　消渴尿多　竹瀝恣飲　肘後　欬嗽肺痿大人小兒咳逆短氣胸中吸〻欬出涕唾嗽出臭膿

竹瀝任飲以愈爲度　李絳兵部手集　小兒目赤竹瀝點之良　古今録驗　丹石發毒竹瀝頻飲　同上

竹黃 又名天竺黃〔志曰〕天竺黃出天竺國今諸竹内往〻得之人多燒諸骨及葛粉等雜之〔大明曰〕此是南海邉竹内沙塵結成者〔宗奭曰〕此是竹内所生如黃土着竹成片者〔時珍曰〕吴僧贊寧云〡〡生南海鏞竹中此竹極大又名天竹其内有黃本草作天竺者非矣篡竹亦有黃此說得之

甘寒〔大明曰〕平　治小兒驚風天吊去諸風熱鎮心明目療

人熱極生風之症也此藥能除熱養心豁
痰利竅心家熱清而驚自平

〔杲〕曰雷丸胃大腸經藥

金瘡滋養五臟〔開寶〕治中風痰壅卒失音不語小兒客
忤癇疾伏粉霜〔大明〕制藥毒發熱〔保昇〕

發明〔宗奭曰〕天竹黃涼心經去風熱作小兒藥尤宜
和緩故也〔時珍曰〕｜｜出於大竹之津氣結成
其氣味功用與竹瀝
同而無寒滑之害

方 小兒驚熱天竹黃二錢雄黃牽牛末各一錢研
勻麪糊丸粟米大每服三五丸薄荷
湯下 錢
乙小兒方

雷丸 又名雷實〔別錄〕雷矢〔同上〕竹苓

集解〔弘景曰〕出建平宜都間纍纍相連如丸〔恭曰〕
｜｜竹之苓也無苗蔓皆零無相連者今出
房州金州〔時珍曰〕｜｜大小如栗
狀如猪苓而圓皮黑肉白甚堅實

昂曰功專除熱消積殺虫
希雍曰入手足陽明經其主殺三虫治寸白虫自虫不止者腸胃濕熱甚也逐毒氣治胃中熱逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積者腸胃邪熱甚也——苦寒能除二經濕熱邪氣則以上諸症自除又曰久服令人陰痿正見其過于苦寒偏至之氣
又曰同蕪荑使君子蘆薈胡連五穀虫青黛治小兒疳蚘有神效

李當之云大寒

苦寒有小毒〔別錄曰〕鹹微寒有小毒赤者殺人白者善〔時珍曰〕甘微苦平 殺三虫逐毒氣治胃中熱利丈夫不利女子本經 作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒治白蟲寸蟲自出不止久服令人陰痿別錄 逐風主顛癇狂走甄權

〔之才曰〕茹實厚朴蓄根芫花為之使惡葛根〔斆曰〕凡使用甘草水浸銅刀刮去黑皮破開以甘草水再浸蒸日乾〔大明曰〕炮用

發明〔弘景曰〕本經云利丈夫別錄云久服陰痿於事相反〔志曰〕經言利丈夫不利女子乃疏利男子元氣不疏利女子臟氣故曰久服陰痿也〔時珍曰〕按陳正敏遯齋閒覽云楊勔中年得異疾每發語腹中

雷丸 九十三

有小聲應之久漸聲大有道士曰此應聲虫但讀本草取不應者治之讀至||不應遂頓服數粒而愈

方　小兒出汗　有熱||四兩粉半斤為末撲之　千金方　寸白虫||水浸去皮切焙為末五更時食炙肉少許以稀粥飲下一錢須上半月服虫乃下　經驗

時珍曰脾經血分藥
杲曰北産者良金華者更勝
鳴皋曰亦入肺益肺又益胃肺主皮毛胃主肌肉故發汗家用以行津液也

果部

大棗

大棗 又名乾棗 別録

甘平 思邈曰甘辛熱 滑杲曰甘温 治心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥 本經 補中益氣堅志强力除煩悶療心下懸除腸澼久服不飢延年 別録 潤心肺止嗽補五臟治虛損除腸胃癖氣和光粉燒治疳痢 大明 小兒患秋痢與蛀棗食之良 孟詵 殺烏頭附子天雄毒 之才 和陰陽調營衛生津液 李杲

大明曰有齒病疳病蟲蠹人不宜食棗小兒尤不宜食又忌與葱同食令人五臟不和與魚同食令人腰腹痛

發明

弘景曰｜｜其皮利肉補虛所以合湯皆之

杲曰｜｜氣味俱厚陽也溫以補不足甘以緩陰血成無己曰邪在營衛者辛甘以解之故用薑棗以和營衛生發脾胃升騰之氣張仲景治奔豚用｜｜滋脾土以平腎氣也治水飲脇痛十棗湯益土而勝水也震亨曰棗屬土而有火味甘性緩甘先入脾補脾者未嘗用甘故令人食甘多者脾必受病也

時珍曰棗為脾之果脾病宜食之謂治病和藥棗為脾經血分藥也若無故頻食則生蟲損齒貽害多矣按王好古云中滿者勿食甘〻令人滿故仲景建中湯心下痞者減餳棗與甘草同例此得用棗之方矣又許叔微云一婦病臟燥悲泣不止祈禱備至予憶古方治此用｜｜湯遂與服盡劑而愈古人識病治方妙絕如此又陳自明云一婦妊娠四五月遇晝則

〔鳴皋曰〕大棗湯治臟燥許叔微亦不言其義余默思其理肝藏魂肺藏魄肝虛不能藏魂則見鬼一婦忽見鬼僧道皆無益余與大劑歸地苓茂遂愈此則無故悲傷而不見鬼魅是肺虛不能藏魄心火又逼金金不能平木故悲傷也大棗甘草益脾肺小麥凉心此其制方之義姑存以質明者〔又曰〕反胃一方不可信斑蝥專走小腸膀胱與腎却與胃大腸無涉用之不能生病反成他禍用治小腸氣却相宜

悸戚悲傷淚下數欠如有所憑醫巫皆無益或言治此須｜｜湯遂一投而愈方見下條又摘元方治此証用紅棗燒存性酒服三錢亦｜｜湯變法也

方 **大棗湯** ｜｜十枚小麥一升甘草二兩每服一兩水煎亦補脾氣

反胃吐食 ｜｜一箇去核斑蝥一箇去頭翅入在肉濕紙包煨熟去蝥空心食之白湯下 方同

小腸氣痛 上用桂心畢澄茄湯下 直指

大便燥塞 ｜｜一枚去核入輕粉半錢煨食棗湯下 直指方

煩悶不眠 ｜｜十四枚葱白七莖水三升煮一升頓服 千金

耳聾鼻塞 不聞聲音香臭者｜｜十五枚去皮核蓖麻子三百粒去皮和搗綿裹塞耳鼻日一度三十餘日即效先塞耳後塞鼻不可並塞 孟詵食療

走馬牙疳 新棗肉一枚同黃柏燒焦為末油和傅之若入砒少許更妙 王氏博濟

諸瘡久壞 不愈者棗肉三升煎水洗之取愈 千金

弘景曰補腎

嗚皋曰一何嘗有鹹味古人俱云鹹温不知何觧

栗

鹹温益氣厚腸胃補腎氣耐飢 別録 生食治腰脚不遂 思邈 療筋骨斷碎腫痛瘀血生嚼塗之有效 蘊茶 栗楔 時珍曰一毬三顆其中扁者栗楔也 治骨風痛 士良 活血尤效 頌曰今衡山合活血丹用之 每日生食七枚破冷痃癖又生嚼罯惡刺出箭頭傅瘰癧腫毒痛 大明

發明 思邈曰一腎之果也腎病宜食之 弘景曰有人患腰脚弱往一樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生噉 宗奭曰一之補腎為其味鹹又滯其氣也 時珍曰有人內寒暴瀉如注食煨一二三十枚頓愈腎主大便一能通腎於此可驗經驗方治腎虛腰脚無力以袋盛生一懸乾每旦吃十餘箇次吃

[宗奭]曰小兒多食發瘡

李東垣曰手足厥陰心包肝經血分藥

[鳴泉]曰丨丨能治血瘀腹脹一小兒腹脹醫攻補俱無效葉天士與丨丨歸尾山甲䗪虫等藥遂愈或問之曰絡瘀則脹吾與通絡也思按治氣分無效者當治血分凡病皆然不獨脹也

果部

猪腎粥助之久必强健蓋風乾之丨勝於日晒仍須細嚼連液吞嚥則有益若頓食至飽反傷脾矣[宗奭]曰小兒不可多食生則難化熟則滯氣膈食生虫[恭曰]小兒多食令齒不生

方 小兒疳瘡 生丨嚼傅之 外台 葦刺入肉 方同上 馬汗入肉成瘡者 方同上 犬咬成瘡 方同上 金刃斧傷 用獨殼大丨研傅之嚼傅亦可 集簡方 衄血不止 大丨七枚刺破連皮燒存性入麝香少許研勻每服二錢水下 聖濟總錄

桃仁 [頌曰]圃人種桃以他木接成者殊失本性入藥當用本生者為佳

苦甘平 [思邈曰]苦甘 辛[詵曰]温 治瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲 本經 止欬逆上氣消心下堅硬除卒暴擊血通月水止心腹痛 別錄 治血結血秘血燥通潤大便破畜血 元素 殺

三虫孟詵　主血滯風痺骨蒸肝瘧寒熱鬼疰疼痛產後
血病時珍
[時珍曰]香附為之使[又曰]行血宜連皮尖生用潤燥
活血宜湯浸去皮尖炒黃用或麩炒或燒存性各隨
本方雙仁者
有毒不可用
發明[杲曰]｜｜苦重于甘氣薄味厚沉而降陰中之
陽手足厥陰血分藥也苦以泄滯血甘以生新
血故破凝血者用之其功有四治熱入血室一也泄
腹中滯血二也除皮膚血熱燥痒三也行皮膚凝滯
之血四也[成無已曰]肝者血之源血聚則肝氣燥肝
苦急急食甘以緩之｜｜之甘以緩肝散血故仲景
抵當湯用之以治傷寒八九日內有畜血發熱如狂
小腹痛滿小便自利者又有當汗失汗熱毒深入吐
血及血結胸煩躁譫語者亦以此
湯主之與䖟虫水蛭大黃同用

[希雍曰]｜｜善破血凡血結血秘血燥瘀
血留血畜血血痛血瘕等症用之立通第
散而不收瀉而無補過用及用不得當能
使血下不止為害非小故凡經閉由于血
枯而不由于瘀滯產後腹痛由于血虛而
不由于留血結塊大便不通由于津液不
足而不由于血燥閉結並忌之
[又]曰同當歸芎藭澤蘭延胡索五靈脂
紅花牛膝生地益母草治產後瘀血并治
壯盛婦人經閉　同當歸麻仁地黃麥冬
芍藥黃芩肉蓯蓉治大腸血燥便結　同

番降香川通草山查山甲乳香没藥紅花
川断當歸治上部内傷瘀血作痛

方　偏風不遂血滯風痺癖疾用||二千七百枚去皮尖双仁以好酒一斗三升浸二十一日取出晒乾研作丸梧子大每服二十丸原酒下　外臺秘要　肝瘧寒熱||一百枚去皮尖研膏不得犯生水入黄丹三錢丸梧子大每服三丸當發日北向温酒下五月五日午時合之忌婦人雞犬見　唐慎微本草　上氣欬急||杏仁各半兩去皮尖炒研水調生麪和丸梧子大每服十丸薑蜜湯下　尸疰鬼疰乃五尸之一又挾鬼邪為祟其病變動有三十六種至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沉沉黙不知所苦而無處不惡累年積月以至於死死後復傳傍人急以||五十枚研泥水煮取四升服之取吐吐不盡三四日再吐　肘後　傳尸鬼氣咳嗽痃癖注氣血氣不通日漸消瘦||一兩去皮尖搗碎水一升半煮汁入米作粥空心食　救急方　鬼疰心痛||一合爛研煎湯服之　同上　卒然心痛||七枚去皮尖研極爛水一

合煎服 千金｜｜煎治婦人産後百病諸
时後 産後百病 氣取｜｜一千二百枚去皮尖双
仁熬搗極細以清酒一斗半研如麥粥納小瓶中麪
封入湯中煮一伏時每服一匙日再服温酒下 圖
經本 男子陰腫 作痒用｜｜炒香為末酒服
草 方寸匕日二仍搗傅 外臺 小兒卵
方同 針刺｜｜灯上燒烟出吹滅安痛
癩上 風虫牙痛 牙上咬之不過五六次愈 衛生
家 脣乾裂 ｜｜研和猪脂 不止者桃核燒
寶 傳之 海上方 崩中漏下 存性研細酒服
方寸匕日 胸滿氣欬｜｜三兩去皮尖以
三 千金 上氣咳嗽 水一升研汁和粳米三合煮粥
食之 ｜｜三升去皮杵着器中密封蒸
心鏡方 卒得咳嗽 熟日乾絹袋盛浸二斗酒中七日
可飲日飲 病人齒無色舌上白喜睡憒〃
四五合 下部虫䘌 不知痛痒處或下痢乃下部生
虫食肛也｜｜十五枚苦酒二 裏急後重
升盎一合煮六合服之 时後 大便不快 ｜｜三兩

凡瘡癤熟透但不破頭畏刀剌針挑者用——研取油煎熟點之即破神效 怋源方

[昂曰]桃為五木之精其枝葉花仁並能辟邪殺鬼

去皮吴萸二兩食鹽一兩同炒熟去鹽萸每嚼——五七粒 總録

急勞咳嗽 煩熱——三兩去皮尖豬肝一枚童便五升同煮乾於木臼內搗爛入蒸餅和丸梧子大每溫水下三十丸 聖惠方

冷勞減食 漸至黑瘦——五百枚吴萸三兩同入銚中微火炒一炊久將——去皮微黃色即漸加火待微烟出即乘熱收入新瓶內厚紙封住勿令洩氣每日空心取——二十粒去皮嚼以溫酒下至重者服五百粒愈 聖惠方

桃花

苦平殺疰惡鬼 本經 除水氣破石淋利大小便下三虫 別録 消腫滿下惡氣 蘇頌 治心腹痛及禿瘡 孟詵 利宿水痰飲積滯治風狂研末傅頭下肥瘡手足瘑瘡 時珍

發明 時珍曰初學記載北齊崔氏以｜｜白雪與兒靧面云令面妍華光悅陶弘景蘊頌乃引服｜｜法不知｜｜性走泄下降利大腸甚快用以治氣實人病水飲腫滿積滯大小便閉塞者則有功無害若久服即耗人陰血損元氣豈能悅澤顏面耶按儒門事親載一婦滑瀉數年百治不效或言此傷飲有積也｜｜落時以棘鍼刺取數十䓲勿犯人手以甆和作餅煨熟食之米飲送下不一二時瀉下如傾六七日行至數百行昏困惟飲涼水而愈觀此則｜｜之峻利可徵矣又蘇鶚杜陽編載一女喪夫發狂閉之室中夜斷窗櫺登桃樹上食｜｜幾盡及旦家人接下遂愈也珍按此亦驚怒傷肝痰挾敗血遂致發狂｜｜利痰飲散滯血故有功與張仲景治積熱發狂用承氣湯畜血發狂用桃仁承氣湯之意相同而陳藏器云｜｜食之患淋何耶

方 大便艱難｜｜為末水服方寸匕即通 千金 產後閉塞大小便不通｜

｜葵子滑石檳榔等分為末　｜｜晒乾為
空心葱白湯服二錢　集驗　**心腹積痛**　末水服二錢
良　孟　**瘧疾不已**｜｜為末酒　｜｜散｜
詵食療　服良　梅師　**痰飲宿水**　｜陰乾為
末酒服一合取利覺虛食少　**腳氣腫痛**｜｜一升為
粥不似轉下藥也　崔行功　末溫酒細呷
一宿即消　**腰脊作痛**｜｜一斗一升麴六升米六升
外臺　釀酒每服一升日三神效　千
金　**乾薑塞腸**脹痛不通｜｜濕者一兩和麪三兩作
方　餛飩空心食之日午腹鳴當下惡物也
聖
惠方

桃葉

苦平除尸虫出瘡中小虫　別錄　治小兒寒熱客忤　大明　療
傷寒時氣風痺無汗治頭風通大小便止霍亂腹痛

〔鴻臯曰〕果是真傷寒一汗便觧如瘟疫熱症服表藥大汗便成壞症以其刼乾胃肺津液也今之庸醫不辦瘟疫傷寒槩與表散且云宣通之法無弊病家亦以為然至死不悟試觀蒸法發汗不過刼其表尚至促壽况服藥發汗刼其裏乎可見發汗之戒從古已然非余之臆說也

時珍

發明〔頌曰〕||蒸汗法張文仲備急方治天行病有支太醫||湯熏法用水二石煮||取七斗安床簀下厚被蓋卧床上乘熱熏之少時當雨汗汗遍去湯速粉之并灸大椎穴則愈又陳廩卯小品方云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法燒地令熱去火以少水洒之布乾||于上厚二三寸安席葉上卧之温覆得大汗被中傳粉極燥便瘥也凡柏葉麥麩蠶沙皆可如此法用有人疲極汗出卧簟受冷但苦寒倦四日凡八發汗汗不出用此法而瘥〔時珍曰〕許叔微本事方云傷寒病醫者須顧表裏循次第昔范雲為梁武帝屬官得時疫熱疾召徐文伯診之是時武帝有九錫之命期在旦夕雲恐不預求速愈文伯曰此甚易但恐二年後不能起坐耳雲曰朝聞道夕死可矣况二年乎文伯乃以火煅地布桃柏葉於上令雲卧之少頃汗出粉之翌日即愈後二年果卒取汗先期尚能促壽况不顧表裏時日便欲速愈

者乎夫丨丨發汗妙法、也猶有此戒可不慎歟

方　二便不通丨丨杵汁半升服冬用榆皮　千金霍亂腹痛丨丨三升切水煮服　外臺方除三尸虫丨丨杵汁服一升　外臺秘要腸痔出虫丨丨一斛杵納小口瓶中坐蒸之有虫自出　肘後女人陰痒如虫咬痒痛者丨丨生搗綿裹塞之日三四易食療方

枝及白皮時珍曰樹皮根皮皆可用根皮尤良取東行者刮去粗皮取白皮用、

苦平除邪鬼中惡腹痛去胃中熱別錄治疰忤心腹痛

解蠱毒辟疫癘黃疸身目如金殺諸瘡虫時珍

方　天行疫癘常以東行桃枝煎湯浴之　類要黃疸如金清明時清晨勿

令婦人雞犬見取東引根細如筋如釵股者一握切細以水一大升煎一小升空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散百日方平復也黃散後可時飲清酒一杯則眼中易散否則散遲忌食熱麪豬魚等物此是徐之才家秘方　初虞世必效

鬼疰心痛　東引桃枝一握去粗皮水一升煎半升頓服　崔氏

蠱毒　東引桃白皮烘乾大戟斑蝥去足翅等分為末以冷水服半方寸匕即出不出更服因酒得酒服食得食服初虞世云此李饒州法也亦可以米泔丸服　蘇頌圖經

下部䘌瘡　桃白皮煮濃汁如稀餳入熊胆少許以綿蘸藥納瘡中　梅師

口瘡成䘌　桃枝煎濃汁含之　類要

婦人經閉　數年不通面色萎黃唇口青白腹內成塊肚上筋起腿脛或腫桃根煎湯主之用桃根牛蒡根馬鞭草根牛膝蓬虆各一斤剉以水三斗煎一斗取汁更以慢火煎如餳收之每熱酒調服一匙　聖惠

〔鳴皐曰〕痘黶發搐一方未見有用者存以
備驗按痘黶發搐係絶症惜未試此方也

〔鳴皐曰〕凡中邪、瘧皆肝病——主之宜
是肝經藥

果部

桃膠〔頌曰〕仙方服膠法取二十斤袋盛入櫟木灰汁
一石中煮三五沸掛高處候乾再煮凡三度晒
乾蜜丸酒服二十
丸久服身輕不老

苦平下石淋破血治中惡疰忤蘓恭 主惡鬼邪氣孟詵 和
血益氣治下痢止痛時珍 〔時珍曰〕采得以桑
灰湯浸過晒乾用

方 石淋作痛——如棗大夏以冷水冬以湯和 血
服日三當下石〻盡則止 錄驗
淋作痛——石膏木通各一錢 產後下痢裏急後重
水煎服 楊氏家藏方 腹痛——
焙炒蒲黃沉香等分為末每 痘黶發搐 黑陷者——
服二錢米飲下 婦人良方 煎湯飲之或
水熬成膏酒化服
之大效 總微論

桃梟 又名桃奴別錄 桃景同上 神桃家寶〔別錄曰〕
桃實着樹經冬不落者正月采之中實者良

〔嗚皋曰〕觀丨丨治腹痛心痛肺氣破伏梁結氣是行氣分主吐血妊娠下血破血是走血分

〔希雍曰〕桃爲五木之精最辟邪丨丨着於樹上最久得氣尤全苦温之性又能通滯散邪其治血之功與桃仁同

〔又曰〕丨丨煅存性同椶灰蒲黄朱砂墨爲末臨卧以童便調服三錢小便解色漸淡爲度治内傷吐血神效　同畨降香辰砂治鬼擊吐血

苦微温有小毒殺百鬼精物本經殺精魅五毒不詳療中悪腹痛別錄〔頌曰〕胡洽治中悪毒氣蠱疰有丨丨湯治肺氣腰痛破血療心痛酒磨暖服大明主吐血諸藥不效燒存性研末米湯調服有驗汪穎治小兒虚汗婦人妊娠下血破伏梁結氣止邪瘧燒烟熏痔燒黑油調傅小兒頭上肥瘡軟癤時珍

方　伏梁結氣在心下不散丨丨三兩爲末空心温酒服二錢　聖恵　鬼瘧丨丨二七枚爲末水丸梧子大朱砂爲衣每服一丸侵晨面東井華水下　聖濟

本草方藥彙要卷六目録

果部

杏仁　烏梅 白梅　橘皮

青皮 橘葉　柿乾 霜 蒂　木瓜

山查　梨　枇杷葉 實

白果　石榴 皮 根 花　胡桃

龍眼　荔枝 核 殼　橄欖 核

榧子　海松子　枳椇子

藕 節　蓮子 薏　蓮鬚

蓮蓬殼　荷葉　芡實

葧臍　慈菇　甘蔗

西瓜 皮 子　甜瓜 子　瓜蒂

菱

穀菜部

粳米 米泔　糯米　飴餹

穀芽　小麥 麥粉　麥芽

秫米　蕎麥　苡仁

黑大豆　大豆黃卷　穭豆

豌豆　刀豆　赤小豆
扁豆花葉　綠豆粉皮　豆豉
脂麻　火麻仁
造釀部
神曲　紅曲　酒
醋
菜部
韭　葱子葉汁鬚　薤
蒜大蒜　胡荽　薑皮 二

乾薑　山藥　百合　山丹

萊菔子　芥子　白芥子　蔓菁　子　根　葉

冬瓜　皮　子　絲瓜

元素曰入手太陰肺經

杲曰肺虛咳嗽者酌用　又曰丨丨紫菀並能解肺鬱利小便

鳴皋曰丨丨亦能吐人一婦病顛癇見鬼神百治不效强余開方余亦無法姑開丨丨一兩以塞責服之竟大吐得愈

希雍曰雷鳴者大腸不和也喉痺者火炎乘金也產乳金瘡指為風寒所乘者言也心寒賁豚者心虛而腎邪凌之也驚癇者痰熱盛也總之取其下氣消痰溫散甘和苦洩潤利之力也

本草方藥參要卷六

如皋戴鳴皋叅著

果部

杏仁

時珍曰雙仁者有毒殺人可毒狗

甘苦溫冷利有小毒（震亨曰性熱因寒者可用）治欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚（本經）驚癇心下煩熱風氣往來時行頭痛解肌消心下急滿痛殺狗毒（別錄）解錫毒（之才）治腹痺不通發汗主溫病脚氣咳嗽欬促入天門冬煎潤心肺和酪作湯潤聲氣（甄權）除肺熱治上焦風燥利胸膈氣逆潤大腸氣秘（元素）殺虫治諸瘡疥

鳴皋曰肺與大腸為表裏一氣相通者也故大腸氣秘宜開通肺氣嘗見一人服大劑承氣湯數帖竟不能通一醫重用杏仁遂達前藥注下吳又可曰肺與大腸譬如硯水壺有二孔按其一孔則涓滴倘不出放開則傾出矣可謂妙喻

希雍曰丨丨溫散肺經風寒滯氣殊效第陰虛咳嗽忌之風寒外邪非壅逆肺分欬急息促者不得用產乳金瘡非風寒擊襲者不得用驚癇喉痺亦非必須之藥用者詳之

賁門胃之上口魄門即肛門

消腫去頭面諸風氣瘡泡 時珍

徐之才曰得火良惡黃芩黃芪葛根畏蘘草思邈曰丨丨作湯如白沫不鮮者食之令氣壅身熱湯經宿者動冷氣弘景曰湯浸去皮尖炒黃或用麩炒時珍曰治風寒肺病藥中有連皮尖用取其發散

發明 元素曰丨丨氣薄味厚濁而沉墜降也陰也入手太陰經其用有三潤肺也消食積也散滯氣也杲曰丨丨散結潤燥除肺中風熱欬嗽丨丨下欬治氣也桃仁療狂治血也俱治大便秘當分氣血晝便難行陽氣也夜便難行陰血也故虛人便秘不可過泄脉浮者屬氣用丨丨陳皮脉沉者屬血用桃仁陳皮手陽明與手太陰為表裏賁門主往來魄門主收閉為氣之通道故並用陳皮佐之好古曰仲景麻黃湯及王朝奉治傷寒氣上欬逆並用丨丨者為其利氣瀉肺解肌也時珍曰丨丨能散能降故解肌散風降氣潤燥消積治傷損藥中用之治瘡殺虫用其毒也按醫餘云凡索麪豆粉近丨丨則爛頃一兵官

鳴臯曰肺病咯血用黃蠟炒||與威喜丸用黃蠟同義說見黃蠟

鳴臯曰卒不小便一方與大腸氣閉開肺同義

食粉成積醫師以積氣丸||相半研為丸熟水下數服而愈

方

萬病丸 治五勞七傷一切諸疾||一斗二升童便煮七次以蜜四兩拌勻再以童便五升於碗內重蒸取出日晒夜露數日任意食之 傳信

補肺丸 治咳嗽||以童便浸之春夏七日秋冬二七日研取汁微火煎如麪糊攤器上晒令可丸茶酒任下 傳信

久患肺氣 喘急欬甚者不過二劑即瘥||二兩童便浸日一換夏日三四換半月後取出焙研每服一棗大薄荷一葉蜜一匙煎服 勝金

欬逆上氣 ||三升去皮尖炒黃研膏入蜜一升杵和含化 千金

肺病咯血 ||四十箇以黃蠟炒黃研入青黛一錢作餅用柿餅一箇破開包藥紙裹煨熟食 丹溪

卒不小便 ||二七枚去皮尖炒黃研米飲下 錄驗

血崩不止 甜||||黃皮炒存性為末每服三錢空心酒下 保壽堂

穀道䘌痛 ||研膏傳 肘後

陰瘡

鳴杲曰痔瘡腫痛用苦｜｜研泥入少麪
為餅貼瘡坐之甚效

好古曰烏梅脾肺二經藥鳴杲曰酸走筋
肝主筋酸為木肝胆為甲乙木亦為肝胆
經藥

希雍曰經云熱傷氣邪客于胸中則氣上
逆而煩滿心為之不安｜｜味酸能斂浮
熱能吸氣歸元故下氣除煩滿安心也

爛痛｜｜燒黑研膏傅之 風虫牙痛｜｜百枚鹽方寸匕煮透取汁頻漱 千金 目
中赤脉痒痛初生杏子取仁一升五銖錢七枚入瓶內蜜封埋門限下百日化為水取點 聖濟
目中努肉漸覆瞳仁｜｜去皮二錢半膩粉半錢研匀點之 同上 針入肉內双仁
｜｜研以車脂調貼自出 瑞竹堂 犬咬傷｜｜嚼爛傳 崔氏 解狂犬毒｜｜研水
和服 千金方 一切食停氣脹滿｜｜三百粒巴豆三十粒同炒色變去巴豆不用研｜｜為
末橘皮湯下 楊氏家藏 諸瘡腫痛杏仁研膏入輕粉麻油調搽神效 鮑氏

烏梅 時珍曰造法取青梅籃盛於突上熏黑若以稻灰淋汁潤濕蒸過則肥澤不蠹
酸溫平濇 杲曰寒 下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯 酸走筋也
不仁去死肌青黑痣蝕惡肉 本經 去痺利筋脉止下痢

〔介賓曰〕和紫蘇煎湯解傷寒時氣瘴瘧大
能作汗
〔昂曰〕治虛勞骨蒸者亦取其酸收
〔又曰〕凡瀉痢瘧嗽失血等症初起皆忌用
〔又曰〕多食損齒傷筋經曰酸走筋々病毋
多食酸
〔鳴皋曰〕多食妨小便不利〔昂曰〕蚘上攻
而眩仆為蚘厥虫得酸則伏故仲景有蚘
厥烏梅丸
〔昂曰〕食梅齒𪘨者嚼胡桃肉即解衣上生
霉點梅子煎湯洗々葛衣最佳
〔鳴皋曰〕烏梅斂肺性大急用宜斟酌〔又曰〕
凡少年人筋與骨相着甚緊故肢體無疼
痛之患老人血不榮筋故筋縱弛不能束
骨肢體所以痛也烏梅之止肢体痛乃縱
弛之痛非受寒濕之痛希雍謂濕氣侵于
經絡之痛誤矣
〔又曰〕烏梅之止瀉痢仍是斂肺之功肺氣
散不能攝大腸故瀉痢不止斂其肺則氣
能攝下故瀉痢止非濇腸也
果部

好噙口乾 別錄 水漬汁飲治傷寒煩熱 弘景 止渴調中去
痰治瘧瘴止吐逆霍亂除冷熱痢 藏器 酸能養陰 治虛勞骨蒸消
酒毒令人得睡和建茶乾薑為丸服止休息痢大驗
大明 斂肺澀腸止久嗽瀉痢反胃噎膈蚘厥吐利消腫
涌痰殺虫解魚毒馬汗毒硫黃毒 時珍
白梅 又名鹽梅霜梅〔時珍曰〕取大青梅鹽汁
漬之日晒夜漬十日成矣久乃生霜
酸鹹平和藥點痣蝕惡肉 弘景 刺在肉中者嚼傅之即
出 孟詵 治刀箭傷止血研爛傅之 大明 乳癰腫毒杵爛貼
之佳 汪頴 除痰 蘇頌 治中風驚癇喉痺痰厥僵仆牙關緊

又曰烏梅之止吐逆有捷效
又曰煮烏梅犯銅器服之惡吐人
希雍曰素問云味過于酸肝氣以津又云酸走筋々病無多食酸以肝主筋性喜升散酸味斂束是違其性也病當發散者咸忌之
鳴皋曰肝喜升散然有肝陰太虛以致肝陽不斂強横克土亦當食酸以斂之佐之以甘所謂甘酸能化陰也故亦治虛勞骨蒸
鳴皋曰凡吐逆由于肝横犯脾胃者多烏梅長于治吐逆是伐木以平土也凡証其為肝胆藥

閉者取梅肉揩牙齦涎出即開又治瀉痢煩渴霍亂吐下下血々崩功同烏梅 時珍 杲曰烏梅白梅俱忌猪肉

發明 弘景曰生梅烏梅白梅功應相似好古曰烏梅脾肺二經血分藥也能收肺氣治燥嗽肺欲收急食酸以收之時珍曰烏梅白梅所主諸病皆取其酸收之義惟仲景治蚘厥烏梅丸及虫䘌方中用之者取虫得酸即止之義稍有不同耳醫說載曾魯公痢血百餘日國醫不能療陳應之用鹽梅肉一枚研爛合臘茶入醋服之一啜而安大丞梁莊肅公亦痢血應之用烏梅胡黃連竈下土等分為末茶調服亦效蓋血得酸則斂得寒則止得苦則濇故也其蝕惡瘡努肉雖是酸收却有物理之妙劉子消鬼方用烏梅肉燒存性研傳惡肉上一夜立盡聖惠用烏梅和蜜作餅貼者其力緩按楊起簡便方云起臂生一疽百日方愈中有惡肉突起如蚕豆大月餘不消醫治不效因閱本草得此方試之一日夜去其大半再

果部

鳴泉曰目生瘀肉｜｜於銅器中煎膏點之

希雍曰烏梅同川連白芍滑石甘草蓮肉白扁豆葛根升麻紅曲橘紅作丸治滯下如神　一味作湯代茶治火炎頭痛

治暑氣霍亂白梅一箇搗爛入絲瓜葉一葉或扁豆葉再搗爛用新汲水調灌即解

上一日而平乃知世有奇方如此

方

諸瘡努肉 見發明

喉痺乳蛾 水梅丸用青梅二十箇鹽十二兩淹五日取梅汁入明礬三兩桔梗白芷防風各二兩猪牙皂角三十條俱為細末拌汁和梅入瓶收之每用一枚噙嚥津液中風痰厥牙關不開用此擦之尤佳

泄痢口渴 烏梅煎湯代茶 扶壽精方

產後痢渴 烏梅二十箇麥冬十二分水煎細呷 必效方

赤痢腹痛 直指用白梅同臘茶蜜水煎飲○聖惠用烏梅肉炒川連各四兩為末蜜丸桐子大米飲下二十丸

便痢膿血 烏梅肉燒存性為末米飲下二錢立效 聖濟

久痢不止 腸垢已出肘後用烏梅肉二十箇水一盞煎服分二服○袖珍方用烏梅白梅各七箇搗爛入乳香末少許丸服茶下

大便下血 烏梅燒存性醋煮米和丸米飲下 濟生方

尿血 方同上

血崩不止 烏梅燒存性七箇米

烏梅 白梅　四

飲下日二服

大便不通 氣奔欲死烏梅十箇取肉湯浸丸如棗大納下部即通 孟詵

霍亂吐利 鹽梅煎水細飲如宜方

蚘虫上行 出于口鼻烏梅煎湯頻飲即安 食鑑本草

水氣滿急 烏梅大棗各三枚水煎入蜜和匀含嚥 聖濟

梅核膈氣 取半青半黃梅子每箇用鹽一兩淹一晝夜晒乾又浸又晒至水盡乃止用清錢三箇夾二梅線縛定入罐內埋地下百日取出每用一箇含嚥汁入喉即消收一年者治一人二年者治二人神妙 龔氏

勞瘧劣弱 烏梅十四箇豆豉二合桃柳枝各一虎口甘草三寸生薑一塊童便煎減半服即止 圖經

久嗽不已 烏梅肉微炒粟殼去筋膜蜜炒等分為末睡時蜜湯下二錢

金瘡 烏梅燒灰存性研調傅一宿即瘥 千金

指頭腫毒 痛甚者梅肉和魚鮓搗妙之妙 李樓奇方

小兒頭瘡 烏梅燒末生油調傅之 聖濟

[杲曰]脾肺二經氣分藥

[昂曰]脾為氣母肺為氣籥凡補藥瀉藥必佐此以利氣

橘皮

又名陳皮 食療 [時珍曰]||下氣消痰其內生痰聚飲表裏之異如此

集解 [時珍曰]||紋細色紅而薄內多筋脈其味辛苦柑皮紋粗色黃而厚內多白膜其味辛甘柚皮最厚而虛紋更粗色黃內多膜無筋其味甘多辛少||性溫柑柚皮性冷今多以柑柚皮雜之柑皮猶可用柚皮則懸絶矣凡||入和中理胃藥則留白入下氣消痰藥則去白去白者以白湯入鹽洗潤透刮去筋膜晒乾用亦有煮焙者

苦辛溫治胸中瘕熱逆氣利水穀久服去臭下氣 本經

下氣止嘔欬治氣衝胸中吐逆霍亂療脾不能消穀止洩除膀胱留熱停水通淋利小便去寸白虫 別錄

清痰涎治上氣咳嗽開胃主氣痢破癥瘕痃癖 甄權

治反

昂曰人身以氣為主氣順則濕除濕除則百病散故丨丨能除濕兼能發表散寒者皮能達皮膚也

又曰大法治痰以健脾順氣為主故潔古云丨丨枳殼利其氣而痰自下

希雍曰瘕者假也如痞滿鬱悶之類鳴皋曰瘕應是癥瘕之瘕作積聚解食物積聚胸中成瘕而作熱丨丨利氣下積則瘕散而熱除

希雍曰脾為運動磨物之臟氣滯則不能消化水穀為吐逆霍亂泄瀉等症丨丨苦溫能燥脾家之濕使滯氣運行諸症自已矣肺為水之上源肺氣舒則津液貫輸氣化運動故膀胱留熱停水五淋皆通也

又曰氣虛氣不歸元者忌與耗氣藥同用胃虛有火嘔吐者忌與溫熱香燥藥同用陰虛咳嗽生痰者不宜與星夏等同用瘧非寒甚亦勿與

鳴皋曰參芪得之可𣸸其滯地黃得之可去其泥大抵丨丨利陽分之氣香附利陰

胃嘈雜時吐清水痰痞痎瘧大腸閉塞婦人乳癰入食料解魚腥毒時珍

發明杲曰丨丨氣薄味厚陽中之陰可升可降為脾肺二經氣分藥留白則補脾胃去白則理肺氣同白朮則補脾胃同甘草則補肺獨用則瀉肺損脾其體輕浮一能導胸中寒邪二破滯氣三益脾胃加青皮減半用之去滯氣推陳致新但久服多用能損元氣也原曰丨丨能散能瀉能溫能補能和化痰治嗽順氣理中調脾胃快膈通五淋療酒病其功當在諸藥之上時珍曰丨丨苦能泄能燥辛能散能溫能和其治百病總是取其理氣燥濕之功同補藥則補同瀉藥則瀉同升藥則升降藥則降脾乃元氣之母肺乃攝氣之籥故丨丨為二經氣分之藥但隨所配而補瀉升降也潔古云陳皮只殼利其氣而痰自下蓋此義也同杏仁治大腸氣閉同桃仁治大腸血閉皆取其通滯也詳見杏仁下按方汋泊宅編云丨丨

分之氣也

希雍曰同人參首烏桂枝當歸薑皮治三日瘧熱少寒多者　同白蔻生薑藿香半夏治胃有寒痰傷冷嘔吐不止　同參朮茯苓甘草山藥白蔻藿香麥芽山查扁豆治脾胃虛飲食不化或不欲食食亦無味　同蘇子貝母枇杷葉麥冬桑皮沙參桔梗五味百部治上氣欬嗽能消痰下氣　同尺殼烏藥檳榔木香草果治氣實人暴氣壅脹　同蒼朮厚朴甘草為平胃散

果部

寬膈降氣消痰飲極有殊功他藥貴新惟此貴陳一人得疾食已即胸滿不下百方不效偶家人合橘紅湯因取嘗之似相宜連日飲之一日忽覺胸中有物墜下大驚目瞪汗出如雨須臾腹痛下數塊如鐵彈子臭不可聞自此胸次廓然頓愈蓋脾之冷積也其方用丨丨一斤去白甘草鹽花各四兩水五椀慢火煮乾焙研為末白湯點服名二賢散治一切痰氣特驗世醫但知半夏南星之屬何足以語此哉珍按二賢散丹溪變之為潤下丸用治痰氣有效惟氣實者服之相宜氣不足者不宜用

方　潤下丸　治濕痰因火泛上停滯胸膈欬唾稠粘丨丨半斤入鹽五錢化水淹過煮乾甘草二兩去皮蜜炙研末蒸餅和丸梧子大每白湯下百丸　丹溪

寬中丸　治脾氣不和冷氣容於中遏而不通是為脹滿丨丨四兩白朮二兩為末酒丸梧子大木香湯下三十丸日三　指迷方

橘皮湯　治傷寒幷一切雜症嘔噦手足厥冷者方用丨丨四兩生薑一兩水煎徐呷　仲景

霍亂

吐瀉　将死但有一點胃氣存者服之再生｜｜去白
五錢真霍香五錢水煎時〻溫服　百一選方
〇一方｜｜神曲生薑等分為末蒸餅丸
加甘草　經年氣嗽　梧子大每服三五十丸食後夜卧
各一服有人患此服之舊患　或心下結硬
膀胱氣皆愈　寇氏衍義　脚氣衝心｜｜一斤杏
仁五兩加蜜搗丸桐子大每　老人氣閟　方同
食前米飲下三十丸　食療　上　風痰麻
木　凡手臂麻木皆是濕痰死血用｜｜一斤逆流水
五碗煮爛去渣再煮一碗頓服取吐不吐加瓜蔕
乃吐痰聖藥　不拘老少孕婦兩服便止｜
也　摘元　脾寒諸瘧　｜去白切生薑自然汁浸過
一指銀器内重湯煮乾焙研每服三錢用隔年　小兒
青州棗十枚水一盞煎半盞發前以棗下之
疳瘦　久服消食和氣長肌肉用｜｜一兩川連以米
泔浸一日一兩研末入射香三分用猪胆盛藥
以漿水煮熟取出以粟米飯和丸綠豆大
每服一二十丸米飲下　錢氏小兒方　産後尿閟

元素曰入厥陰肝少陽膽經　杲曰足厥陰
肝引經藥　震亨曰入肝膽二經氣分
杲曰柴胡疎上焦肝氣青皮疎下焦肝氣
凡瀉氣藥皆能瀉肺
人曰入肝散邪入脾除痰瘧家必用之品
故清脾飲以之為君
果部

不通者｜｜一兩為末每空心服二錢
酒下即通此張不愚方也　婦人良方　產後乳吹｜｜
一兩甘草一錢　乳癰未成者即散已成者即消痛極
水煎服即效　者即不痛神效用真｜｜湯浸
去白晒乾炒微黃為末每服二錢　諸氣呃噫｜｜二
射香調酒下名橘香散　張氏方　兩去白
水一升煎五合頓服或加　卒然失聲｜｜半兩水煎
只殼尤良　孫尚藥方　徐呷　肘後
反胃　真｜｜以日照西壁土炒香為末每服二
錢生薑三片棗一枚水煎減半服　直指　大腸
氣閉血閉　見發明下

青橘皮　時珍曰乃橘之未黃而青者薄而光氣芳烈
今多以小柑小橙偽之不可不辨湯浸去瓤
切片醋拌
炒過用

苦辛溫治氣滯下食破積結及膈氣　蘊頌　破堅癖散滯

青皮　橘葉　七

〔希雍曰〕ㅣㅣ性最酷烈削堅破滯是其所長然誤服損真氣為害非淺凡欲施用必與參朮芍藥等補脾藥同用不可單行也

〔昂曰〕最能發汗者皮能達皮辛能發散也

〔鳴皋曰〕ㅣㅣ發汗不過謂其辛能發散耳

氣去下焦諸濕治左脇肝經積氣元素治胸膈氣逆脇痛幷小腹疝氣消乳腫疏肝胆瀉肺氣時珍

發明〔元素曰〕青皮氣味俱厚沉而降陰也入厥陰少陽經治肝胆之病〔杲曰〕青皮乃足厥陰引經藥能引食入太陰之倉破滯削堅皆治在下之病有滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣〔好古曰〕陳皮治高青皮治低與枳殼治胸膈枳實治心下同意〔震亨曰〕青皮乃肝胆二經氣分藥故人多怒有滯氣脇下有鬱積或小腹疝疼用之以疏通二經行其氣也若二經虛者當先補而後用之又云疏肝氣加青皮炒黑則入血分也〔時珍曰〕青皮古無用者至宋始用之其色青氣烈味苦而辛治之以醋所謂肝欲散急食辛以散之以酸泄之以苦降之也陳皮浮而升入脾肺氣分青皮沉而降入肝胆氣分一體二用物理自然也小兒消積多用青皮最能發汗有汗者不可用說出楊仁齋直指人罕知之〔嘉謨曰〕久瘧熱甚必結癖塊

亦不得與羌防柴同論也然下焦有表裏不通者正可假其辛散之力若羌防輩只能發上焦之汗

希雍曰同人參鱉甲能消瘧母　同只殼川芎肉桂治左脇痛　同人參白朮三稜莪蒁阿魏謷紅山查紅曲木香消痞癖氣塊及一切肉食堅積

昂曰丹溪云乳房屬陽明乳頭屬厥陰乳母或因忿怒鬱悶厚味釀積致厥陰之氣

宜多服清脾湯內有青皮踈利肝邪則瘧自不結也

方

快膈湯　治冷膈氣及酒食後飽滿用青皮一斤作四分四兩鹽浸四兩酒浸四兩白沸湯浸四兩醋浸各三日取出去白切絲以鹽一兩微炒焦每用二錢以茶末五分水煎溫服

理脾快氣　青皮一斤日乾焙研甘草末一兩檀香末半兩和勻服之每用一二錢入鹽少許白湯點服

法製青皮　常服安神調氣消食解酒益胃青皮一斤浸去苦味去瓤鹽花五兩炙草六兩茴香四兩甜水一斗煮之不住攪勿令著底候水盡慢火焙乾勿令焦去甘草茴香只取青皮收用　王氏易簡方

瘧疾寒熱　青皮一兩燒存性研末發前酒服一錢臨時再服　聖惠

傷寒呃逆　聲聞四鄰四花青皮全者研末每服二錢白湯下　醫林集要

産後呃逆　青皮為末葱白童便童便煎二錢服　經驗後方

乳岩　曰久積憂鬱乳房內有核如指大不痛不癢五七年後成癰名

不行故穀不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有其子有滯痰膈熱含乳而睡噓氣致成結核者初起便須忍痛揉軟吮令汁透自可消散治法以青皮疎肝氣石膏清胃熱甘草節行濁血瓜蔞消腫導毒或加橘葉金銀花蒲公英皂刺當歸佐以少酒若於腫處灸三五壯尤捷久則凹陷名乳岩不可治矣

〔時珍曰〕橘核入足厥陰 肝經

〔希雍曰〕橘核味苦温而下氣所以能入腎與膀胱除因寒所生之病也

〔震亨曰〕厥陰 肝經 行經藥

曰乳岩不可治也用青皮四錢水煎徐徐服之日一服或酒服亦可 丹溪

橘核

香去殼取仁研碎入藥〔時珍曰〕用時以新瓦焙

苦平治腎疰腰痛膀胱氣痛腎冷炒研温酒服一錢或酒煎服 大明

小腸疝氣陰核腫痛炒研五錢老酒煎服或酒丸服甚效 時珍

發明

〔時珍曰〕｜｜入足厥陰與青皮同功故治腰痛㿗疝在下之病和劑局方治諸疝痛及內㿗卵腫偏墜或硬如石或腫至潰有｜｜丸用之有效品味頗多詳見本方

方

腰痛｜｜杜仲各二兩炒研末每服二錢鹽酒下 簡便方

橘葉

希雍曰橘葉古今方書不載能散陽明胃厥陰滯氣婦人妬乳內外吹乳乳癌乳岩用之皆效以諸症皆二經所生之病也

時珍曰脾肺血分之果鴻暴曰固大腸

吊曰肺與大腸相表裏臟清則腑熱亦除故能治腸風臟毒痔漏等症

鴻暴曰柿霜之生痰實甚象最喜食之故知其生痰渴甜故也大約少用入藥則甘能益肺胃之陰逆嗽則惟有動痰何能化痰

柿俗字本作柹作柹亦俗字

苦平導胸膈逆氣入厥陰行肝氣消腫散毒乳癌脇痛用之行經 震亨

方 肺癰 綠丨丨洗搗絞汁一盞服之吐出膿血即愈 經驗良方

柿乾

甘平濇補虛消腹中宿血濇中厚腸健脾胃氣 詵 開胃濇腸消痰止渴治吐血潤心肺治肺痿心熱咳嗽潤聲喉殺虫 大明 治反胃咯血血淋腸澼痔漏下血 時珍

柿霜清上焦心肺熱生津止渴化痰寧嗽治咽喉口舌瘡痛 時珍

鳴皋曰柿餅甘能益胃陰性能降氣大凡反胃多因肝陽上沖胃陰大虧胃家津液愈吐愈涸食入不能滑下故復嘔出也柿餅甘以益其津液降以安其逆氣故主之若同青黛用更妙

發明 時珍曰丨丨乃脾肺血分之果也其味甘而氣平性濇而能收故有健脾澀腸治嗽止血之功蓋大腸者肺之合而胃之子也真正柿霜乃其精液入肺病上焦藥尤佳按方汋泊宅編云一人病臟毒下血凡半月自分必死得一方只以丨丨燒灰飲服二錢遂愈又王璆百一方云一人病下血十年亦用此方一服而愈為散丸皆可與本草治腸澼消宿血解熱毒之義相合則柿為太陰血分之藥益可徵矣又經驗方云有人三世死於反胃至孫得一方用乾柿餅同飯日日食之絕不用水飲遂愈此又一徵也宗奭曰生柿同蟹食令人腹痛作瀉 時珍曰一人食蟹多食紅柿入夜大吐繼之以血昏不知人或云惟木香可解磨汁灌之即愈

方 腸風臟毒 方說見上 小便血淋 葉氏燒丨丨為末米湯下○經驗丨丨鹽花烏豆煎湯入墨汁服之 小兒秋痢 丨丨入粳米煮粥食 食療 反胃吐食 丨丨

鳴皋曰觀產後欬逆一方則柿餅亦治欬逆與柿蒂同也

鳴皋曰欬逆大約因痰阻氣逆者多當用橘皮青皮旋覆花等藥獲效甚夥症當用溫補者頗少

鳴皋曰一下人呃逆半載余用代赭旋覆湯爲之降痰鎮逆而愈兒子錫爵幼時呃逆竟日不止及晡熙更甚呃逆一聲手足抽動床帳皆搖余濃煎橘皮湯服之而愈此皆痰阻氣逆者也又見一老人因病後

果部

三枚連蒂打糊酒服甚效勿以他藥雜之 同上

痰嗽帶血 ｜｜飯上蒸熟破開入真青黛一錢臥時食之薄荷湯下 丹溪

產後欬逆 氣亂心煩｜｜煎湯飲 產寶

臁瘡不

合 柿霜柿蒂等分燒研傅甚效 筆峰雜興

柿蒂

濇平 治欬逆噦氣煮汁服 詵

發明 丹溪曰人之陰氣依胃爲養土傷則木挾相火直冲清道而上作欬逆古人以爲胃寒既用丁香｜｜不知其孰爲補虛孰爲降火不能清氣利痰惟有助火而已時珍曰欬逆者氣自臍下冲脈直上至咽膈作呃忒蹇逆之聲也朱肱南陽書以噦爲欬逆王履泝洄集以欬嗽爲欬逆皆誤矣噦者乾嘔有聲也欬逆有傷寒吐下後及久病產後老人虛人陰氣大虧陽氣暴逆自下焦逆至上焦而不能出者有

木瓜 十

呃逆半月不止一醫用參芪補劑而愈此
即丹溪所云土傷則木挾相火直冲清道
而上者也愚謂無論祛痰補中總當以降
氣為主其偏熱偏寒之症却不多見果遇
其症當審諦明確乃可用偏熱偏寒之藥
鳴皋曰偏熱偏寒之症｜｜俱可加用

杲曰入手足太陰肺脾血分 宗奭曰酸能
入肝 時珍曰｜｜脾胃藥
鼎曰脾主四支或寒濕傷於足絡或胃受
濕熱之物上輸於脾下流至足則成脚氣
惡寒發熱狀類傷寒第脛腫掣痛為異耳
宜利濕清熱忌用補劑以淋洗

傷寒失下及平人痰氣逆抑使然者當視其虛實陰陽或温或補或泄熱或降氣或吐或下可也古方單用｜｜煮汁飲取其苦温能降逆氣也濟生｜｜散加以丁香生薑之辛熱以開痰散鬱盖從治之法而昔人亦常用之收效矣潔古又益以人參治病後虛人欬逆亦有功丹溪但執以寒治熱之理而不及從治之法矯枉之過矣若陳氏三因又加以良薑之類是真以為胃寒而助其邪火者也

方 欬逆不止 濟生｜｜散 欬逆胸滿用｜｜丁香各二錢生薑五片水煎服或為散點服○潔古加人參一錢治虛人欬逆○衛生寶鑑加青皮陳皮○王氏易簡加半夏生薑

木瓜 又名楙音茂爾雅

酸温 思邈曰酸 鹹濇温 治濕痹脚氣霍亂大吐下轉筋不止

別録 治脚氣冲心取嫩者一顆去子煎服佳强筋骨下

「昂曰」酸則斂〻則化故能消食與山查同
酸能生津故止渴香薷飲用之取其能和
脾去濕
「鄭奠一曰」丨丨酸收之品世用治水腫誤
矣一人買丨丨數百置舟中舉舟皆病溺
不得出醫用通利藥不效予曰但去丨丨
則溺出矣果然
「嗎皋曰」強筋骨者能斂縱弛之筋與烏梅
同說見烏梅
「嗎皋曰」古人多用丨丨治水腫蓋水腫原
于脾濕脾濕則氣渙散酸以斂之則氣聚
而脾健脾健則腫消矣奠一疑水腫不宜
用酸收似亦不然古人既舉其功必有所
試矣
「希雍曰」丨丨酸能斂濡滿之濕
昂曰夏月暑熱濕邪傷脾胃陽不升陰不
降則霍亂吐瀉

冷氣止嘔逆心膈痰唾消食止水利後渴不止飲
服之藏器止吐瀉奔豚消水腫冷熱痢心腹痛大明調營
衛助穀氣雷斅去濕和胃滋脾益肺治腹脹善噫心下
煩痞好古
「斅曰」勿犯鉄器

發明

「杲曰」丨丨入手足太陰血分氣脫能收氣滯能
和「弘景曰」丨丨最治轉筋如轉筋時呼其名及
書土作丨丨字皆愈此理亦不可解「宗奭曰」丨丨得
木之正酸能入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力皆
不可缺也人以鉛霜塗之則失酢味且無渣蓋受金
之制也「時珍曰」丨丨所主霍亂吐利轉筋脚氣皆脾
胃病非肝病也肝雖主筋而轉筋則由濕熱寒濕之
邪襲傷脾胃所致故筋轉必起於足腓〻及宗筋皆
屬陽明丨丨治轉筋非益筋也理脾而伐肝也土病
則金衰而木盛故用酸溫以收脾肺之耗散而藉其

鳴皋曰今人瘀閉者自係多用所致

希雍曰得白扁豆藿香茯苓橘皮白梅人參白术甘草砂仁香薷治傷暑霍亂吐瀉不止同當歸石斛牛膝川斷芎藥橘皮治血虛轉筋　同薏仁白术茯苓五加皮石斛川萆薢黃柏治濕熱脚氣　同人參茯苓麥冬藿香白蔻竹茹枇杷葉治胃虛嘔吐丨丨一味為末白湯吞三錢日五服治楊梅結毒有效

走筋以平肝邪乃土中瀉木以助金也木平則土得令而金受蔭矣素問云酸走筋筋病毋多食酸孟詵云多食丨丨損齒及骨皆伐肝之明驗而丨丨入手足太陰為脾肺藥非肝藥益可徵矣又針經云多食酸令人癃閉酸入于胃其氣濇以收兩焦之氣不能出入流入胃中下去膀胱胞薄而軟得酸則縮卷約而不通故水道不利而癃濇也羅天益寶鑑云太保劉仲海日食蜜煎丨丨三五枚同伴數人皆病淋以問天益天益曰此食酸所致也但奪食則已

方　項強筋急　不可轉側肝腎二臟受風也用丨丨一箇去核入沒藥二兩乳香二錢半羨好縛定飯上蒸爛研膏每用三錢入生地汁半盞無灰酒化溫服○許叔微云有人患此自午後發日暮時定予曰此必先從足起少陰之筋自足至項筋者肝之合今日中至黃昏陽中之陰肺也自離至兌陰弱陽旺之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受邪故發於此時余授此方及都梁

丸服之而愈　本事方

脚氣腫急　｜｜切囊盛踏之一人患脚氣腫痛因附舟以足閣一袋上漸不痛問之乃｜｜也及歸製囊盛｜｜踏之遂愈　名醫録

小兒洞痢　｜｜搗汁服　千金

霍亂轉筋　｜｜一兩酒煎服不飲酒者湯煮服仍煎湯浸青布裹腿　聖惠

霍亂腹痛　｜｜五錢桒葉三片棗一枚煎服　同上方

四蒸木瓜丸　治肝腎三經氣虛為風寒暑濕相搏流注經絡凡遇氣化更變七情不和必致發動或腫滿或頑痹憎寒壯熱嘔吐自汗用宣｜｜四箇切蓋挖空一箇入黃茋川斷末各半兩一箇入烏藥茯神心木末各半兩一箇入蒼术橘皮末各半兩一箇入威靈仙苦葶藶子末各半兩以原蓋蓋定酒浸透蒸晒三浸三蒸三晒搗末以榆皮末水和丸梧子大每服五十丸酒鹽湯任下　御藥院方

反花痔瘡　｜｜為末以鱓魚身上涎調貼紙護住　醫林集要

山查

[希雍曰]入足陽明太陰胃脾二經
[嗚皋曰]兼入肝經血分

[昂曰]丨丨消油膩腥羶之積與麥芽消穀積者不同[又曰]凡服人參不宜者服丨丨即解較勝於萊菔子

[嗚皋曰]目生瘀肉厚錢許山查於銅器內熬膏點之俟瘀肉退去七八分再以烏梅膏點之丨丨膏似峻利於烏梅膏

[希雍曰]脾胃有積滯則成下痢産後惡露不盡畜於太陰部分則為兒枕痛丨丨能入脾胃消積滯散宿血故治水痢及産婦痛塊也[又曰]如脾胃虛有積滯者當與補藥兼行

[嗚皋曰]凡腰膝痛多由筋鬆不能束骨所致丨丨味酸亦能斂筋故治腰痛

[嗚皋曰]丨丨煎汁色嫣紅凡色紅者皆入

[嗚皋曰]樝俗訛為查作山查仍俗也

山查

又名山樝音渣唐本 赤爪子同上 鼠樝同上 猴樝危氏 枕子音求郭璞 羊梂唐本 棠梂子圖經 山裏果食鑑 [時珍曰]赤爪當是赤棗之訛

酸冷[時珍曰]甘酸微溫 煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡痒唐本 煮汁洗漆瘡多瘥弘景 治腰痛有效蘇頌 消食積補脾治小腸疝氣發小兒瘡疹吳瑞 健脾行結氣治婦人産後兒枕痛惡露不盡煎汁入沙糖服之立效震亨 化飲食消肉積癥瘕痰飲痞滿吞酸滯血痛脹時珍 化血塊氣塊活血寗原

發明[震亨曰]丨丨大能尅化飲食若胃中無食積脾虛不能運化不思食者多服則反伐脾胃生發

之氣〔時珍曰〕凡脾弱食物不尅化胸腹酸刺脹悶者每食後嚼二三枚絶佳但不可多用恐反尅伐也凡煮老雞硬肉入｜｜數枚則易爛則其消肉積之功可知矣余鄰家一小兒因食積成黄腫腹脹如鼓偶往羊朹樹下取食之至飽歸大吐痰水遂愈羊朹乃山樝同類醫家不用而有此效則其功應相同矣

方　偏墜疝氣　｜｜肉茴香炒各一兩為末糊丸梧子大每服百丸空心白湯下　衛生易簡

老人腰痛　及腿痛用｜｜鹿茸炙等分為末丸梧子大每服百丸日二服

腸風下血　用寒藥熱藥及脾胃藥俱不效者獨用｜｜乾者為末艾湯調下應手而愈　百一

痘疹不快　乾｜｜為末湯點服之立出紅活　危氏

痘疹黑陷　危困者｜｜肉為末紫草煎酒調服一錢　全幼心鑑

梨

山查核　化食磨積治癩疝　時珍

十三

鳴皋曰丨寒能清肺火甘能益胃陰二經邪熱必用之

鳴皋曰王尚書鼎在翰林時病熱症自以為傷寒服薑附遂牙關緊閉角弓反張友人鹿君治之以梨裴灌之用梨數百乃愈周公履謙亦病熱症醫與肉桂服數劑遂舌焦口乾神昏如寐不能言動不大便異棺以侍矣余以生地數斤搗汁灌之盡劑目漸動知索水余憶鹿君言令以梨汁與

梨

甘微酸寒治熱嗽止渴切片貼湯火傷止痛不爛（蘇恭）治客熱中風不語治傷寒熱發解丹石熱毒驚邪利大小便（開寶）除賊風止心煩氣喘熱狂作漿吐風痰（大明）卒暗風不語者生搗汁服胸中痞塞熱結者宜多食之（孟詵）潤肺涼心消痰降火解瘡毒酒毒（時珍）

發明　時珍曰古人于丨多言其害陶隱居言丨不入藥蓋古人論病多主風寒用藥多是桂附故不知丨有治風熱潤肺涼心消痰降火解毒之功也今人痰病火病十居六七丨之有益不為少但不宜過耳按類編云一士人狀若有疾厭厭無聊往謁楊吉老診之曰熱證已極氣血消鑠三年當以疽死不可

之日飲十餘盞漸知索梨食乃與以甘寒之藥十餘劑而復生計食梨亦百數也「昂」曰搗汁用熬膏用並良加薑汁蜂蜜能清痰止嗽惟脾虛泄瀉者忌之〔鳴泉曰〕凡瘟疫熱症內邪燔其燎乾胃液津液則死矣且傷寒無汗瘟疫有汗膚腎液汗之遂至津液隨汗走液液愈枯火愈燔雖再與承氣不能下也｜最宜於熱症以其寒能抑邪解毒甘能益胃陰而保津液也古法用大黃謂急下以救陰然大黃雖祛邪其健終傷胃陰非病大勢急不輕用の〔又曰〕熱症而腸不固者｜亦不宜恐成旁流

「又曰」生食瀉胃熱而清肺熬膏則甘能益胃而補肺惟有滑腸之弊用者防之

「希雍」曰入手太陰肺足陽明胃經

「希雍曰」經曰諸逆上衝皆屬火火氣上炎則為卒啘不止啘音噦也其聲濁惡而長

為也士人不樂而去聞茅山有道士醫術通神乃衣僕衣詣之願執薪水之役久之以實白道士診之笑曰汝但日食好梨一箇如生梨已盡取乾者泡湯食滓飲汁疾自平士人如其教一歲復見吉老吉老曰君心遇異人士人備告吉老吉老乃望茅山拜自咎其學之未精此觀此則｜之功豈小補哉

方 **消渴** ｜汁熬膏水化服 普濟 **卒得欬嗽** ｜搗汁一椀入椒四十九粒煎一沸服 崔元亮海上方 **中風失音** ｜搗汁一盞飲日二 食療 **小兒心臟**風熱昏躁悶搗｜汁入粳米煮粥食 聖惠 **反胃吐食** ｜汁一椀丁香十五粒煎服 **赤目腫痛** ｜汁一鍾川連末半兩輕粉一字和勻汁中點之 聖惠方

枇杷葉

苦平〔權曰〕甘微辛 **治卒啘不止下氣煮汁服** 別錄 **治嘔噦不**

經曰樹枯者葉落病深者聲噦病者見此
為危證｜｜｜善下氣〻下則火不上升
而胃安故卒𠲿止也其治產後口乾及消
渴欬嗽氣急脚氣上衝皆取其下氣之功
又佐以補陰之藥治婦人發熱欬嗽經事
先期

昂曰氣有餘便是火〻則生痰氣順則火
降火降則痰消

止婦人產後口乾大明煮汁飲主渴疾治肺氣熱嗽及
肺風瘡胷面上瘡孟詵和胃降氣清熱解暑毒療脚氣

時
珍

【恭曰】拭去毛不爾射人肺令嗽不已【斅曰】濕葉重一
兩乾者三葉重一兩乃為氣足每兩以酥二錢半塗
炙用【時珍曰】治胃病以薑汁塗
炙治肺病以蜜塗炙用乃良

發明【時珍曰】｜｜｜氣薄味厚陽中之陰治肺胃之
病大都取其下氣之功耳氣下則火降而痰順
火降痰順則逆者不逆嘔者不嘔渴者不渴欬者不
欬矣【宗奭曰】治肺熱嗽甚有功一婦人患肺熱久嗽
身熱火炙肌瘦將成癆以｜｜｜木通款冬花紫菀
杏仁桑白皮各等分大黃減半如常治訖為末蜜丸
櫻桃大食後夜卧各含
化一丸未終劑而愈

希雍曰得生地麥冬白芍杞子桑皮童便茅根天冬茄子五味栝樓根治陰虛咳嗽吐血　同竹茹木瓜蘆根石斛麥冬人參茯苓治胃熱嘔吐加童便人乳竹瀝蔗汁白芍蔗漿治噎膈　同人參白芍茯苓竹茹橘紅蘇子麥冬木瓜治妊娠惡阻

時珍曰入肺經

鳴皋曰||入肺而收斂肺氣當云固氣不當云益氣也惟其固氣故多食壅氣肺

方　卒咜不止　煮汁服　別錄　溫病發噦　|因飲水多者||　|去毛炙茅根各一

用半斤水四升煎二升稍稍飲之　龐安常

反胃嘔逆　|||丁香各一兩人參二兩每服三錢水一盞薑三片煎服　聖惠

衄血不止　|||炙研末茶服一二錢佳　同上方

面上風瘡　|||梔子各等分為末溫酒下二錢日三　本事

實　甘酸平止渴下氣利肺氣止吐逆主上焦熱潤五臟　大明

詵曰實溫多食發痰熱傷脾　同炙肉及熱麪食令人患熱黃疾

白果　又名銀杏　日用鴨腳子

核仁　甘平苦濇　時珍曰熟食微甘小苦性溫有小毒　生食降痰解酒

為水之上源肺氣暢則水道長｜｜之縮
小便有速效為能固濇肺氣也
又曰賽神出會有辦抬閣者用童男女縛
于抬閣之上從早至晚恐其小便但與白
果食之便不小便
又曰腎為肺之子肺氣固則能攝腎氣故
止白濁

熟食益人 李廷飛 熟食溫肺益氣定欬嗽縮小便止白濁生食降痰消毒殺虫嚼漿塗鼻面手足去皶皰䵟𪒠皺皴及疥癬疳䘌陰虱 時珍 多食壅氣動風小兒多食昏霍發驚引疳同鰻鱺食患軟風 吳瑞

發明 時珍曰銀杏宋初始著名近時方藥亦時用之其氣薄味厚性濇而收色白屬金故能入肺經益肺氣定欬嗽縮小便生擣能浣油膩則其去痰濁之功可類推矣其花夜開人不得見蓋陰毒之物故又能殺虫消毒然食多則收令太過令人氣壅臚脹昏頓三元延壽書言｜｜食滿千箇者死又云有飢者同以｜｜代飯飽食次日皆死也

方 寒嗽痰欬｜｜七枚煨熟以熟艾作七丸每果入艾一丸濕紙包再煨香去艾吃之

〔鳴皋曰〕｜｜定歉湯與麻黃蘇子款冬並用一收一散一降最得製方之妙又佐以半夏桑皮之去痰水杏仁之利氣黃芩之降火故效也

〔鳴皋曰〕肺氣耗散之哮歉可用肺氣壅實之哮歉用之宜慎

必效方

哮歉痰嗽 鴨掌散｜｜一箇麻黃二錢半炙草二錢水煎臥時服○又金陵一人治哮歉｜｜定歉湯服之無不效遂以起家其方用｜｜二十一枚炒黃麻黃三錢蘇子二錢款冬花法製半夏蜜炙桑皮各二錢杏仁黃芩微炒各一錢半甘草一錢水三鍾煎二鍾分二服 並攝生方

欵嗽失音 ｜｜四兩茯苓桑白皮二兩烏豆半升沙蜜半斤煮熟日乾為末以乳汁半椀拌濕九蒸九晒丸綠豆大每服五十九神效 余居士方

小便頻數 ｜｜十四枚半生半煨食之取效

小便白濁 生｜｜十枚搗水飲之

赤白帶下 下元虛憊｜｜蓮肉江米各五錢胡椒一錢半為末烏骨雞一隻去腸入藥煮爛食之 集簡

腸風下血 ｜｜煨熟出火食之

頭面癬瘡 生｜｜研塗之 邵氏

下部疳瘡 同上方 趙氏

陰毛生虱 痒不可忍｜｜嚼塗之 劉長春方

乳癰潰爛 ｜｜半斤以四兩研酒服以四兩研塗 救急良方

白果　石榴

嗚泉曰痢疾腹痛腸胃有滯也當用通法不待再用濇劑用治久痢久泄則有理

腸風臟毒｜｜四十九枚去殼生研入百藥煎末和丸彈子大每服二三丸空心細嚼米飲送下 治證要訣

石榴 又名安石榴別錄若榴廣雅丹若古今註金罌

時珍曰博物志漢張騫出使西域得安石國榴種以歸故名安石榴筆衡云五代吳越王錢鏐改榴為金罌

集解 頌曰有甘酸二種甘者可食酸者入藥 宗奭曰酸｜｜入藥収留陳久者佳

酸温濇治赤白痢腹痛連子搗汁頓服一枚 孟詵 止瀉痢崩中帶下 時珍

發明 時珍曰｜｜其味甘酸其氣温濇具木火之象故多食損肺齒而生痰涎酸者則兼収斂之氣故入斷下崩中之藥或云白榴皮治白痢紅榴皮治紅痢亦通

鳴臯曰向欣齋醫道好嘗語予曰|||浸水則黑黑腎之色故大能補腎不知此言何所據茲閱本草甄權治筋骨腰脚之說或補腎之功歟

昂曰瀉痢至於脫肛者石榴皮以陳壁土炒加明礬少許煎濃熏洗再以五倍子炒研敷托而上之

方 腸滑久痢 黑神散酸|||一箇煆烟盡出火毒一夜研仍以酸|||一塊煎湯服神效 久瀉不止 方同並普濟

石榴皮

酸澁止下痢漏精 別錄 治筋骨風腰脚不遂行步攣急疼痛澀腸取汁點目止淚下 權 煎服下蛔虫 藏器 止瀉痢下血脫肛崩帶 時珍

方 久痢 |||燒存性為末米飲下方寸匕 时後○寒滑者加附子赤石脂 小兒風癇 石榴一枚去頂挖空入全蝎五枚黃泥包煆存性為末防風湯下半錢 聖濟 脚肚生瘡 初起如粟搔之漸開黃水浸淫痒痛潰爛遂至繞脛用酸|||煎湯日日掃之取愈 醫學正宗

昂曰客生新聞云一人患腹脹一醫診之曰飲食如常非水腫蠱脹乃濕熱生虫之象也以｜｜｜｜皮椿東引根皮檳榔各五錢空心服腹大痛瀉出長尺餘遂愈

嗚皋曰觀經附一方並石榴根亦能破瘀行血歟觀東垣赤石脂云胎胞不下非澁劑可以下之又云固腸胃有收澁之能下胎胞無推蕩之峻夫石脂澁劑也而能下胎胞則榴皮之通經或此理歟故存此方以俟試驗

久瀉久痢 陳｜｜｜焙研細末每服二錢米飲下有患二三年百治不效者服之神效 普濟

石榴東行根

治蚘虫寸白 別錄 治口齒病 頌 止瀉痢崩帶功與皮同 時珍

方 金蚕蠱毒 吮礬味甘嚼黑豆不腥者即是中蠱也｜｜｜｜皮煎濃汁服即吐出活蠱無不愈者 見朱丹溪摘元方

寸白蚘虫 ｜｜｜｜一握洗剉水三升煎半盞五更溫服盡至明取下虫一大團遂愈食粥補之。崔元亮海上方用榴皮煎水煮粥食亦良

女子經閉 酸｜｜｜｜｜一握炙乾水煎濃空心服之未通再服 斗門方

赤白久痢 方同上

石榴花

[時珍曰]||命門三焦藥[昂曰]補腎
[昂曰]||皮斂肺定嗽固腎濇精若用之得當勝於金櫻蓮須也
[又曰]||肉多服亦動風痰助腎火有痰火積熱者少服[又曰]連皮同燒酒嚼三枚
果部

陰乾為末和鉄丹服一年能變白髮如漆 藏器○鉄丹鉄粉之屬
千葉者治心熱吐血研末吹鼻止衄立效傅金瘡出血 蘓頌
方 金瘡出血|||半斤石灰一升搗和陰乾 每用少許傅之立止 崔元亮
鼻衄|||二錢半黃蜀葵花一錢 為末水煎服效乃止 聖濟
九竅出血||| 揉塞之 葉亦可
胡桃 又名核桃
仁 甘溫 熱 [頌曰]食之令人肥健潤肌黑鬚髮利小便去五痔燒存性和松脂研傅瘰癧瘡 開寶 令人能食通

能久戰

〔鳴皋曰〕嘗見一人患腹瀉參朮無靈將死醫令服青娥丸而愈兩月以後健而且肥

先大司馬體氣素偏於陽因暑月遠行患痢計月餘亦未服藥痢止而大虧患瀉瀉皋進青娥丸五服而全愈 大司馬仍服不輟諫不聽半月後得頭眩疾撤藥始愈

〔潤血脉〕孟詵 治傷損石淋同破故紙蜜丸服補下焦 頌 補氣養血潤燥化痰益命門利三焦溫肺潤腸治虛寒喘嗽腰脚重痛心腹疝痛血痢腸風散腫毒發痘瘡 時珍 制銅毒 時珍 油胡桃殺虫攻毒治癰腫癘風癬楊梅白禿諸瘡 時珍

〔發明〕〔韓懋曰〕破故紙屬火能使心包與命門之火相通｜｜｜屬水主潤血養血〻屬陰〻惡燥故油以潤之佐故紙有木火相生之妙故古有云黃柏無知母破故紙無｜｜猶水母之無蝦也〔時珍曰〕三焦者元氣之別使命門者三焦之本原蓋一原一委也命門指所居之府而名爲藏精繫胞之物三焦指分治之部而名爲出納腐熟之司蓋一以体名一以用名其体非脂非肉白膜裹之在七節之旁兩腎之

間二系著脊下通二腎上通心肺貫屬於腦為生命之原相火之主精氣之府人物皆有之生人生物皆由此出靈樞本臟論已著其厚薄緩結之狀而扁鵲難經不知原委體用之分以右腎為命門謂三焦有名無狀而高陽生偽撰脉訣承其謬說以誤後人至朱肱南陽活人書陳言三因方論戴起宗脉訣刊誤始著說闢之而知之者尚少｜｜仁頗顯其狀而外皮水汁皆青黑故能入北方通命門利三焦益氣養血與破故紙同為補下焦腎命之藥夫命門氣與腎通藏精血而惡燥若腎命不燥精血內充則飲食自健肌膚光澤腸腑潤而血脉通此｜｜佐補藥有令人肥健能食潤肌黑髮固精治燥調血之功也命門既通則三焦利故上通於肺而虛寒咳嗽者宜之下通於腎而腰脚虛痛者宜之內而心腹諸痛可止外而瘡腫之毒可散矣夷堅志止言｜｜治痰嗽能斂肺蓋不知其為命門三焦藥也洪邁云邁有痰疾因晚對上諭令以｜｜肉三枚生薑三片卧時嚼服即飲湯兩三呷又嚼桃薑如前數即靜卧必愈邁如言

十九 胡桃

新羅銅鮮地

服之及旦而痰消嗽止又溧陽洪氏幼子病痰嗽凡五晝夜不乳食醫以危告其妻夢神授方令服人參｜｜湯遂取新羅人參寸許｜｜｜兩一枚煎湯一蜆殼灌之嗽即定明日以湯剝去｜｜｜皮用之嗽復作仍連皮用信宿而瘳蓋人參定嗽｜｜連皮能斂肺也油｜｜有毒傷人咽肺外科取之用其毒也｜｜制銅此又物理之不可解者

方 青娥丸 見破故紙下 胡桃丸 益血補髓強筋壯骨延年明目能除百病｜｜仁四兩搗膏故紙杜仲萆薢各四兩為末丸梧子大酒鹽湯任下五十丸 御藥院方 老人欬嗽 氣促睡臥不得服此立定｜｜肉帶皮杏仁去皮尖生薑各一兩搗研入蜜少許為丸彈子大臥時嚼下 血崩不止｜｜肉五十枚灯上燒存性研作一服空心溫酒調下神效 普濟方 石淋痛楚 尿中有石子者｜｜｜兩一升細米煮漿粥一升相和頓服即瘥 崔元亮海上方中載

寯皋曰便毒初起一方繆仲淳云與山甲
全蝎同服更妙皋嘗見一賤僕患便毒用
胡桃連殼夾全蝎燒存性服即愈乃知散
腫毒之文非誣也

急心痛 ||肉一枚大棗一箇去核夾||紙裹煨
熟生薑湯一鍾細嚼送下永久不發名義落
湯 趙
便毒初起 儒門事親用||七箇燒存性研
氏經驗 酒服不過三服效○楊氏經驗用
||三箇夾銅錢 未成膿者||十箇煨
一箇食之即愈 **一切癰腫** 熟去殼槐花一兩研末
杵勻熱酒調服 ||一箇平破取仁嚼爛
古今錄驗 **疔瘡惡腫** 安敷內合在瘡上頻換取
效 **痘瘡倒陷** ||一箇燒存性乾胭脂半錢研勻
普濟 胡荽煎酒下 此方見儒門事親
消腎溢精 ||丸治消腎病因房慾無節及服丹石
或失志傷腎遂致水弱火強口舌乾精自
溢出或小便赤黃大便燥實或大小便大利而不甚
渴用||肉白茯苓各四兩附子一枚去皮切片薑
汁蛤粉同焙為末蜜丸桐子大
每服三十丸米飲下 普濟方 **風寒無汗** 發熱頭痛 ||肉葱
白細茶生薑等分搗爛水煎
熱服覆衣取汗 談埜翁方

龍眼

帝曰——心脾二經之果

帝曰——養心葆血心為脾母故歸脾湯用之亦治腸風下血又曰心生血脾統血思慮過多則心脾傷而血耗致有健忘怔忡驚悸諸症歸脾湯能引血歸脾而生補之腸風亦由血不歸脾而妄行

龍眼 又名龍目 吳普 益智 別錄 亞荔枝 開寶 比目 吳普 驪珠 燕卵 蜜脾 鮫淚 南方草木狀 圓眼 俗名

實 甘平溫 恭曰 治五臟邪氣安志厭食除蠱毒去三蟲久服强魂聰明 別錄 開胃益脾補虛長智 時珍

發明 時珍曰 嚴用和濟生方治思慮勞傷心脾有歸脾湯取甘味歸脾能益人智之義

方 歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸用——肉酸棗仁炒黃芪炙白朮焙茯神各一兩木香半兩炙甘草二錢半㕮咀切每服五錢薑三片棗一枚水二鍾煎一鍾溫服 濟生方

荔枝 又名離枝 綱目

[昂曰]｜｜少食亦可補中多食發病動痰熱鼻衂牙疼之患

[嗚岑曰]嘗遇一外科李右峯技甚效謂予曰凡腫毒初起無論輕重但以公丁香｜｜肉二味研傅無不消者此言可與丹溪相發明若與白梅同用更妙

實 甘平[珣曰]甘酸 止渴益顏色[開寶] 益智健氣[孟詵] 治瘰癧疣贅赤腫疔腫發小兒痘瘡[時珍]

發明 [丹溪曰]｜｜屬陽主散無形質之滯氣故疣贅赤腫者用之苟不明此雖用之不應[時珍曰]｜｜氣味純陽其性熱鮮者食多即齦腫口痛或衄血也病齒䘌及火病人尤忌之按物類相感志食｜｜多則醉以殼浸水飲之即解此即食物不消還以本物消之之意[頌曰]食｜｜過度飲蜜漿一杯即解

方 痘不起發 ｜｜肉浸酒飲之忌生冷 聞人規痘疹 疔瘡惡腫 ｜｜肉白梅肉各三箇搗貼瘡上根即出也 濟生秘覽 風牙疼痛 ｜｜連殼燒存性研末擦牙即止乃治諸藥不效之仙方也 普濟 呃逆不止 ｜｜七箇連皮核燒存性為末白湯下即止 醫方摘要

荔枝 核 殼

「時珍曰」荔枝核入厥陰肝

「希雍曰」其氣溫而通行入肝腎散滯氣辟寒邪

「又曰」同牛膝補骨脂延胡合歡子茴香木瓜杜仲橘核川萆薢治疝氣熱者加黃柏寒者加桂

核 甘溫濇治心痛小腸氣痛以一枚煨存性研末酒調服 宗奭 治㿉疝氣痛婦人血氣刺痛 時珍

發明 「時珍曰」——核入厥陰行散滯氣其實雙結而核肖睪丸故其治㿉疝卵腫有述類象形之義

方 脾痛不止 荔枝核為末醋服二錢即愈 衛生易簡方 婦人血氣刺痛 荔枝核燒存性半兩香附一兩炒為末每鹽湯下二錢名蠲痛散 婦人良方 㿉疝 孫氏用荔枝核炒存性大茴香炒等分或加青皮為末每服一二錢酒下○皆效 方王環來笑丹 荔核四十九箇陳皮連白九箇硫黃四錢鹽水麪打糊為丸綠豆大每痛時空心酒下九丸良久再服神效

殼 治痘瘡出不快煎湯飲之解食荔枝熱浸水飲 「時珍」

橄欖 又名青果 梅聖兪集 忠果 記事珠 諫果 農書

酸甘溫 震亨曰 酸濇甘 生食煑食並消酒毒解鯸鮐魚毒 開寶 嚼汁嚥治魚鯁 宗奭 能解諸毒 蘇頌 開胃下氣止瀉 大明 生津液止煩渴治咽喉痛咀嚼嚥汁解一切魚鱉毒 時珍

發明 志曰 鯸鮐即河豚誤食其肝及子迷悶至死惟——及木煑汁能解之其木作舟楫撥着魚皆浮出物之相畏有如此者 時珍曰 名醫錄云一人食鱖魚被鯁不上不下半月餘將死一漁人令食——時無此果以核研末急流水調下骨遂下而愈按延壽書云食——必去兩頭其性熱也過白露摘食庶不病痁 宗奭曰 性熱多食能致上壅

方 脣裂生瘡 ——燒研豬脂和塗之 下部疳瘡 ——燒存性研末油調傅

震亨曰入肺大腸

鳴皋曰——味甘微澁自係性平若云溫尚可謂其性熱則非也丹溪云多食引火入肺謂其走肺亦未嘗謂其性熱至于繆仲淳同其治五痔劃為苦寒能去濕熱之說更為妄矣大抵——之性平溫而能以通為用故能入腸治痔入肺治吐血也

之或加孩兒茶 乾坤生意

核 磨服治鯁及食鱠成積又治小兒痘瘡倒靨燒研服之治下血 時珍

方 腸風下血 橄欖核灯上燒存性研末每服二錢陳米飲下 仁齋直指

陰腎癲腫 橄欖核荔枝核山查等分燒存性研末每服二錢茴香湯調下 乾坤生意

榧實 又名被子 神農 赤果 日用 玉榧 同上 玉山果 時珍曰玉山縣者佳故名

甘平澁 瑞曰性熱 治五痔去三虫蠱毒鬼疰惡毒 別錄 殺寸白虫 弘景 消穀助筋骨行營衛明目輕身令人能食 孟詵 多食滑腸五痔人宜之 宗奭 治咳嗽白濁助陽道 生生編

鳴泉曰｜｜｜潤肺潤大腸兼能補心

鳴泉曰｜｜｜為松之實故性能去風凡驅風藥多燥以此加入頗相宜為其甘溫滋潤能益血也若特此以逐風痺知非其

發明〔丹溪曰〕｜｜肺家果也但多食則引火入肺大腸受傷耳〔原曰〕｜｜殺腹蟲大小虫小兒黃瘦有虫積者宜之東坡詩云驅除三彭虫已我心腹疾是矣〔瑞曰〕同鵝肉食生斷節風又上壅人〔時珍曰〕物類相感志云｜｜同甘蔗食其渣自軟又云｜｜皮反綠豆能殺人

方寸白虫〔孟詵曰〕日食｜｜七枚七日後虫皆化為水○外臺用｜｜百枚火燃啖之胃弱者五十枚

好食茶葉 方同上 楊起簡便方

卒吐血 先食蒸餅一二箇以｜｜末白湯點服三錢日三服 聖濟總錄

尸咽痒痛 言語不出｜｜半兩燕荑一兩杏仁桂各半兩為末密丸芡子大含嚥 同上

海松子〔珣曰〕出遼東新羅甘美甚香亦出雲南似巴豆其味不及多食發熱毒

甘小溫治頭眩去骨節風潤五臟不飢〔開寶〕逐風痺補

力所勝任矣
〔鴻皋曰〕多食飽食亦能生痰

〔汪昂曰〕｜｜仁一兩胡桃肉二兩鍊蜜丸
治肺燥咳嗽

不足虛羸少氣潤皮膚別錄主諸風溫腸胃李珣潤肺治燥結欬嗽時珍同柏子仁治虛秘宗奭

方　小兒寒嗽或作壅歇用｜｜仁五十箇百部炒麻黃蜜炙各三錢杏仁四十箇去皮尖以少水略煮三五沸化白糖丸芡子大每食後含化十丸大妙錢乙小兒方大便虛秘｜｜柏子仁麻子仁等分研泥溶蠟丸梧子大每服五十丸黃芪湯下名三仁丸寇氏

枳椇子又名陸機詩疏蜜屈律廣記木蜜拾遺木餳同上木珊瑚廣志雞距子蘇文木名枅枅音雞枅

甘平治頭風小腹拘急唐本止渴除煩去膈上熱潤五臟利大小便功用同蜂蜜枝葉煎膏亦同藏器止嘔逆

解酒毒辟蟲毒 時珍

發明 震亨曰 一男子三十餘因飲酒發熱又兼房勞虛乏乃服補氣血藥加葛根以解酒毒微汗出反懈熱如故此乃氣血虛不禁葛根之散也遂於煎藥中加｜｜｜解其毒乃愈 時珍曰 按東坡集云揭潁臣病消渴日飲水數斗飯亦倍進小便頻數服消渴藥日甚延張肱診之曰君幾誤死取麝香當門子以酒濡作十許丸煎｜｜｜湯吞之遂愈問其故肱曰消渴消中皆脾弱腎敗土不制水而成今潁臣脾脉極熱腎脉不衰當由酒果過度積熱在脾所以多食多飲〻多溲不得不多非消渴也麝香壞酒果｜｜能勝酒故假二物以去其酒果之毒也頌曰若以其木為柱則屋中之酒皆壞張肱曰屋外有此樹屋內釀酒多不佳 孟詵曰 多食發蚘蟲

水果部

時珍曰｜主心脾血分之疾
昂曰生甘寒涼血散瘀止渴除煩解酒蟹毒熟甘溫益胃補心止瀉止怒
昂曰卒中毒箭者｜汁飲多〻益善方見肘後

藕 其根｜其實蓮其中菂〻中薏郭璞云蓮乃房也菂乃子也薏乃中心苦薏也

甘平治渴散留血生肌久服令人心歡 別錄 止怒止泄消食解酒毒及病後乾渴 藏器 擣汁服止悶除煩開胃治霍亂破産後血悶搗膏署金瘡并傷折暴痛蒸煮食之大能開胃 大明 生食治霍亂後虛渴蒸食甚補五臟實下焦同蜜食令人腹臟肥不生諸虫 孟詵 汁解射罔毒蟹毒 徐之才

發明 弘景曰宋時大官作血衉（衉音勘 血羹也）庖人削｜皮誤落血中遂散渙不凝故醫家用以破血多效也 詵曰産後忌生冷獨｜不同生冷者為能破血也 時珍曰｜之所主皆心脾血分之疾與蓮之功稍不同

〔甲曰〕藕節治療功用同藕

方

時氣煩渴生|汁一盞生蜜一合和勻細服聖惠傷寒口乾|汁生地汁童便和服見龐氏傷寒論霍亂吐利生|搗汁服聖惠產後悶亂血氣上衝口乾腹痛梅師用生|汁三升隅熱水令溫飲之○龐安時用|汁生地汁童便等分溫服小便熱淋|汁生地汁葡萄汁等分入瓷溫服千金方墜馬血瘀積在胸腹唾血者乾|為末酒服食蟹中毒|汁解之聖惠上焦痰熱|汁梨汁各半盞和服簡便方

藕節〔大明曰〕伏硫黃

濇平消瘀血解熱毒產後血悶和地黃研汁入熱酒小便飲大明能止欬血唾血〻淋溺血下血〻痢血崩

時珍

時珍曰｜｜脾之果也鳴皋曰亦補心

昂曰黑而沉水者為石｜｜清心除煩開

發明 時珍曰一男子病血淋痛脹祈死予以藕汁調髮灰每服二錢三日而血止痛除宋孝宗食蟹成痢國醫不能治高宗偶見一小藥肆召問之遂診脈曰此冷痢也用新藕節搗爛熱酒調下數服遂愈

大抵藕能消瘀解熱開胃而又解蟹毒故也

方 **吐衄不止** 藕節杵汁飲之良 **便血** 藕節晒乾為末人參白蜜煎湯調服二錢

全幼心鑑 **暴吐血** 雙荷散用藕節荷葉各七箇以蜜少許擂爛水二鍾煎八分去滓溫服為末丸服亦可

聖惠方 **遺精白濁** 心虛不寧金鎖玉關丸用藕節蓮鬚蓮子肉芡實山藥白茯苓茯神各二兩為末用金櫻子二斤搥碎以水熬膏入少麪和藥丸梧子大每服七八十丸米飲下

普濟方 **鼻淵腦瀉** 藕節川芎焙研為末每服二錢米飲下 同上

蓮子

蓮子 別錄 菂 爾雅 薂 同上音吸 水芝 本經 澤芝 古今注 石

胃進食專治噤口痢淋濁諸症

甘平濇〔時珍曰〕嫩菂性平石蓮性溫　補中養神益氣力除百病久服耐老不飢本經　主五臟不足傷中益十二經脈血氣孟詵　止渴去熱安心止痢治腰痛及泄精多食令人歡喜大明　交心腎厚腸胃固精氣强筋骨補虛損利耳目除寒濕止脾泄久痢赤白濁女人帶下崩中諸血病時珍　安靖上下君相火邪嘉謨

發明〔時珍曰〕丨丨味甘氣溫而性濇禀清芳之氣得稼穡之味乃脾之果也脾者黃宮所以交媾水火會合木金者也土為元氣之母々氣既和津液相成神乃自生久視耐老此其權輿也昔人治心腎不交勞傷白濁有清心蓮子飲補心腎益精血有瑞蓮丸皆得此理〔藏器曰〕經秋正黑石丨丨入水則沉惟

[昂曰]肆中所市石蓮産廣東樹上不可入藥真石蓮落田野中百年不壞人得食髮黑不老

煎鹽鹵能浮之煎鹵人以之試鹵蓮浮至頂鹵乃可煎[詵曰]諸鳥猿猴取得不食藏之石室內人得三百年者食之永不老也[時珍曰]今藥肆一種石蓮狀如土石不知何物[又曰]得茯苓山藥白朮枸杞子良

方

清心寧神 石｜｜肉去皮留心同為末入龍腦點湯服 寇宗奭

補虛損 水芝丹｜｜半升酒浸二宿以豬肚一箇洗淨入｜｜在內縫好煮熟取出晒乾研末米糊丸梧子大每服五十丸食前溫酒下 醫學發明

小便頻數 下焦真氣虛弱者用上方醋糊丸服

遺精白濁 石｜｜龍骨益智仁等分為末每服二錢米飲下 普濟用石蓮肉茯苓等分為末湯調

久痢噤口 石蓮肉炒為末每服二錢陳倉米汁調下便覺思食甚妙或加香連丸尤妙 丹溪

脾泄腸滑 方同上

噦逆不止 石蓮肉六枚炒黃為末熟水和服即止 蘇頌圖經

產後欬逆 嘔吐心忡目運石蓮子一兩半雲苓一兩丁香五錢為末米飲服二錢 良方補遺

〔布雅曰〕——詳其所主乃是足少陰腎藥亦能通手少陰心經能清心固精氣止吐血療滑泄同黃柏沙仁沙苑蒺藜魚膘五味澀益甘草牡蠣作丸治夢遺精滑最良

反胃吐食 石蓮肉為末入少肉豆蔻為末米飲調下 直指方

蓮薏 即蓮子中青心也〔蔵器曰〕食蓮子不去心令人作吐

苦寒治血渴産後渴生研末米飲服二錢立愈 士良 止霍亂 大明 清心去熱 時珍

方 勞心吐血 蓮子心七箇糯米二十一粒研末酒服此臨安張上舍方也 是齋百一方

小便遺精 蓮子心一撮為末入辰砂一分每服一錢白湯下日二 醫林集要

蓮鬚 一名佛座鬚

甘濇溫清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏色益血止血崩吐血 時珍

時珍曰入厥陰血分肝

發明 時珍曰｜｜本草不收而三因諸方固真丸巨勝子丸各補益方往〻用之其功大抵與蓮子同也 大明曰忌地黃葱蒜

方 久近痔漏三十年者三服除根用｜｜黑丑頭末各一兩半當歸五錢為末空心酒服二錢忌熱物五日見效 孫氏集效

蓮蓬殼 又名蓮房 時珍曰陳者良

苦濇溫治便血 孟詵 治血脹腹痛及産後胎衣不下酒煮服之解野菌毒水煮服之 蔵器 止血崩下血溺血 時珍

發明 時珍曰蓮房入厥陰血分消瘀散血與荷葉功同

方 經血不止瑞蓮散用陳｜｜燒存性研末每服二錢熱酒下 婦人經驗 血

崩不止不拘冷熱用｜｜｜荊芥穗各燒存性等分為末每服二錢米飲下聖惠方
産後血崩｜｜｜五箇香附二兩各燒存性為末每服二錢米飲下日二婦人良方
血淋｜｜｜燒存性為末入麝香少許每服二錢半米飲調下日二經驗方
天泡濕瘡｜｜｜燒存性研末并泥調塗神效海上方

荷葉蒂名荷鼻大明曰入藥並多用時珍曰畏桐油伏白銀伏硫黃
止渴落胞破血治産後口乾心肺躁煩大明治血脹腹
痛産後胎衣不下酒煮服之荷鼻安胎去惡血留好
血止血痢殺菌蕈毒煎水煮服藏器生發元氣補助脾
胃濇精散瘀消水腫癰腫發痘瘡治吐血咯血衄血

下血溺血々崩血淋産後悪血損傷敗血　時珍

發明

〔杲曰〕潔古先生口授枳术丸方用｜｜燒飯為丸當時未悟其理老年始悟夫震者動也人感之生足少陽甲膽是屬風木為生化萬物之根蔕人之飲食入胃營氣上行即少陽甲胆之氣與手少陽三焦元氣同為生發之氣｜｜其色青其形仰其中空象震食藥感此氣之化胃氣何由不升乎用此為引可謂遠識更以燒飯和藥與白术協力滋養令胃厚不致內傷其利廣矣世之用巴豆牽牛者豈足語此〇〔時珍曰〕東垣試效方云雷頭風證頭面疙瘩腫痛憎寒發熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒涼誅伐無過一人病此諸藥不效余為處清震湯而愈用｜｜一枚升麻五錢蒼术五錢煎服蓋｜｜色青形象震乃涉類象形之義也又聞人規痘疹八十一論云痘已出復為風寒所襲則竅閉血凝其點不長或變黑色倒靨必身痛四肢微厥但溫肌散邪則熱氣復行而斑自出也宜紫背｜｜散蓋｜｜能升發陽

氣散瘀血留好血僵蚕能解結滯之氣故也勝於人
牙龍腦多矣又戴原禮云||服之令人瘦故單服
可以消陽水
浮腫之氣

方|陽水浮腫 敗||燒存性研末每服二錢米飲調下日三 證治要訣

脚膝浮腫 ||心藁本等分煎湯洗 永類

痘瘡倒靨 紫背||散治風寒外襲倒靨勢危者萬無一失用霜後||貼水紫背者炙乾直僵蚕去絲炒等分為末芫荽湯下半錢酒下亦可 聞人規

諸般癰腫 拔毒止痛||中心帶不拘多少煎洗拭乾以寒水石臘猪脂塗之 本事方

打撲損傷 惡血攻心悶亂疼痛者以乾||五片燒存性為末每服一二錢熱童便食前調下日三利下惡物愈 聖惠

産後心痛 惡血不盡也||炒香為末每服方寸匕沸湯或童便調下煎汁飲亦可 救急方

胎衣不下 同上方

孕婦傷寒 大熱煩渴恐傷胎氣用嫩荷葉

巻丨丨焙半兩蛤粉二錢半為末每服三錢新汲水入蜜調服并塗腹上名罩胎散　鄭氏方

妊娠

胎動已見黄水者乾丨丨蒂一箇炙研為末糯米汁調下即安　唐瑶經驗

吐血不止

嗽丨丨七枚擂水服甚佳〇又方乾丨丨蒲黄等分末服三錢桒白皮湯下〇肘後用霜後敗丨丨焼存性新汲水調下二錢

吐血咯血

丨丨焙乾為末米湯調下三錢〇聖濟用麥冬湯下

吐血

衄血

陽乘於陰血熱妄行宜服四生丸日華云嚢得效用生丨丨生艾葉生柏葉生地黄等分搗爛丸鴿子大每吃一丸水煎去滓服　濟生

崩中下血

丨丨焼半兩蒲黄丶芩各一兩為末酒服三錢

血痢不止

丨丨帶煎服　普濟方

下痢赤白

丨丨炒研每服二錢赤痢蜜白痢沙糖湯調下

脱肛不収

貼水丨丨焙研酒服二錢仍以丨丨為末貮坐之　經驗

漆瘡

作痒丨丨煎洗　集驗

腎囊風

方同上

遍身風癘

丨丨三十箇石灰一斗淋

〔昂曰〕功能補脾去濕故治洩瀉能固腎澀精故治夢遺小便不禁帶濁

〔希雍曰〕得山藥雲苓參朮蓮子苡仁扁豆為補脾胃要藥

果部

汁合漬之半日乃出〔一作數日〕聖惠 偏頭風痛 升麻蒼朮各一兩｜｜一箇水二鍾煎一鍾食後服或炒｜｜一箇為末以煎汁調服 簡便方 刀斧傷 ｜｜炒末搽之 集簡 赤遊火丹 新｜｜打爛入鹽塗之 摘元 陰囊痛痒 ｜｜浮萍蛇床等分煎洗 醫壘元戎 牙疼 青｜｜蒂七箇濃米醋煎半盞熬成膏時時搽之妙 唐瑤經驗

芡實 一名鴨頭 本經 雁喙 同上 雁頭 古今註 鴻雍 莊子 卯菱 音子 蔿子〔音遙〕 弘景 水流黃

甘平濇治濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志聰明耳目 本經 開胃助氣 日華 止渴益腎治小便不禁遺精白濁帶下 時珍

發明〔弘景曰〕小兒多食令不長〔又曰〕仙方取此合蓮實餌之甚益人〔詵曰〕生食多動風冷氣〔頌曰〕太

〔鳴皋曰〕分清丸用黄蠟亦與威喜丸同義
説見黄蠟

殼暴乾搗篩末熬金櫻子膏和丸服之云補下益人
謂之水陸二仙丹〔時珍曰〕孫升談圃云||不益人
而俗謂之水流黄何也盖人之食芡必咀嚼之而味
甘平腴而不膩食之者能使華液流通轉相灌漑其
功勝於乳石也淮南子云貍頭
愈瘰雞頭已瘻(去濕之功)雞頭即||也
〔詵曰〕蒸熟晒乾搗粉用〔時珍曰〕煮食良入濇精藥連
殼用亦可陳彥和云||一斗以防風煎湯浸過用
良丹經
久不壞

方

雞頭粥 益精氣强志意利耳目||三合煮熟
去殼粳米一合煮粥空心日食 經驗

四精丸 治思慮色欲過度損傷心氣小便數遺精用
秋石茯苓||蓮肉各二兩為末蒸棗肉丸
梧子大每服三十
丸塩湯下 永類

分清丸 治濁病用||粉茯苓粉
黄蠟化蜜和丸梧子大每
服百丸塩湯
下 摘元

【[illegible]杲曰】丨丨與海蜇同煮服名為雪羹能去久積以丨丨能消堅海蜇鹹能軟堅也且能治肝氣肝積此方甚效而奇

勃臍 又名烏芋別錄凫茈音凫茨黑三棱博濟地栗通志【瑞曰】小者名凫茨大者名地栗

甘微寒治消渴痺熱別錄下丹石毒除胸中實熱消黃疸孟詵開胃下食大明作粉食厚腸胃能鮮毒服金石人宜之蘓頌療五種膈氣消宿食治誤吞銅物汪機主血痢下血血崩辟蠱毒時珍

發明【機曰】烏芋善毀銅合錢嚼之則錢化可見其為消堅削積之物故能治五種膈氣而消宿食治誤吞銅物【時珍曰】按王氏博濟方治五積冷氣攻心變為五膈諸病金鎖丸中用黑三棱註云即凫茨之乾者則汪氏消堅之說蓋本於此又董炳集驗方云地栗晒乾為末白湯服二錢能辟蠱毒傳聞下蠱之家知有此物便不敢下此亦前人所未知者

〔鴻案曰〕||北方所常食不見其害或曰：食之或食之過多乃致此歟抑南産與北産有別歟

方 大便下血 ||汁一鍾酒半鍾空心溫服三日效 神秘方 赤白痢 午日〔午時取完好||拭淨勿令破損好燒酒浸之黃泥密封遇有患者用二枚空心嚼原酒送下 經驗

血崩 ||一歲一箇燒存性研末酒服之 李氏方

慈菇 又名慈姑 日華 藉姑 別錄 水萍 同上 河鳧茈 圖經 白地栗 同上

甘苦微寒治百毒產後血悶攻心欲死產難胞衣不出搗汁服一升又下石淋 大明

發明 〔大明曰〕多食發虛熱及腸風痔漏崩中帶下瘡癤以生薑同煮佳懷孕人不宜食〔詵曰〕吳人常食之令人發腳氣癱緩風損齒失顏色皮肉乾燥卒食之使人乾嘔也

葉 治諸瘡腫遊丹瘤毒搗塗之即消甚妙 蘇頌 調蚌

嗚泉曰蔗性味殊不濇凡熱瀉飲其漿即止者是甘寒除胃熱熱清則瀉止非濇也
余在江南患熱瀉因渴飲蔗漿一盌而愈
寒瀉滑瀉者非所宜
嗚泉曰甘涼能益胃陰故止嘔吐微寒能解暑故治痁瘧

粉塗瘙痱 時珍

甘蔗

甘平濇下氣和中助脾氣利大腸 別錄 利大小腸消痰止渴除心胸煩熱解酒毒 大明 止嘔噦反胃寬胸膈 時珍

發明 時珍曰｜｜漿甘寒能瀉火熱素問所謂甘溫除大熱之意也煎成糖則甘溫助濕熱所謂積溫成熱也與生漿之性異矣按野史云盧絳病痁瘵忽夢白衣人云食｜｜可愈因食數挺即愈此亦助脾和中之驗也

方 發熱口渴小便赤濇飲｜｜漿 外臺 痰嗽氣急 方見山藥 反胃吐食｜｜漿七升生薑汁一升和勻細呷 梅師方 乾嘔不息 方同上 痁疾疲

鳴皋曰清肺胃

鳴皋曰｜｜解暑故治暑痢一老嫗年七十餘痢日夜數十次醫忌生冷已將斃渴極求食｜｜家人與食即愈

又曰余喜食生冷在北京暑月每日食此二枚三十歲後多食即患腹脹寒胃傷脾故也輟食即愈

瘵 見發明

西瓜

甘寒治消渴解暑熱 吳瑞 療喉痺 汪頴 利小水治血痢解酒毒 寗原 含汁治口瘡 震亨

發明 頴曰｜｜解暑熱有天生白虎湯之號然亦不可多食 時珍曰｜｜多食取快一時須防秋來有瘧痢之患

皮｜甘涼治口舌唇內生瘡燒研噙之 震亨

瓜子仁 甘寒主治與甜瓜子仁同 時珍

甜瓜

甘寒滑止渴除煩熱利小便嘉祐解暑宗奭

發明［思邈曰］多食發黃疸病後食多或反胃脚氣人食之患不瘥［宗奭曰］｜｜雖解暑多食未有不下痢深秋作痢尤為難治

甜瓜子仁

甘寒治腹內結聚破潰膿血最為腸胃脾內壅要藥［別錄］

止月經太過研末紙壓去油水調服藏器○［斆曰］不去油其力短

清肺潤腸和中止渴時珍

方｜腰腿疼痛｜｜｜仁三兩酒浸十日為末每服三錢空心酒下日三壽域神方

腸癰已成小腹腫痛小便似淋大便艱澀下膿用｜｜｜仁一合當歸炒一兩蛇蛻皮一條切

甜瓜蒂

〔時珍曰〕——陽明經除濕熱之藥〔杲曰〕陽明胃經吐藥

〔丹溪曰〕吐中有發散之義張子和云諸汗法古方多有惟以吐發汗世罕知之故予

碎每用四錢水一盞半煎一盞食前服下惡物爲效聖惠

瓜蔕又名瓜丁千金苦丁香象形〔時珍曰〕唐瑤云甜瓜蔕以瓜團而短及團瓜者良若香甜瓜及長如瓠者皆供菜之瓜其蔕不堪用

苦寒有毒〔大明曰〕無毒 治大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在胸腹中皆吐下之本經 去鼻中瘜肉療黃疸別錄 治腦寒熱齆眼昏吐痰大明 吐風熱痰涎治風眩頭痛癲癇喉痹頭目有濕氣時珍 得麝香細辛治鼻不聞香臭好古

發明〔仲景曰〕病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞哽氣上衝咽喉不得息者此爲胸中有

嘗曰吐法兼汗
〔汪昂曰〕仲景｜｜散梔豉湯並是吐藥張子和治病吐法尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日治小便不通亦用吐法甚至用四物四君以引吐成法具在按汗吐下和乃治病之四法今惟知汗下和吐法竟不用遇邪在上焦及當吐者不行涌越致結痰而成壞症者多矣
〔又曰〕語云大吐亡陽大下亡陰凡吐法須天氣晴和令病人隔夜勿食卒病者不拘類編云一女子病齁欬不止遇一道人教取｜｜七枚爲末調服其汁即吐痰如膠三進而病如失
〔鴻泉曰〕丹溪治小便不通亦用吐法甚有理小便不通多係肺氣鬱閉或濕熱痰壅吐則胃家開肺氣亦通肺氣通則小便出矣

寒也當吐之太陽中暍身熱頭痛而脉微弱此夏月傷冷水〻行皮中也宜吐之少陽病頭痛發寒熱脉緊不大是膈上有痰也宜吐之病胸上諸實鬱〻而痛不能食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脉微弦者當吐之懊憹煩躁不得眠未經汗下者謂之實煩當吐之宿食在膈上者當吐之並宜｜｜散主之惟諸亡血虛家不可與也〔成無己曰〕高者越之在上者涌之故越以｜｜香豉之苦涌以赤小豆之酸〔東垣曰〕上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死此飲食內傷填塞胸中食傷太陰風木生發之氣伏於下宜｜｜散吐之素問所謂木鬱則達之也吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣若尺脉絶者不宜用此恐損眞元令人胃氣不復也〔宗奭曰〕此物吐涎甚不損人全勝石綠硇沙葉也〔丹溪曰〕｜｜性急能損胃氣胃弱者宜以參蘆代之病後産後宜深戒〔時珍曰〕｜｜乃陽明經除濕熱之藥故能引去胸脘痰涎頭目濕氣皮膚水氣黃疸濕熱諸病凡胃弱人病後産後用吐藥皆宜加慎何獨｜

丨為
然
方
瓜蒂散　治症見上用丨丨二錢半炒黃赤小豆二錢半為末每用一錢香豉一合熱湯七合煮爛去渣和末服少少加之快吐乃已　傷寒論
太陽中暍　丨丨二七枚水一升煮五合頓服取吐　金匱
風涎暴作　氣塞倒仆丨丨為末每用一二錢膩粉一錢以水半合調灌良久涎自出不出含沙糖一塊即出　雜氏
諸風癇　諸風膈痰諸癇涎涌用丨丨炒黃為末量人以酸漿水調下取吐癲癇加蝎尾半錢濕氣腫滿加赤小豆末一錢有蟲加狗油五七滴雄黃一錢甚則加芫花半錢立吐虫出　活法機要
風癇喉風　欬嗽急涎潮等症不拘大人小兒此藥不大吐逆只出涎水丨丨為末壯年服一字老少半字早晨井華水下一食頃含沙糖一塊良久涎如水出年深者出黑涎涎盡食粥一兩日如吐甚不止以射香泡湯一盞飲之即止　經驗後方
急黃

歇息心上堅硬欲得水喫者｜｜赤小豆研末漿水服取吐吹鼻取水亦可　傷寒類要方

遍身如金｜｜四十九箇丁香四十九枚炒存性為末每用一字吹鼻取出黄水亦可揩牙取涎　經驗

熱病發黄｜｜末以豆許吹鼻中少頃流黄水愈　千金

身面浮腫方同上

濕家頭痛同上　活人書

十種蠱氣｜｜末棗肉和丸梧子大棗湯下三十丸　瑞竹堂

瘧疾寒熱｜｜二枚浸一宿頻服取吐　千金

發狂欲走｜｜末井華水服一錢　聖惠方

鼻中瘜肉青甜｜｜二箇雄黄射香各半分為末先抓破後貼之日三次　同上

牙痛｜｜炒研射香少許畏咬取涎

白虎甜瓜蔓｜｜不拘多少水浸一夜煮汁煎如餳先刺去痂洗淨以膏和半夏末二錢薑汁一匙大胆汁一枚塗之不過三次忌食動風物　儒門事親

齁歇痰氣｜｜三箇為末水服　朱氏

蔆

淩 又名芰 別錄

甘寒鮮者解暑解傷寒積熱止渴解酒毒射罔毒 時珍

解丹石毒 時珍

發明 詵曰生食性冷多食傷臟腑損陽氣痿莖生蟯虫水果中此物最不治病若過食腹脹者可煖薑酒服之即消 時珍曰生者性冷熟者性平

時珍曰｜｜色白入肺

穀菜部

粳(音庚)米 又名秔音庚

甘平〔時珍曰〕北粳凉南粳温赤粳熱白粳凉晚白粳寒新粳熱陳粳凉 益氣止渴止瀉別錄 温中和胃氣蜀本 斷熱毒下痢孟詵

發明〔好古曰〕本草言｜｜益脾胃而仲景白虎湯用之入肺以味甘為陽明之經色白為西方之象而氣寒入手太陰也少陰證桃花湯用之以補正氣竹葉石膏湯用之以益不足〔時珍曰〕六七月收者為早粳止可充食八九月收為遲粳十月收為晚粳北方氣寒粳性亦凉八九月收者即可入藥南方惟十月晚粳氣凉乃可入藥以得金氣多故色白入肺而解熱也早粳得土氣多故赤者益脾而白者益胃若滇嶺之粳則性熱惟彼土宜之耳〔詵曰〕忌馬肉不可同蒼耳食令人卒心痛急燒倉米灰和蜜漿服之不

昂曰集成云陳米飯紫作團火煆存性麻油膩粉調傅一切惡瘡百藥不效者

函
死

方　米瘕嗜米　有人好食生米久則成瘕不得米則吐清水得米則止米不消化久亦斃用白丨丨五合雞屎一升同炒為末水一升頓服少時吐出米瘕如研米汁或白沫或淡水乃愈也　千金方　初生無皮　色赤但有紅筋乃受胎未足米粉撲之　聖濟　小兒甜瘡　生於面耳令母嚼丨丨卧時塗之三五次愈　肘後　胎動腹痛　下黃汁用丨丨五升黃芪六兩水七升煎二升分四服　聖惠　自汗不止　丨丨粉絹包撲之

米泔　用第二次者

甘寒清熱止煩渴利小便涼血　時珍

方　吐血不止　陳米泔水溫服一鍾日三次　普濟方　衄不止　頻飲米泔仍以

〔鴻舉曰〕||補肺

〔昂曰〕||能解毒化膿助漿故痘瘡用之

〔鴻舉曰〕梅花一方當是治肺氣熱渴吐血

一方當是治心肺家血白糯丸用同白芷

真麻油或蘿蔔汁

滴入 證治要訣

糯米

甘溫 溫中令人多熱大便堅 別錄 能行榮衛中血積解

芫青斑蝥毒 士良 益氣止瀉 思邈 止霍亂後吐逆不止以

一合研水服之 大明 暖脾胃止虛寒瀉痢縮小便收自

汗發痘瘡 時珍

發明 〔士瀛曰〕痘瘡用||取其解毒能釀而發之也

〔時珍曰〕||性溫釀酒則熱熬餳尤甚故脾胃

虛寒者宜之若素有痰熱風病及脾病不能轉輸食

之最能發病成積孟詵蘊頌乃謂其性寒涼者謬也

方 三 消渴病 梅花湯用||穀炒出白花 桑根白

皮 等分每一兩水二椀煎飲 三因

甚妙以白芷能出濕熱治白濁淋濁最驗
金瘡瘡疽一方云最驗惜余未試也

〔帛旦〕自汗不止同蠣粉龍骨粉撲之亦佳

鼻衄不止 服藥不應獨聖散用||微炒黃為末每服二錢新汲水調下仍吹少許入鼻 簡要濟衆

吐血 ||半兩蓮子心七枚為末酒服孫仲盈曰曽用多效或墨汁為丸亦妙 澹寮

金瘡瘡疽及竹木刺毒 用||三升於端午前四十九日以冷水浸之一日兩換水輕淘勿攪碎至端午日取出陰乾絹袋盛掛通風處每用現取炒黑為末冷水調如膏藥隨瘡大小裹定瘡口外以布包定勿動直等瘡痊○若金瘡犯水作膿腫甚者急裹一二食久即不作膿腫也若瘡疽初發才覺焮腫急貼之一夜便消 靈苑方

白糯丸 治人夜小便脚停白濁老人虛人多此症令人卒死大能耗人精液主頭昏重用||五升炒赤黑白芷||兩為末糯粉糊丸梧子大每服五十丸饅頭湯下無此用局方補腎湯下若後生稟賦怯弱房室太過小便太數水管蹇澀小便如膏入石菖蒲牡蠣粉甚效 經驗

自汗不止 ||小麥麩同炒為末每服三錢米飲下

好古曰脾經氣分藥

鳴泉曰治嗽方有用蘿蔔搗汁納一一峴泡化温服者與蔓菁菹汁同義

震亨曰一一大發濕中之熱時珍曰凡中滿吐逆秘結牙蟲赤目疳病者切忌之生

穀菜部

餳從昜 錫從易 音餳飴和饊也

飴餹 又名餳 音徐盈切 信平聲

集解 保昇曰飴即軟餹也糯米粳米秫米粟蜀秫米大麻子枳椇子黄精白朮並堪熬造惟以糯米作者入藥粟米者亦可餘不堪用 時珍曰一一用麥蘗或穀芽同諸米熬煎而成

甘温 補虚乏去血 別録 止腸鳴咽痛治唾血消痰潤肺止嗽 思邈 健脾胃補中治吐血打損瘀血者熬焦酒服能下惡血又傷寒毒嗽于蔓菁菹汁中煮一沸服之良 孟詵 脾弱不思食少用能和胃氣亦用和藥 寗氏 解附子草烏頭毒 時珍

發明 弘景曰古方建中湯多用之成無己曰脾欲緩急食甘以緩之一一之甘以緩中也 好古曰一一

痰動火最甚甘屬土腎病毋多食甘〻傷
腎骨痛而齒落

丨乃脾經氣分藥甘能補脾之不足時珍曰集異記云邢曹進河朔健將也為飛矢中目拔矢而鏃留中鉗之不動痛困俟死一僧教以寒食餳點之如法用之清凉頓減痛楚至夜癢用力一拔而出旬日而瘥

方 蛟龍瘕病 凡人正二月食芹誤食蛟龍精為蛟龍病發則似癇面色青黃每食寒食餳五合日三服吐出蛟龍有兩頭可驗吐蚘者勿用 金匱 魚臍瘡 丨丨塗之良 千金 瘭疽惡瘡 方同上 箭鏃不出 見發明 火灼傷 燒灰粉之易燥 小品方 烏附毒 食丨丨即解 捻錄

穀芽 一名穀蘗

甘溫開胃快脾下氣和中消食化積 時珍

方 啓脾進食 穀神丸 丨丨四兩為末入薑汁鹽少許和作餅焙乾入甘草炙砂仁白朮

「素問」曰麥心之穀也

「昂」曰汗爲心液麥爲心穀浮麥能凉心故止汗麥麩同功

「昂」曰寒食日以小麥麪紙袋盛懸風處名寒食麪取其年久不熱入藥尤良

麩炒各一兩爲末丸服「澹寮」

小麥

甘微寒「權」曰平「恭」曰小麥作湯皮拆則性温不能消熱止煩也「藏器」曰麥凉麴温麩冷麪熱「時珍」曰新麥熱陳麥平和 除客熱止煩渴咽燥利小便養肝氣止漏血唾血「別錄」養心氣心病宜食之「思邈」煎湯飲治暴淋「寇氏」陳者煎湯飲止虛汗燒存性油調塗諸瘡湯火傷「時珍」

浮麥 甘鹹寒除熱止自汗盜汗骨蒸虛熱婦人勞熱「時珍」

麥麩 撲折損傷瘀血醋炒署之「日華」醋拌蒸袋盛熱

〔鳴泉曰〕仲景治婦人臟燥症悲切欲絕狀若神靈用大棗湯大棗十枚小麥一升甘草一兩每服一兩大抵悲泣欲絕自係心家熱狀若神靈自係肝家病所謂肝虛見鬼也小麥涼心而養心氣別錄亦云養肝氣雖以大棗名湯實小麥之功

〔又曰〕凡治吐血衄血宜生用生則性涼其性又能補滲漏也

熨折傷處止痛散血 藏器 亦熨手足風濕痹痛寒濕脚氣互熨至汗出良末服止虛汗 時珍

發明〔時珍曰〕素問云麥屬火心之穀也孫真人云麥養心氣其功除煩止渴收汗利溲止血皆心之病也〔又曰〕麩乃麥皮也與浮麥同性而止汗之功次於浮麥凡人身體疼痛及瘡瘍腫爛沾漬及小兒暑月出痘潰爛不能着席者並用夾紬盛麩作褥藉臥性涼而軟誠妙法也

方 中暍 井華水和麩一大撮服之 千金方 吐血 飛羅麩略炒以陳墨汁或藕節汁調服二錢 醫學集成 大衄血出 口耳皆出者用白麩入鹽少許冷水調服三錢 普濟 虛汗盜汗 浮小麥炒為末煎湯代茶飲 產後虛汗 麥麩牡蠣等分為末肉汁調服二錢日二 寒痢白色 炒麩每以方寸匕入粥中食之能治日瀉百行師不能救者 外臺 金瘡

血出不止用生麪傳五七日即愈 蘭氏經驗

折傷瘀損白麪梔子同搗以水調傅即散

老人五淋身熱腹滿小麥一升通草二兩水三升煮一升飲之即愈 奉親書

麥粉即今洗麪筋澄出之粉今人漿衣多用之

甘凉和五臟調經絡炒一合湯服斷下痢 孟詵 醋熬成膏消一切癰腫湯火傷 時珍

發明時珍曰古方鮮用按萬表積善堂方云烏龍膏治一切癰腫發背無名腫毒初發焮熱未破者取效如神用隔年小粉愈久愈佳以鍋炒之初炒如餳久炒則乾成黃黑色冷定研末陳米醋調成糊熬成如黑漆磁罐收之用時攤紙上剪孔貼之即如氷冷疼痛即止少頃覺痒乾亦不能動久則腫毒自消藥力亦盡而脫落甚妙此方屢有效濟生者宜藏之

〔吊曰〕｜｜能助胃氣上行而資健運鹹能軟堅故祛痰散結〔又曰〕久服消腎氣

麥芽 一名麥蘖

鹹温消食和中別錄破冷氣去心腹脹滿藥性開胃止霍亂除煩悶消痰飲破癥結催生落胎日華補脾胃虛寬腸下氣腹鳴者用之元素消化一切米麪諸果食積時珍

發明〔好古曰〕｜｜神曲二藥胃氣虛者宜服之以代戊己胃為戊土脾為己土腐熟水穀豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五味為之使〔時珍曰〕｜｜穀芽皆能消導米麪諸果食積觀造餳者用之可類推矣但有積能消化無積而久服則消元氣不可不知久服者須同白术諸藥則無害

方 快膈進食｜｜四兩神曲二兩白术橘皮各一兩為細末蒸餅丸梧子大人參湯下五十丸 産後腹脹不通轉氣急坐卧不安以｜｜一合為末和酒服良久通轉神驗肘後

昂曰薛立齋治一婦人喪子乳脹欲成癰用||一二兩炒煎服立消其破血散氣之功如此良方云神曲亦善下胎皆宜酌用

時珍曰脾之穀

鳴泉曰即今黃小米之粘者古方半夏秫米湯用此

鳴泉曰婦人白帶黃米作粥同雞子煮食神效又曰||性溫曰微寒曰平似不確

穀菜部

兵部手集

産後青腫 乃血水積也乾漆大||等分為末新瓦中鋪漆一層||一層重重令滿鹽泥固濟煆赤研末熱酒調服二錢産後諸疾皆宜 婦人經驗

産後秘塞 五七日不通不宜妄服藥宜用大||一兩炒為末用沸湯調下三錢與粥間服 婦人良方

妊娠去胎 甚驗 ||一升蚕一升煎服下胎神驗 外臺

産後回乳 産婦無子食乳乳不消令人發熱發寒用大||二兩炒為末每服五錢白湯下甚良 丹溪纂要

秫

又名糯粟 唐本 黃糯

集解 禹錫曰|米似黍米而粒小 宗奭曰|米初擣出淡黃白色最粘故宜作酒 時珍曰|即梁米粟米之粘者有赤黃白三色皆可釀酒熬糖作餈糕食

秫米 甘微寒 詵曰平 時珍曰養生集云味酸性熱粘滯易成黃積病不宜多食 治

秫米 四十一

鳴皋曰半夏能通陰陽〻不能入陰〻不能攝陽故不眠通則眠矣靈樞丨丨半夏湯用之者以制半夏之烈也其得眠者仍係半夏通陰陽之功未必丨丨益陰氣之力

寒熱利大腸療漆瘡 別錄 生搗和雞子白傅腫毒 孟詵 治肺瘧及陽盛陰虛夜不得眠及食鶩鴨成瘕孕婦下黃水 時珍

發明 時珍曰丨丨肺之穀也肺病宜食之故能去寒熱利大腸大腸者肺之合而肺病多作皮寒熱也千金治肺瘧方用之取此義也靈樞經岐伯治陽盛陰虛夜不得眠半夏湯中用之取其益陰氣而利大腸也大腸利則陽不盛矣方見半夏條又異苑云有人食鴨成瘕醫用丨丨研粉調水服之須臾煩躁吐出一鴨雛而瘥也千金方治食鴨成病胸滿面赤不能食丨丨湯一盞飲之

方 肺瘧寒熱 痰聚胸中病至令人心寒〻甚乃熱善驚如有所見常山三錢甘草半錢丨丨三十五粒水煎未發時分作三次服 千金 妊娠下水 黃色如膠或如小豆汁丨丨黃

頤泉曰｜｜北人常以作飯食乃云大脫元氣未見其害如此也至云能鍊腸胃滓滯亦未見其功如此大抵書言多太過者未可盡執也惟貽頭風有效一婦偏頭風痛不可忍醫以｜｜麫茶葉末細辛調貼

穀菜部

各一兩水七升煎三升分三服 梅師

蕎麥 又名荍(音翹)麥 烏麥 吳瑞

甘平寒 思邈曰 微寒 實腸胃能鍊五臟滓穢 孟詵 作飯食壓丹石毒甚良 蕭炳 以醋調粉塗小兒丹毒赤腫熱瘡 吳瑞 降氣寬腸磨積滯消熱腫風痛除白濁白帶脾積泄瀉以沙糖水調炒麫二錢服治痢疾炒焦熱水衝服治絞腸沙痛 時珍

發明 時珍曰｜｜最降氣寬腸故能鍊腸胃滓滯而治濁帶泄痢腹痛上氣之疾氣盛有濕熱者宜之若脾胃虛寒人食之則大脫元氣而落鬚眉非所宜矣按楊起簡便方云肚腹微微作痛出即瀉瀉亦

之遂愈又一婦偏頭痛予教以||麪貼
太陽次日痛稍減而兩目俱赤去之目乃
愈大抵此物能拔熱毒氣外出太陽穴與
目近故火毒外出而牽連於目也回思痘
瘡毒陷漿回者用此貼之或可拔出或加
蓖麻子必應有效當勝於今之貼紫草黃
蠟膏也

不多日夜數行者用||麪一味作飯連食三四次
即愈予壯年患此兩月瘦怯尤甚用消食化氣藥俱
不效一僧授此而愈轉用皆效此可徵其鍊積滯
之功矣普濟治小兒天吊及歷節風方中亦用之
方

咳嗽上氣 ||麪四兩茶末二錢生蜜二兩水一椀順手攪千下飲之良久氣下不止即愈 儒門事親

十種水腫 欵生大戟一錢||麪二錢水和作餅炙熟為末空心茶服以大小便利為度 聖惠

瘧疽發背 ||麪硫黃各二兩為末井華水和作餅晒收之每用一餅磨水傅之痛則令不痛不痛則令痛即愈 直指

瘡頭黑凹 ||麪煮食之即起 同上

湯火傷 ||麪炒黃研末用水和傅如神 奇效方

蛇盤瘰癧 圍接項上用||炒去殼海藻白僵蚕炒去絲等分為末白梅浸湯取肉減半和丸綠豆大每服六七十丸食後臨卧米飲下日五服其毒當從大便泄去若與淡菜同服尤好忌豆腐雞羊酒麪 阮氏方

頭風畏冷 人一

頭風首裹重綿三十年不愈以｜｜粉二升水調
作二餅更互合頭上微汗即愈　李樓怪症奇方

薏苡仁　又名解蠡（音禮）本經　芑實（音起）別録　贛米（音感）別録　簳珠　陶氏　穈米　雷氏　回回米　救荒本草　薏珠子　圖經

甘微寒　平　［詵曰］治筋急拘攣不可屈伸久風濕痹下氣久服輕身　本經　除筋骨中邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食　別録　主不饑溫氣煮飲止消渴殺蚘蟲　藏器　治肺痿肺氣積膿血欬嗽涕唾上氣煎服破毒腫　甄權　去乾濕脚氣　孟詵　健脾益胃補肺清熱去風勝濕利小便治熱淋　時珍

發明　［宗奭曰］｜｜｜本經云微寒主筋急拘攣拘攣有兩等素問註中大筋受熱則縮而短故攣急

［穌頌曰］補肺［時珍曰］陽明胃藥也虛則補其母故肺痿肺癰用之

［杲曰］厥陰風木主筋然治筋骨之病以陽明為本陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利

機關者也陽明虛則宗筋縱弛故經曰取痿獨取陽明又曰肺熱葉焦發為痿躄蓋肺者相傳之官治節出焉陽明濕熱上蒸于肺則肺熱葉焦氣無所主而失其治節故痿躄｜｜｜理脾而兼清熱補肺又曰筋寒則急熱則縮濕則縱然寒濕久留亦變為熱又有熱氣熏蒸水液不行久而成濕者｜｜仁去濕要藥曰寒曰熱者皆可用也衍義云曰寒筋急者不可用恐不然

不伸此是因熱而拘攣也故可用｜｜｜若素問言因寒則筋急者不可更用此也蓋受寒使人筋急寒熱使人筋攣若但受熱不曾受寒亦使人筋緩受濕則又弛長無力也此藥力勢和緩凡用須加倍即見效震亨曰寒則筋急熱則筋縮急因於堅強縮因於短促若受濕則弛弛則引長然寒與濕未嘗不挾熱三者皆因於濕然外濕非內濕啓之不能成病故濕之為病因酒而魚肉繼之甘滑陳久燒炙并辛香皆致濕之因也時珍曰｜｜｜屬土陽明藥也故能健脾益胃虛則補其母故肺痿肺癰用之筋骨之病以治陽明為本故拘攣筋急風痺者用之土能勝水除濕故泄瀉水腫用之按古方小續命湯註云中風筋急拘攣語遲脉弦者加｜｜｜亦扶脾抑肝之義後漢書馬援在交趾嘗餌｜｜｜云能輕身省欲以勝瘴氣也又張師正倦遊錄云辛稼軒忽患疝疾重墜大如盃一道人教以薏珠用東壁土炒過水煮為膏服數服即消程沙隨病此稼軒授之亦效頌曰｜｜｜心肺之藥多用之故范汪治肺癰張仲景治風濕

胸痺並有方法濟生方治肺損咯血以熟猪肺切蘸
｜｜｜末空心食之｜｜｜補肺猪肺引經也趙君
猷言屢
用有效

方
風濕身痛
日晡劇者仲景麻黃杏仁｜｜｜湯
主之麻黃三兩杏仁二十枚甘草｜
｜｜各一兩以水四升煮
取二升分兩服　金匱
水腫歇急
郁李仁二兩研
以水濾汁煮｜
｜｜飯日二食
之獨行方
沙石熱淋
痛不可忍用｜｜｜子葉
根皆可用水煎熱飲夏冷
飲以通為度
見楊氏經驗方
消渴飲水
｜｜｜煮粥
湯恣飲之
周痺緩急
偏
者
｜｜｜十五兩大附子十枚
炮為末每服方寸匕　仲景
肺痿咳唾膿血
｜｜｜
十兩杵
碎水三升煎一升入
酒少許服　梅師
肺癰咯血
心胸甲錯者醇苦酒
煮令濃微溫頻服肺
有血當吐出
愈　范汪方
喉生癰腫
吞｜｜｜二
枚　外臺

薏苡仁　黑大豆

卌四

時珍曰———腎之穀入腎功多

嗚皋曰生平煮寒之說似不可信煮食者多如果甚寒食者何以未見其患寒也凡米穀類生食無不寒何黑豆獨生平熟寒乎生研能傅瘡毒寒可知也自是生寒熟平

昂曰———功在補腎其能鎮心腎水足則心火寧也其能明目腎水足則目明也其治脚弱腎强則骨健也豆淋酒善於袪風故治風痙口噤産後風等症又善破瘀故治産後諸疾甘豆湯制諸風熱又善解毒豆淋酒兼能發表散五臟結積之內寒

黑大豆

甘平 藏器曰———生平炒食極熱煮食甚寒作豉極冷造醬及生黃卷則平牛食之溫馬食之冷一體之中用之數變 久服令人身重生研塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛 本經 逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭毒 別錄 煮食治瘟毒水腫 唐本 調中下氣通關脉制金石藥毒牛馬瘟毒 日華 煮汁解礬石砒石甘遂烏附射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒及蠱毒入藥治下痢臍痛衝酒治風痙及陰毒腹痛牛胆貯之止消渴 時珍 炒黑投酒中飲之治風痺癱瘓口

希雍曰同益母草澤蘭稀木人參牛膝荊芥生地童便蒲黃治産後血暈悶絶　同蔓荊子土茯苓銀花甘菊元參川芎天麻芽茶荊芥烏梅治偏頭風痛有神

又曰大豆豉同密蒙花穀精草川連木賊草決明菊花銀花生地羚羊角羊肝治小兒痘目翳

噤産後頭風食罷生吞去心胸煩熱〻風恍惚明目鎮心藏器主中風脚弱産後諸疾同甘草煮湯飲去一切熱毒氣治風毒脚氣同桑柴灰汁煮食下水鼓腹脹和飯擣塗一切毒腫孟詵治腎病利水下氣制諸風熱活血解諸毒時珍

之才曰惡五參龍胆得前胡烏喙杏仁牡蠣諸胆汁良詵曰忌猪肉小兒以炒豆猪肉同食必壅氣致死十有八九十歳以上不畏也時珍曰服蓖麻子者忌炒豆犯之脹滿致死服厚朴者亦忌之犯之動氣用者宜

愼

發明頌曰仙方脩治服之可辟穀然多食令人體重甄權曰每食後吞三十粒令人長生初服時似

身重一年以後便覺身輕又益陽道也」頴曰陶華以
丨丨丨入盐煮常時食之云能補腎盖豆乃腎之穀
形類腎而又黑色通腎引之以盐所以妙也」時珍曰
李守愚每晨水吞黑豆二七粒到老不衰夫豆有五
色各治五臓惟黑豆属水性寒為腎之穀入腎功多
故能治水消脹下氣制風熱而活血解毒所謂同氣
相求也又古方稱大豆解百藥毒予試之大不
然又加以甘草其驗乃奇如此之事不可不知

方

炒豆紫湯

蘓頌曰古方有紫湯破血去風除氣除熱産後兩日尤宜服之丨丨丨五
升清酒一斗炒令烟出投酒中待酒紫赤色去豆量
性服之可日夜三盞神效中風口噤加雞矢白二升
和炒浸之

豆淋酒

魏氏曰治産後百病或血熱覺有餘血
水氣或中風困篤或背强口噤煩熱瘈
瘲口渴或身頭皆腫或身痒嘔逆或手足頑痺頭旋
目眩此皆虚熱中風也丨丨丨三升炒熟至微烟出
以酒五升沃之瓶封一日以上服酒一升温覆令少
汗即愈口噤者加獨活半斤打破同沃之産後宜服

以防風氣又消結血

中風口喎 方同上

頭風頭痛 即上方密封七日溫服 千金

破傷中風 口噤上方溫服取汗 千金方

暴得風疾 四肢攣縮不能行取｜｜｜三斗洗蒸以醋二升傾入瓶中鋪於地上設席豆上令病人卧仍重蓋衣被五六層豆冷漸〻却衣被仍令一人於被内引挽攣急處更蒸豆再作併飲荆瀝湯如此三日三夜即休 崔氏纂要

風入臟中 治新久腫風入臟中以｜｜｜一斗水五斗煮一斗二升去滓入好酒斗半煎取九升但服取汗其效如神 千金翼方

風毒攻心 煩躁恍惚大豆半升洗淨水二升煮七合食後服 心鏡

卒風不語 ｜｜｜煮汁煎稠如飴含之并飲汁 肘後方

喉痺不語 方同上 千金

陰毒傷寒 危篤者黑豆炒焦投酒熱飲或灌之吐則復飲汗出為度效 居家必用

腸痛如打 ｜｜｜半升炒焦入酒一升煮沸取醉 肘後

腸脇卒痛 方同上

脚氣冲心 黑大豆

煩悶不識人丨丨丨一升水三升煮濃汁服未定再服　廣利

身面浮腫千金用丨丨丨一升水五升煮汁三升入酒五升更煮三升分服不瘥再服○百一選方云烏豆煮至皮乾為末每服二錢米飲下吳內翰女忽發腫檢外臺得此方服之立效

新久水腫丨丨丨一斗水一斗煮取八升去豆入薄酒八升再煎取八升服之再三服水當從小便出　范汪方

霍亂脹痛丨丨丨生研水服方寸匕　普濟方

水痢不止丨丨丨炒一升白朮半兩為末每服三錢米飲下　指南

赤白痢臘月猪胆盛黑豆入內入射香少許陰乾每用五七粒為末生薑湯服　奇效

男子便血丨丨丨一升炒焦研末熱酒淋之去豆飲酒神效　治人心統

小兒沙淋黑豆一百二十粒生甘草一寸煮熟入滑石末乘熱飲之良　全幼心鑑

腎虛消渴難治者丨丨丨炒天花粉等分為末糊丸梧子大黑豆湯下七十丸日二名救活丸　普濟方

消渴飲水黑豆納牛

〔鳴皋曰〕豆性俱能傅腫毒一外科云凡遇腫毒以生黄豆研末調傅最效古方又有用赤小豆芋根傅腫毒由此推之則黑豆傅瘡亦必效也豌豆綠豆俱傅癰毒方見後

胆中陰乾百日｜｜二合炒熟炙甘草呑之效　肘後

疫癘發腫　｜｜一錢水一盞煎汁時時飲之夷堅志云靖康二年京師大疫有人書此方於壁間用之立效

墮墜折傷　瘀血在腹氣短大豆五升水一斗煮汁二升頓服劇者不過三作　千金

痘瘡煩躁　黑豆煮汁飲之佳　子母秘錄

痘瘡濕爛　｜｜｜研末傅之

小兒頭瘡　｜｜炒存性研水調傅之　普濟

月經不斷　用前紫湯服之佳

子死腹中　月數未足母欲悶絶者｜｜｜三升醋煮濃汁頓服立出　産乳

胞衣不下　大黑豆半升醇酒三升煮一升半分服　産書

肝虚目暗　迎風下涙用臘月牛胆入黑豆陰乾每夜服三七粒效　龍木論

小兒胎熱　黑豆二錢甘草一錢燈心七寸竹葉一片水煎　全幼心鑑

一切腫毒　生研塗之　居

辟禳時氣　新布袋盛黑豆一斗納井中一夜取出每服七粒佳　領要

大豆黄卷

〔思邈曰〕宜腎〔宣明方曰〕補腎氣

大豆黄卷 又名豆蘖〔弘景曰〕浸黑豆生芽五寸乾之炒用〔時珍曰〕一法壬癸日以井華水浸大豆候生芽取皮陰乾用

甘平治濕痺筋攣膝痛 本經 主五臟不足胃氣結積 別錄 破婦人惡血 孟詵 宜腎 思邈 除胃中積熱消水病脹滿 時珍

〔普曰〕得前胡杏仁牡蠣烏喙天雄〻鼠屎共蜜和良惡海藻龍胆〔頌曰〕古方蓐婦藥中多用之

方 大豆蘖散 治周痺邪在血脉中木痺不痛上下周身故名此藥主五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣用大豆蘖一斤炒香為末每服半錢溫酒調下日三服 宣明方

頭風濕痺 筋攣膝痛胃中積熱大便結濇黄卷散用〡〡〡〡炒一升酥半兩為末食前溫水服一一匙日二服 普濟方

水病腫滿 喘急大小便澀〡〡〡〡醋炒大黄炒等分為末蔥橘皮湯下二錢

時珍曰｜｜主脾胃

以利為度 聖濟 小兒撮口 初生豆芽研絞汁和乳灌少許良 普濟

穭豆 時珍曰穭乃自生稻名也此豆原是野生故名今人亦種之矣

集解 藏器曰｜｜生田野小而黑堪作醬 時珍曰此即小黑豆也小科細粒霜後乃熟

甘溫去賊風風痺婦人產後冷血炒令焦黑及熱投酒中漸漸飲之 藏器

豌豆 又名胡豆 拾遺 戎菽 爾雅 畢豆 唐史 青小豆 千金

甘平治消渴淡煮食之良 藏器 治寒熱熱中除吐逆止泄痢澼下利便腹脹滿 思邈 調營衛益中平氣煮食下乳汁 吳瑞 煮食殺鬼毒心病解乳石毒發研末塗癰

穭豆 刀豆 四十八

鳴泉曰凡豆生用無不解毒

時珍曰｜｜益腎

腫痘瘡作澡粉去䵟黵 時珍

發明〔瑞曰〕多食發氣病〔時珍曰〕｜｜屬土故其所主病多係脾胃元時飲膳每用此搗去皮同羊肉治食云能補中益氣

方 四聖丹 治小兒痘疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此症十死八九惟牛御史得秘方點之最妙用｜｜四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四粒炒研為末以油胭脂同杵成膏先以簪挑疔破咂去惡血以少許點之即時變紅活色 服丹石毒 ｜｜半升研以水八合絞汁飲即愈 外臺方 霍亂吐利 ｜｜三合香薷三兩為末用水三盞煎一盞分服 聖惠

刀豆

甘平溫中下氣利腸胃止呃逆益腎補元 時珍

時珍曰｜｜｜心之穀也性下行通小腸

發明時珍曰｜｜本草不載近小書載其暖而補元陽也又有人病呃逆不止聲聞鄰里或令取｜｜子燒存性白湯調服二錢即止此亦取其下氣歸元而逆自止也

赤小豆時珍曰此豆以緊小而赤黯色者入藥其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病

甘酸平思邈曰甘鹹冷下水腫排癰腫膿血本經療寒熱熱中消渴止洩痢利小便下腹脹滿吐逆卒澼別錄治熱毒散惡血除煩滿通氣健脾胃令人美食搗末同雞子白塗一切熱毒癰腫煮汁洗小兒黃爛瘡不過三度甄權縮氣行風堅筋骨抽肌肉久食瘦人士良散氣去關節煩熱令人心孔開暴痢後氣滿不能食者煮食一

頓即愈和鯉魚煮食甚治脚氣孟詵解小麥熱毒煮汁解酒病日華辟瘟疫治產難下胞衣通乳汁和鯉魚鯽魚黄雌雞煮食並能利水消腫時珍

惡 遯曰合魚鮓食成消渴作醬同飯食成口瘡

發明 弘景曰——逐津液利小便久服令人肌膚枯燥 頌曰水氣脚氣最為急用有人患脚氣以袋盛此豆朝夕踐踏展轉之久久遂愈 好古曰治水者惟知治水而不知補胃則失之壅滯———消水通氣而健脾胃乃其藥也 藏器曰———和桑白皮煮食去濕氣痹腫和通草煮食則下氣無限名脫氣丸 時珍曰———小而色赤心之穀也其性下行通乎小腸能入陰分治有形之病故行津液利小便消脹除腫止吐而治下痢腸澼解酒病除寒熱癰腫排膿散血而通乳汁下胞衣產難皆病之有形者久服則

降令太過津血滲泄所以令人肌瘦身重也其吹鼻
瓜蒂散及辟瘟疫用之亦取其通氣除濕散熱耳又
陳自明婦人良方云予婦食素產後七日乳脉不行
服藥無效偶得｜｜｜一升煮粥食之當夜遂行又
朱氏集驗方云宋仁宗在東宮時患痄腮道士贊寧
取｜｜七〻粒咒之為末傅之而愈中貴任承亮見
之後承亮患惡瘡或投以藥立愈叩其方乃｜｜｜
始悟道士之咒偽也予苦腸疽旣至五臟醫以藥治
之甚驗適承亮見之曰得非｜｜｜耶醫謝曰某用
此活三十人願勿復言有僧發背如爛瓜鄰家乳媪
用此治之如神此藥治一切瘡不拘善惡水調塗之
無不愈者但性粘乾則難揭入苧根末即不粘尤佳

方　水氣腫脹　蘓頌用｜｜｜五合大蒜一顆生薑
五錢商陸根一條並碎切同水煮爛
去藥食豆旋〻啜汁令盡即腫消也○韋宙獨行方
治水腫從脚起入腹則殺人｜｜｜一斗煮極爛取
汁五升漬足膝若已入腹但食｜｜｜勿雜食亦愈
○梅師治水腫取東行花桑枝燒灰一升淋汁煮豆

一升代飯良

水蠱腹大　動搖有聲皮膚黑者用丨丨丨三升白茅根一握水煮食豆　肘後

傷寒狐惑　狐惑病脉數無熱微煩默默但欲卧汗出初得三四日目赤如鳩七八日目四眥皆黃黑若能食者膿已成也赤豆當歸散主之丨丨丨三升水浸令牙出當歸三兩為末漿水服方寸匕日三　金匱

下部卒痛　如鳥啄之狀用小豆大豆各囊盛蒸熟更互坐之即止　肘後方

水穀痢疾　丨丨丨一合鎔蠟三兩頓服取效　必效方

腸痔下血　丨丨丨三升苦酒五升煮熟日乾日浸至酒盡乃止為末酒服一錢日三　肘後方

熱淋血淋　丨丨丨三合慢炒為末葱一莖擂酒熱調服二錢　脩真秘旨

重舌鵝口　丨丨丨末醋和塗　普濟

中酒嘔逆　丨丨丨煮汁徐徐飲之　食鑑本草

頻致墮胎　小豆末酒服方寸匕　千金

妊娠行經　同上

產難　產寶用丨丨丨生吞七粒佳○集驗方治產難日久氣乏用丨丨丨一升煮

時珍曰丨丨脾之穀也入太陰氣分

鳴皋曰丨丨常食之物殊不覺其微寒當以性平為是炒食當溫生嚼當微寒

鳴皋曰丨丨之功不過除濕消暑耳余最忌食之偶食一椀則中宮壅滯終日不飢雖曰人之脾胃有各不相宜之藥然其下氣及通利三焦之說未知其效也至于暑濕滯於三焦者服之則暑濕去而三焦利

穀菜部

汁入炙黃明膠一兩同煎少時一服五合不過三四服即産 胞衣不下丨丨丨男七枚女二七枚東流水呑之 救急方 産後目閉心悶丨丨丨生研東流水下方寸匕 肘後 産後悶滿不能食用丨丨丨二七粒燒研冷水服 千金方 乳汁不通方見發明 一切瘧疸 丹毒疳腮雞子白調傅隨手即消入芙蓉葉末在內尤妙 金瘡煩滿丨丨丨苦酒浸一日炒乾再浸滿三日令黑色為末每服方寸匕日三服 千金

扁豆

又名藊豆 別錄 蛾眉豆

時珍曰白者入藥

甘微溫 詵曰微寒 和中下氣 別錄 補五臟主嘔逆 孟詵 療霍亂吐利不止研末和醋服之 蘇恭 行風氣治女子帶下鮮應生研用 酒毒河豚魚毒 蘇頌 解一切草木毒 解毒生用 生嚼及煮汁飲取

扁豆花葉

五十一

耳

〔正〕曰一一功多除濕〻去土强則正氣自壯暑亦濕也故一一能消脾胃之暑但多食壅氣

〔鴻泉〕曰患瘧者但犯扁豆必增甚新愈者必復發陶氏患寒熱不可食當指此也

效 甄權 止泄痢消暑煖脾胃除濕熱止消渴 時珍

發明 〔時珍〕曰硬殼白一一其子充實白而微黃其氣腥香其性溫平得乎中和脾之穀也入太陰氣分通利三焦能化清降濁故專治中宮之病消暑除濕而解毒也其軟殼及黑鵲色者性微涼可供食亦調脾胃〔弘景〕曰患寒熱者不可食

方 消渴飲水 金豆丸白一一浸去皮（恐是生用）為末以天花粉汁同蜜和丸梧子大金箔為衣每服二三十丸天花粉汁下日三服忌炙煿酒色次服滋腎藥 仁存堂

霍亂吐利 一一 香薷各一升水六升煮二升分服 千金

霍亂轉筋 白一一為末醋和服 普濟

赤白帶下 白一一炒為末米飲下二錢

毒藥墮胎 女人服藥墮胎腹痛者生白一一去皮為末米飲下亦可丸服若胎氣已傷未墮者或口噤手強自汗頭低似乎中風九死一生醫多不識作風治必死

〔希雍曰〕——入足陽明胃經

〔鳴皋曰〕——之甘寒在皮故煮至皮裂則力減凡資其甘寒以解毒熱者不宜過煮

〔又曰〕一人因夏晒枕〻未涼即枕之遂患耳內作響百治不效往訪葉天士天士令

穀菜部

俱永類

惡瘡痂癢作痛以白——搗封痂落即愈肘後方

中砒毒——生研絞汁灌之永類方

白扁豆花 解一切藥毒垂死功同扁豆時珍

方 血崩不止————焙為末空心炒米煮湯入鹽少許調下二錢即效奇效

葉治霍亂吐下不止吐下後轉筋生搗汁入少醋絞汁服立瘥蘇恭

綠豆

甘寒〔蔵器曰〕用宜連皮去皮則令人少壅氣蓋皮寒而肉平也 煮食消腫下氣壓熱解毒生研絞汁服治丹毒煩熱風疹及藥石發動

以——皮作枕、之遂愈此意亦本於日華

［希雍曰］熱客陽明則發風疹胃主肌肉故也陽明熱解則風疹除矣

熱氣奔豚開寶治寒熱、中止瀉痢卒澼利小便脹滿思邈厚腸胃作枕明目治頭風頭痛除吐逆日華補益元氣調和五臟安精神行十二經絡去浮風潤皮膚宜常食之煮汁止消渴孟詵解一切藥草牛馬金石毒寗原治豆毒利脹腫時珍

［時珍曰］反榧子殺害人合鯉魚鮓食久則令人肝黃成渴病

發明［時珍曰］——解金石砒霜草木一切諸毒宜連皮生研水服夷堅志云有人服附子酒多頭腫如斗唇裂血流急求——黑豆各數合嚼食并煎湯飲之乃解

方 痘後癰毒初起以三豆膏治之神效——黑豆赤小豆等分為末醋調時時掃塗

醫學正傳 **小兒丹毒** 丨丨五錢大黃二錢為末用生薄荷汁入蜜調塗 全幼心鑑 **赤痢不止** 以火麻仁水研濾汁煮丨丨食極效 必效 **老人淋痛** 丨丨丨升橘皮二兩煮豆粥下麻子仁汁一升空心漸食之并飲汁效 養老書 **消渴** 丨丨煮汁飲 普濟 **多食易饑** 丨丨黃麥糯米各一升炒熟磨粉每以白湯服一杯三五日見效 **十種水氣** 用丨丨二合半大附子一枚去皮臍切作兩片水三椀煮熟空心卧時食次日將原附子切四片再以丨丨如常煮食第三日別以附子丨丨如前煮法水從小便出腫自消未消再服忌生冷毒物鹽酒六十日效 朱氏集驗 **扁鵲三豆飲** 治天行豆瘡預服此飲疎解熱毒縱出亦少用丨丨赤小豆黑大豆各一升甘草節二兩以水八升煮極熟任意食豆飲汁七日乃止○一方加黃大豆白大豆名五豆飲

綠豆粉 甘涼平解諸熱益氣解酒食諸毒治發背

癰疽及湯火傷（吳瑞）痘瘡潰爛不結痂者以此撲之良

寗原 新水調服治霍亂轉筋解諸藥毒死心頭尚溫者

時珍

發明 時珍曰丨丨屬水通於厥陰陽明其性平消腫治疸之功雖同赤小豆而清熱解毒之力過之且益氣厚腸胃通經脈無久服枯人之忌外科治癰疽有內托護心散極言其神效丹溪有論發揮震亨曰外科精要謂內托散一日至三日進十數服可免毒氣內攻臟腑竊謂丨丨解丹毒治石毒味甘入陽明性寒能補為君以乳香去惡腫入少陰性溫善竄為佐甘草性緩解五金八石百藥毒為使想此方專為服丹石發疽者設也若夫年老者病深者證備者體虛者丨丨雖補將有不勝其任之患五香連翹湯亦非必用之劑必當助氣壯胃使根本堅固而行經活血為佐參以經絡時令使毒氣外發此則內托之

本意治施之早可以內消也

方 **護心散** 又名內托散又名乳香萬金散凡有癰疽一日至三日之內連服十餘劑方免變症使毒氣出外服之稍遲毒內攻或嘔吐或鼻生瘡菌不食即危矣四五日後亦宜間服綠豆粉一兩乳香半兩燈心同研和勻以生甘草濃煎調下一錢時時呷之若毒沖心有嘔逆之症大宜服此服至一兩則香徹瘡孔真聖藥也 李立嗣

瘡氣嘔逆 綠豆粉三錢乾胭脂半錢研勻新汲水調服立止 普濟方

霍亂吐利 綠豆粉白糖各二兩新汲水調服 生生編

打撲損傷 一人誦觀音經甚誠出行折一足夢僧授一方｜｜新銚炒紫色井水調厚傅紙貼杉木扎定其效如神 澹寮方

綠豆皮 甘寒解熱毒退目翳 時珍

方 通神散 治班瘡生翳｜｜｜菊花穀精草等分

為末每用一錢乾柿餅一箇同煮食柿

日三五服

直指方

豆豉 藏器曰入藥用無塩者 時珍曰以黑豆造者入

藥外臺秘要造淡｜｜法用黑大豆二三斗六

月内淘淨水浸一宿瀝乾蒸熟取出攤席上候微温

蒿覆每三日一看候黃衣上遍不可太過取晒簸淨

以水拌乾濕得所以汁出指間為準安甕内築實桑

葉厚蓋三寸泥密封於日中晒七日取出晒一時又

以水拌入甕如此七次再蒸過

攤去火氣甕收築封即成矣

苦寒 思邈曰苦甘寒濇 治傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿

悶虛勞喘吸兩脚疼冷殺六畜胎子諸毒 別録 治時疾

熱病發汗熬末能止盜汗除煩生擣為丸服治寒熱

鳴皋曰一一升散頗有力一庖人患傷寒身痛無汗予與羌防湯二劑不汗乃去羌防用一一佐以桔梗杏仁遂大汗

鳴皋曰傷寒發汗一方指傷寒言之故可加葛根麻黄若誤認瘟疫為傷寒加入葛根麻黄斯大謬矣若梔豉湯雖瘟疫亦可用

風胸中生瘡煮服治血痢腹痛研塗陰莖生瘡 藥性 治瘴疾骨蒸中毒藥蠱氣犬咬 大明 下氣調中治傷寒溫毒發斑嘔逆 時珍

發明 弘景曰春夏之氣不和蒸炒以酒漬服之至佳患脚氣人常漬酒飲之滓傅患處皆瘥○蘇頌曰古今方書用一一治病最多江南人善作之凡時氣即先用葱豉湯取汗往往便瘥 時珍曰一一調中下氣黑豆性平作豉則溫既經蒸署故能升能散得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟又能止汗亦麻黄根節之義

方 傷寒發汗 肘後方云傷寒有數種庸醫卒不能分别者今取一藥兼治之初覺頭痛身熱脉洪一二日便以葱豉湯治之葱白一虎口一一一升水三升煮一升頓服取汗不汗更作加葛根

若再不汗加麻黃〇又方豉一升童便三升煎一升分服取吐取汗

傷寒不解 己三四日胸中悶惡者豉一升鹽一合水四升煮升半分服取吐此秘法也 梅師方

傷寒懊憹 吐下後心中懊憹大下後身熱不去心中痛者並用梔子豉湯吐之大梔子十四枚水二盞煮一盞入豉半兩同煮至七分服得吐止後服 傷寒論

傷寒暴痢 藥性論曰以豉一升薤白一握水三升煮薤熟納豉更煮色黑去豉分作二服

血痢不止 用｜｜大蒜等分杵丸梧子大每服三十丸鹽湯下 王氏愽濟方

血痢如刺 ｜｜一升水浸煎兩沸絞汁頓服不瘥再作 藥性

赤白重下 葛氏用豆豉炒微焦以水溫汁服甚驗〇外臺 用｜｜炒末一升分四服酒下入口即斷也

臟毒下血 烏犀散淡豆豉十文大蒜二枚煨同搗丸梧子大煎香菜湯下二十丸日二服安乃止永除根〇彭大祥云此方甚妙大蒜九蒸更佳以冷虀水下嘗見數十年之疾得此方永不復作也 究原

方

小便血條 淡｜｜煎湯空心飲 危氏

瘧疾寒熱 ｜｜煮飲數升得大吐愈 肘後方

齁歔痰積 天陰便發坐卧不得飲食不進乃肺竅久積冷痰也用此一服即愈服七八次即出惡痰藥性亦隨出即斷根矣方詳砒霜下

風毒膝攣 骨節痛｜｜九蒸九晒浸酒隨飲食 醫心鏡

咽生瘜肉 鹽豉和搗塗之刺破乃用神效 聖濟

口舌生瘡 用焦豉末含一宿即愈 聖惠方

墮胎下血 煩滿豉一升水煮汁調服鹿角末方寸匕 子母秘錄

妊娠胎動 ｜｜炒煎汁服 同上

一切惡瘡 ｜｜為末傅之不過三四次 楊氏產乳

蹉跌破傷 傷筋骨豉三升水三升漬濃汁飲止心悶 千金

打傷瘀聚 ｜｜一升煮飲不瘥再作 千金

腫從脚起 豉汁飲之滓傅患處 肘後

解一切食物藥毒 煮汁飲

昂曰補肺氣益肝腎色黑者入腎栗色者名鱉蝨胡麻尤佳

昂曰能涼血故治風能解毒故傳頭瘡劉河間云麻本穀而治風又云治風先治血血活則風散胡麻入肝益血故風藥中不可闕也鄭奠一用鱉蝨胡麻佐苦參蒺藜治大瘋疥癩屢有愈者

又曰性滑腸與白术同用為勝

脂麻俗作芝麻又名巨勝本經油麻食療胡麻別錄時珍曰胡麻即脂麻也按本經胡麻一名巨勝諸家承誤啓誤啓疑今肆市間遂以茺蔚子偽為巨勝以黃麻子及大藜子偽為胡麻誤而有誤矣茺蔚子長一分許有三稜黃麻子黑如細韭子味苦大藜子狀如壁蝨及酸棗仁味辛甘並無脂油不可不辨弘景曰以純黑者為巨勝

甘平治虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦本經明耳目耐飢渴療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困別錄潤養五臟補肺氣止心驚利大小腸逐風濕氣遊風頭風治勞氣產後虛羸催生下胎胞白蜜蒸餌治百病日華炒食不生風病久食則步履端正語言不

希雍曰得首烏茅朮茯苓菖蒲桑葉牛膝當歸川斷地黃桑寄生治風濕痺 同菊花天冬黃柏生地首烏柏子仁桑葉牛膝杞子麥冬作丸治似中風半身不遂久服有神驗

鳴皐曰同桑葉為丸名桑麻丸補肝腎去風明目

蹇 李廷飛

牛嚼塗小兒頭瘡煎湯洗惡瘡及婦人陰瘡大效 蘇恭

白者甘寒 原曰 生者性寒炒者性熱滑腸而發病蒸者性溫而補人

胃行風氣通血脉去頭上浮風潤肌肉食後生啖一合終身勿輟又令乳母服之孩子不生病客熱可作飲服生嚼傳小兒頭瘡良 孟詵

發明 弘景曰 胡麻取黑色者九蒸九晒擣餌之斷穀長生蒸不熟令人髮落性與茯苓相宜 時珍曰 胡麻取油白者為勝服食以黑者為良胡地者尤妙取其色黑通腎而潤燥也赤者狀如老茄子殼厚油少但可 食不堪服食唯錢乙治小兒痘瘡變黑歸腎百祥丸用赤丨丨煎湯下蓋亦取其解毒耳又按蘓東坡與程正輔書云凡痔疾宜斷酒肉與盐酪醬菜厚味及粳米飯唯宜食淡麪一味及以九蒸胡麻

脂麻

即黑｜｜同去皮茯苓入少白蜜為麪食之日久氣
力不衰而百病自去痔可漸退此亦長生要訣但易
知而難
行耳
方 小兒急疳 生嚼傅之 外臺 小兒瘰癧｜｜連翹等分 為末頻〻食之
簡便方 疔腫｜｜炒炭針砂等分為末 醋和傅之日三 普濟 瘡不合 烏｜｜ 炒黑研
傅 千金 解蠱毒及 河豚砒石等毒一時無藥急用 清麻油多灌取吐 衛生方 鼻衄
不止 紙撚醮真油入鼻取嚔即愈有人 一夕血盈盆用此而效 普濟 癰疽發背 麻 油
一斤銀器煎二十沸和醇醋二椀分
五次一日服盡毒不內攻 直指 大風熱疾 手足 不遂
用硝石一兩生烏｜｜油二大升同納鐺中以土堲
蓋口紙泥封固細火煎初煎氣腥藥熟則香更以生
｜｜油二大升和合微煎納磁器中用紙屋子生病
人外面燒火發汗日服一大合壯者加倍三七日皰

好古曰手足陽明大腸胃足太陰脾藥也

希雍曰風併於衛則衛實而營虛營者陰也血也經曰陰弱者汗自出一一益血養

穀菜部

瘡皆滅

圖經 瀉熱毒 清麻油一合和雞子二枚芒硝一兩攪服少時即瀉下熱毒甚良 孟詵

髮瘕 外臺云病髮瘕者欲得飲油用油一升入香澤煎之盛置病人頭邊令氣入口鼻勿與飲疲極眠睡出當從口出急石灰粉手捉取抽盡即是髮也初出如不流水中濃菜形○又云胸喉間覺有瘕蟲上下嘗聞葱豉食香此乃髮瘕蟲也二日不食開口而臥以油煎葱豉令香置口邊蟲當出以物引去之必愈

髮瘕腰痛 南史云宋明帝宮人腰痛牽心發則氣絶徐文伯診曰髮瘕也以油灌之吐物如髮引之長三尺能動搖懸之滴盡計惟一髮耳

大麻 又名火麻 日用 黄麻 俗名 漢麻 爾雅翼 雄者名枲麻牡麻 詩疏 雌者名苴麻 同上 苧麻 音字 花名麻蕡 本經 麻勃 時珍

大麻仁 甘平補中益氣久服肥健 本經 治中風汗出

陰使營衛調而風邪去故汗自止也
〔鳴皐曰〕觀千金治産後瘀血不盡金瘡瘀
血在腹中普濟治月經不通諸方自係血
分藥別録破積血復血脉之文可証

逐水氣利小便破積血復血脉乳婦産後餘疾（復脉湯中用之）（別録）下
氣去風痺皮頑令人心歡炒香浸小便絞汁服之婦
人倒産吞二七枚即正（蔵器）潤五臟利大腸風熱結燥
及熱淋多食損血脉滑精氣痿陽氣婦人多食發帶
疾（士良）通乳汁止消渇催生（日華）取汁煮粥去五臟風潤
肺治關節不通（孟詵）利女人經脉調大腸下痢塗諸瘡
癬殺虫取汁煮粥食止嘔逆（時珍）
〔時珍曰〕畏牡蠣白微茯苓普曰先蔵地中者食之殺
人〔宗奭曰〕極難去殻帛包置沸湯中浸至冷出之
懸井中一夜勿令着水取出晒乾
新瓦上挼去殻取仁粒粒皆完

發明

劉完素曰麻木穀也而治風同氣相求也好古曰——手足陽明足太陰藥也陽明病汗多胃熱便難三者皆燥也故用之以通潤也成無己曰脾欲緩急食甘以緩之麻仁之甘以緩脾潤燥宗奭曰仲景麻仁丸所用即此

方

大麻仁酒 治骨髓風毒疼痛不可運動——— 水浸沉者一大升晒乾炒香木臼中擣萬杵如粉分十帖每用一帖取無灰酒一大椀同麻粉入石器中柳槌擂之濾去殼煎至減半空腹服輕者四五帖重者十帖神效 篋中方

大麻仁粥 治風水腹大腰臍重痛不可轉動——— 半斤入水研取汁入粳米二合作粥下葱椒鹽豉食 心鏡

老人風痺法 同上

五淋濇痛法 如上

大便不通法 如上

麻子仁丸 治脾約大便秘小便數——— 二升芍藥半斤厚朴一尺大黄枳實各一斤杏仁一升炒研蜜丸桐子大漿水下十丸不知再加日三

仲景方

產後秘塞 許學士云產後汗多則大便秘難於用藥惟｜｜｜｜粥最穩及老人風秘皆得力也｜｜｜藕子各二合洗淨研細再以水濾汁煮粥分服 本事

老人風秘方 同上

產後瘀血 不盡｜｜｜五升酒一升漬一夜明旦去渣溫服不瘥再服不吐不下不得與男子通一月將養如初 千金方

月經不通 或數月或半年一年者用｜｜｜｜二升桃仁二兩研勻熱酒一升漬一夜溫服 普濟

嘔逆不止 ｜｜｜杵熬水研取汁入鹽少許服立效 外台

虛勞內熱 下焦虛熱骨節煩滿肌肉急大便不利小便數少氣吸吸口燥熱淋｜｜｜五合研水二升煎減半分服 外臺

消渴飲水 日至數斗小便赤澀用｜｜｜｜一升水三升煮三四沸飲數服即愈 肘後

腳氣腫渴 ｜｜｜炒香水研取一升再入水三升煮一升入赤小豆一升煮食赤豆飲汁 同上

腳氣腹痺 ｜｜｜仁一升研酒三升漬三宿溫服大良 俱同

上。**血痢不止**｜｜｜汁煮綠豆空心食極效　俱同上　**小兒痢下**赤白體弱大困者｜｜｜炒研末每漿水下一錢立效　子母秘錄　**金瘡瘀血**在腹中｜｜｜三升葱白十四枚搗熟水九升煮一升半頓服血出不盡再服　千金　**小兒頭瘡**疳瘡｜｜｜研汁和蜜傅之　同上　**大風癩疾**｜｜｜三升淘晒酒一斗漬一夜研取白汁濾入瓶中重湯煮數沸收之每飲一小杯兼服茄根散乳香丸取效　聖惠方

元素曰入足陽明經胃

造釀部

造釀部

神麴 俗作神曲

集解 時珍曰昔人用麴多是造酒之麴後醫乃造一一專以供藥力更勝之葉氏水雲錄云五月五日或六月六日或三伏日用白麪百斤青蒿自然汁三升赤小豆末杏仁泥各三升蒼耳自然汁野蓼自然汁各三升以配白虎青龍朱雀元武勾陳螣蛇六神用汁和麪豆杏仁作餅麻葉或楮葉包罯如造醬黃法待生黃衣晒收之

甘辛溫化水穀宿食癥結積滯健脾胃暖胃 藥性 養胃氣治赤白痢 元素 消食下氣除痰逆霍亂泄痢脹滿諸疾閃挫腰痛者煅過淬酒溫服有效婦人産後欲回

乳者炒研酒服二錢日二甚驗時珍

發明 元素曰入足陽明經凡用須火炒黃以助土氣陳久者良 時珍曰啓微集云｜｜治目病生能發其生氣熟能斂其暴氣也

方 胃虛不剋｜｜半斤麥芽五升杏仁一升炒末蜜丸食後嚼服普濟 壯脾進食 療痞滿暑泄麴朮丸｜｜炒蒼朮米泔浸炒等分糊丸桐子大每米飲下五十丸百一 健胃思食 養食丸治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶腹脇膨脹食減嗜卧口無味｜｜六兩麥芽炒三兩乾薑炮四兩烏梅肉焙四兩為末蜜丸梧子大米飲下五十丸方同上 虛寒反胃 俱和劑局方 產後運絕｜｜炒為末水服方寸匕千金 食積心痛｜｜一塊燒紅淬酒服摘元方

昂曰||破血亦能活血和血

瑞曰釀酒則辛熱有小毒發腸風痔瘻脚氣哮喘痰嗽諸疾

昂曰||燥濕能腐生物故魚肉多用之

造釀部

紅麴

集解 時珍曰||近世始出其法白粳米一石五斗水淘浸一宿作飯分十五處入麴母三斤搓揉令勻併作一處以帛密覆熱即去帛攤開覺溫急堆起又密覆次日日中又作三堆過一時分作五堆再一時合作一堆又過一時分作十五堆稍溫又作一堆如此數次第三日用大桶盛新汲水以竹籮盛麴作五六分蘸濕完又作一堆如前法作一次第四日如前又蘸若麴半沉半浮再依前法作一次又蘸若盡浮則成矣取出日乾收之其米過心者謂之生黃入酒及鮓醢中鮮紅可愛未過心者不佳

入藥陳久者良

甘溫消食活血健脾燥胃治赤白痢下水穀 震亨 **釀酒**

破血行藥勢殺山嵐瘴氣治打撲損傷 吳瑞 **治女人血**

不特取其色也

氣痛及產後惡血不盡擂酒飲之良 時珍

發明〔時珍曰〕人之水穀入胃受中焦濕熱熏蒸游溢精氣日化為紅散布臟腑經絡是為營血此造化自然之微妙也造｜｜者以白米飯受濕熱鬱蒸變而為紅即成真色久亦不變此人窺造化之巧者也故｜｜有治脾胃營血之功得同氣相求之理

方 濕熱泄痢 丹溪青六丸用六一散加炒｜｜五錢為末蒸餅和丸梧子大每服五七十九白湯送下 朱丹溪心法 心腹｜｜香附乳香等分為末酒服 摘元 小兒吐逆頻仍不進乳食手足心熱用｜｜一年久者三錢半白朮麩炒一錢半炙甘草一錢為末每服半錢煎棗子米湯下 聖濟 小兒頭瘡因傷濕入水成毒膿汁不止用｜｜嚼署甚效 百一

酒

鴻宗曰酒同薑合大瀉肺氣○或云以葛花赤小豆花爲末酒下可飲酒不醉

苦甘辛熱有毒行藥勢殺百邪惡毒氣別錄通血脉潤皮膚散濕氣藏器養脾氣扶肝除風下氣孟詵開胃下食暖水臟溫腸胃禦風寒殺一切蔬菜毒日華解馬肉桐油毒和血養氣暖胃辟寒多飲發痰動火時珍

士良曰凡服丹沙石亭脂鍾乳諸石不可長用酒下能引石藥氣入四肢滯血化爲癰疽藏器曰酒漿照人無影不可飲祭酒自耗不可飲酒合乳飲令人氣結同牛肉食令人生蟲酒後卧黍穰食猪肉患大風時珍曰酒後食辣物及薑芥緩人筋骨酒後飲茶傷腎令腰脚重墜膀胱冷痛兼患痰飲水腫消渴攣痛之疾一切毒藥曰酒得者難治又酒得鹹而解者水制火也酒性上鹹潤下也畏枳椇葛花赤豆花綠豆粉者寒勝熱也

酒

鳴泉曰常飲冷酒者必患手戰不能執筆

丹溪之言不能無弊

發明

弘景曰大寒凝海惟酒不氷其性熱藥家多用以行其勢多飲則體弊神昏有毒故也三人冒霧晨行一人飲酒一人飽食一人空腹空腹者死飽食者病飲酒者健酒能辟惡也好古曰酒能引諸經不止與附子相同味之辛者能散苦者能下甘者能居中而緩用為導引可以通行一身之表至極高之分味淡者則利小便而速下也古人惟以麥造麯釀黍為酒已為辛熱有毒今之釀者加以烏頭巴豆砒霜薑桂石灰竈灰之類大毒大熱以增其氣味豈不傷冲和損精神涸營衛竭天癸而夭人壽耶震亨曰本草止言酒熱有毒不言其濕中發熱近于相火觀于醉後振寒戰慄可見矣又性喜升氣必隨之痰鬱於上溺澀於下恣飲寒涼其熱內鬱肺氣大傷其始也病淺或嘔吐或自汗或瘡疥或鼻皶或瀉痢或心脾痛尚可散而去之其久也病深或消渴或內疽或肺痿或鼓脹或失明或哮嗽或勞瘵或顛癇或痔漏為難名之病非具眼未易處也夫醇酒理宜冷飲有三益焉過于肺入於胃然後微溫肺得濕中之義可

[案]曰馬汗入瘡毒攻内也故殺人飲酒至醉散毒出外也故即愈此理可類推

以補氣次得寒中之温可以養胃冷酒行遅傳化以漸人不得恣飲也今則不然徒取快喉舌焉耳[時珍]

[曰]少飲則和血行氣壯神禦寒痛飲則傷神耗血損胃亡津生痰動火害不勝言

方 **驚怖卒死** 温丨灌之即醒 **馬汗入瘡** 馬汗馬毛入瘡其毒最甚皆致腫痛煩熱入腹則殺人多飲醇酒至醉即愈 肘後 **蛇咬成瘡** 暖丨淋洗日三次 廣利 **蜘蛛瘡毒** 同上方 **毒蜂螫人** 同上方 **耳聾** 三十年者丨三升浸牡荊子一升七日去滓任飲 千金 **産後血悶** 清丨一升和生地黄汁一升煎服 梅師

附諸酒方 **五加皮酒** 去一切風濕痿痺壯筋骨填精髓以五加皮煎汁和麴釀或切碎袋盛浸煮飲或加當歸牛膝地楡諸藥 **白楊皮酒** 治風毒脚氣腹中痰澼如石以白楊皮切浸丨煮飲 **女貞皮酒** 治風虛補腰膝女貞皮切片浸丨煮飲 **仙靈脾酒** 治偏

風不遂强筋骨仙靈脾一斤袋盛浸酒丨二斗密封三日飲　聖惠方

薏苡仁酒 去風濕强筋骨健脾胃用新苡仁粉同麴釀或用袋盛浸酒煮

天門冬酒 潤五臟和血脈久服除五勞七傷癲癇惡疾忌生冷常令酒氣相續勿令醉十日當出風疹毒氣三十日當瘥用天冬去心煮汁同麴米釀成初熟酸久乃味佳　千金方

白石英酒 治風濕周痺肢節濕痛及腎虛耳鳴耳聾用白石英磁石煆醋淬七次各五兩研末袋盛浸酒中五六日飲酒少再添　聖濟

地黃酒 補虛弱壯筋骨通血脈治腹痛變白髮用肥生地絞汁同麴米密封五七日啓之中有綠汁真精英也宜先飲之乃濾汁藏貯加牛膝汁效更速亦有加羣藥者

牛膝酒 壯筋骨治痿痺補虛損除久瘧用牛膝煎汁釀丨或袋盛浸煮飲之

菖蒲酒 治三十六風一十二痺通血脈治骨痿久服聰明耳目石菖蒲煮汁釀丨或浸煮飲

杞子酒 補虛益精去冷風壯陽道止目淚健腰脚用杞子煮搗汁釀丨或以

子同生地袋盛浸丨煮飲

菊花酒 治頭風明耳目去痿痺消百病用甘菊花煎汁釀丨或加生地當歸杞子冬青諸藥亦佳

黃精酒 壯筋骨益精髓變白髮治百病黃精蒼朮各四斤地骨皮柏葉各五斤天冬三斤煮汁一石同麴十斤糯米一石如常釀丨飲

桑椹酒 補五臟明耳目治水腫不下則滿下之則虛入腹則十無一活者用桑椹擣汁煎過同麴米如常釀法飲之

茴香酒 治腎氣痛偏墜引及心腹痛茴香浸丨煮飲舶者尤良

砂仁酒 消食和中下氣止心腹痛行經砂仁炒研袋盛浸酒煮飲

莎根酒 治心中客熱膀胱脇下氣鬱常憂不樂以香附一斤切炒香袋盛浸酒日夜飲之常令酒氣相續勿令醉

茵陳酒 治風疾筋骨攣急茵陳炙黃如常造釀任飲之

青蒿酒 治虛勞久瘧擣汁煎過造酒飲

百部酒 百部浸酒飲治一切久近咳嗽

海藻酒 洗淨浸丨治癭氣

松節酒 見松下

柏葉酒 見柏下

牛蒡酒 治諸風毒利腰

酒

六十五

鳴皋按醋音昨說文云客酌主人也玉篇云進酒于客曰獻客答主人曰醋古人酬

脚用牛蒡根切浸醇丨飲之 **花蛇酒** 見本條 **烏蛇酒** **蚺蛇酒** **蝮蛇酒** 俱見本條 **雞矢醴** 見鷄下 **豆淋酒** 破血去風治男子口喎中風陰毒腹痛及小便尿血婦人產後一切中風諸病黑豆炒焦以丨淋之飲 **霹靂酒** 治疝氣偏墜婦人崩中下血胎產不下以鉄器燒赤淬丨引藥 **龜肉酒** 治十年咳嗽釀法見龜條 **虎骨酒** 治臂脛疼痛歷節風痛釀法見虎條 **麋骨酒** 治陰虛腎弱久服令人肥白麋骨煮汁如常釀丨飲 **鹿骨酒** 同上 **鹿茸酒** 治陽虛痿弱小便頻數勞損諸虛症用鹿茸山藥浸丨飲詳見鹿茸 **戊戊酒** 大補元陽其性大熱陰虛無寒者不宜多飲用黃犬肉一隻煮糜連汁釀 **羊羔酒** 大補元氣同上造法 **膃肭臍酒** 助陽益精髓破癥結冷氣大補膃肭臍酒浸打爛如常釀法

醋 又名酢音醋醯音兮苦酒

醋字作醋亦酢音昨醯之名則作酢音措後人以醯爲醋俗相承之變也

鳴皋曰多食損肺收斂太過也一人嗜醋每燕飲拇戰人輸飲酒浜輸飲醋可飲斤

酸苦溫消癰腫散水氣殺邪毒別錄理諸藥消毒扁鵲治産後血運除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中酸水痰飲藏器下氣除煩治婦人心痛血氣并産後及傷損金瘡出血昏運殺一切魚鱉肉菜毒日華醋磨青木香止卒心痛血氣痛浸黃柏含之治口瘡調大黃末塗毒腫煎生大黃服治痃癖甚良孟詵散瘀血治黃疸黃汗好古曰仲景治黃汗有黃芪芍藥桂枝苦酒湯治黃疸有麻黃醇酒湯用苦酒清酒方見金匱要略

弘景曰多食損人臟腑藏器曰多食損筋骨亦損胃不益男子損人顏色醋發諸藥不可同食時珍曰酸

醋

許後患嗽百治不效而死

［希雍曰］經曰酸走筋〻病毋多食酸凡筋攣偏痹手足屈伸不便皆忌之為能助肝賊脾也凡脾病者亦不宜過食

屬木脾病毋多食酸〻傷脾肉膈而唇揭○服茯苓丹參人不可食丨鏡源曰米丨制四黃丹砂膽礬常山諸藥

發明［宗奭曰］產婦房中常以火炭沃丨氣為佳酸益血也以磨雄黃塗蜂蠆毒亦取其收而不散之義造靴者須得丨而紋皺故知其性收斂也［時珍曰］北夢瑣言云一婦抱兒落炭火上燒灼以丨泥傅之旋愈無痕又一少年眼中常見一鏡醫不與食俟其饑甚以芥丨旋〻啖之遂覺胸中豁然眼花不見醫曰君吃魚鱠太多魚畏芥丨故也觀此二事可證別錄治癰腫殺邪毒之驗也大抵丨治諸瘡腫積塊心腹疼痛痰水血病殺魚肉菜及諸虫毒氣無非取其酸收之義而又有散瘀解毒之功李廷飛云丨能少飲辟寒勝酒［又曰］入藥米丨為佳餘不入藥

方　身體卒腫丨和蚯蚓糞傅之　千金　白虎風毒以三年陳丨五升煎五沸

切葱白三升煎一沸漉出以布染之乘熱裹之痛止乃已 外臺

足上轉筋 同上方

霍亂吐利 塩醋煎服甚良 如宜方

霍亂脹悶 未得吐下丨飲三升 千金

癰疽不潰 丨和雀屎如小豆大傅瘡頭上即穿也 肘後

舌腫不消 以丨和釜底墨厚傅舌之上下脫則更傅效 千金

木舌腫強 糖丨時時含漱 普濟

牙齒痛 丨煮地骨皮含漱即瘥 肘後

食雞子毒 飲丨少許即消 廣記

毒蛇傷螫 清釅醋急飲一二椀令毒氣不散然後用藥 濟急

湯火灼傷 以丨淋洗并以丨泥塗之甚妙

胎死不下 月未足者大豆煮丨服三升立便分解未下再服 子母秘錄

胞衣不下 腹滿則殺人以水入丨少許噀面神效 聖惠方

丁腫初起 用麪圍住以針亂刺瘡上銅器煎丨沸傾入圍中令客一盞冷即易三度根即出也

鴻舉曰補肝腎

菜部

韭

又名草鍾乳 拾遺 起陽草 侯氏藥譜

辛微酸溫 時珍曰生辛濇熟甘酸 大明曰熱 歸心安五臟除胃中熱利病人可久食 別錄 時珍曰千金方作可久食不利病人 煮食溫中下氣補虛益陽調和臟腑令人能食止洩膿血腹中冷痛生搗汁服主胸痹骨痛不可觸者又解藥毒療狂犬咬人數發者亦塗蛇虺蟲螫毒 藏器 煮食充肺氣除心腹痼冷痃癖搗汁服治肥白人中風失音 日華 煮食歸腎壯陽止洩精暖腰膝 寧原 汁服治胸痹刺痛如錐即

吐出胸中惡血甚驗孟詵主吐血唾血衄血尿血婦人經脉逆行打撲傷損及噎膈病擣汁澄清和童便飲之能消散胃脘瘀血甚效震亨飲生汁主上氣欬息欲絶鮮肉脯毒煮汁飲止消渴盜汗熏産婦血運洗腸痔脱肛時珍

詵曰不可與蜜及牛肉同食熱病後十日食之即發困多食動宿飲吐水宗奭曰多食能昏神暗目酒後尤忌

發明頌曰菜中此物最溫而益人宜常食之昔人正月節食五辛以辟癘氣謂丨薤葱蒜薑也思邈曰丨味酸肝病宜食之大益人心時珍曰丨生則辛而散血熟則甘而補中入足厥陰乃肝之菜也素問

言心病宜食丨葉食鑑本草言歸腎文雖異而理則
相貫蓋心則肝之子腎乃肝之母〻能令子實虛則
補其母也有人貧叟病噎膈食入即吐胸中刺痛或
令取丨汁入鹽梅鹵汁少許細呷得入漸加忽吐稠
涎數升而愈此亦仲景治胸痺用薤白皆取其辛溫
能散胃脘痰飲惡血之義也震亨曰心痛有食熱物
及怒鬱致死血留於胃口作痛者宜用丨汁桔梗加
入藥中開提氣血有瞖氣上攻以致心痛者宜用丨
汁和五苓散爲丸空心茴香湯下盖丨性急能散胃
口血滯也又反胃宜用丨汁二杯入薑汁牛乳各一
杯細〻溫服盖丨汁消血薑汁下氣消痰和胃牛乳
能鮮熱潤燥補虛也一人臘月飲刮剢酒三杯自後
食必曲屈下膈硬澁微痛右脉甚澁關脉沉此瘀血
在胃脘之口氣因鬱而成痰阻塞食道也遂以丨汁
半盞細〻冷呷
盡半斤而愈

方　胸痺急痛如錐刺不能俯仰自汗出痛或徹背
上不治或死可取生丨五斤或根擣

韭

六十九

汁服　食療本草

陰陽易病　男子陰腫小腹絞痛頭重眼花宜猳鼠湯用猳鼠矢十四粒丨根一大把水煮去滓服得汗愈未汗再服　南陽活人書

傷寒勞復　同上

喘息欲絕　丨汁飲一升效　千金

產後嘔水　產後因怒傷肝吐青綠水用丨葉一斤取汁入薑汁少許和飲即愈　摘元

赤白帶下　丨根汁和童便露一夜溫服效　海上仙方

鼻衄不止　丨根葱根同搗塞鼻中頻易二三度即止　千金

猘犬咬傷　七日當一發三七不發乃脫也急於無風處洗淨即服丨汁一椀隔七日又一椀七七共服七椀百日忌食酸鹹一年忌食魚腥終身忌食犬肉否則十有九死徐本齋云此方出時後見一猘犬咬三人惟一人用此方得活　簡便

消渴　丨苗日用三五兩作羹勿入鹽食至十斤即愈極驗　秦副憲方

夜出盜汗　丨根四十九根水二升煮一升頓服　千金

脫肛不收　生丨一斤切以酥拌炒熟帛包作二包更互熨

之以入為度 聖惠

痔痛用盆盛沸湯蓋之蓋上留一孔用｜菜一把泡湯中坐孔上先薰後洗數次自然脫体 袖珍

產後血運｜菜安瓶中沃以熱醋令氣入鼻中即醒 丹溪

韭子

辛甘温治夢中泄精溺血 別錄 暖腰膝治鬼交甚效 日華

補肝及命門治小便頻數遺尿女人白淫白帶 時珍

時珍曰伏鍾乳｜｜香 大明曰入藥蒸熟曝乾簸去黑皮炒黃用

發明 頌曰｜｜得龍骨桑螵蛸主漏精補中 弘景曰｜｜入棘刺諸丸主漏精 時珍曰棘刺丸方見

外臺治諸勞小便數藥多不錄按梅師方治遺精用｜｜五合白龍骨一兩為末空心酒服方寸匕 千金

方治夢遺小便數用｜｜二兩桑螵蛸一兩微炒研末每旦酒服二錢 三因方治下元虛冷小便不禁或

成白濁有家丨丨丸蓋韭乃肝之菜入足厥陰經腎
主閉藏肝主疎洩素問曰足厥陰病則遺尿思想無
窮入房太甚發為筋痿及為白淫男隨溲而下女子
綿〻而下丨丨之治遺精漏泄小便頻數女人帶下
者能入厥陰補下焦肝及命門之
不足命門者藏精之府故同治也

方

夢遺 藏器曰丨丨生吞二十粒鹽湯下○聖惠
虗勞傷腎夢遺丨丨二兩微炒為末食前
酒下

玉莖强中 莖硬不痿精流不住時〻如針刺捏
之則痛名强中乃腎滯疾也用丨丨
二錢

故紙各一兩為末每服三
錢水煎日三服效 經驗

腰脚無力 丨丨一升揀淨
蒸兩炊許暴乾
炒黃為末安息香二兩水煮一二百沸慢火炒赤色
和擣為丸梧子大如乾入少蜜每日空腹酒下三十
丸以少飯壓之大佳
崔元亮海上方

女子帶下 及男子遺精丨丨七
升醋煮焙研末蜜丸
梧子大每服三十
丸溫酒下 千金

元素曰入手太陰肺足陽明胃經 希雍曰亦入足厥陰肝

鳴皋曰辛平不過白冷之說恐不盡然傷寒湯中不用青者白入肺々主皮毛用以出汗也

希雍曰傷寒々熱邪氣并也中風面目浮腫風熱欝也傷寒骨肉痛邪始中也喉痺不通君相二火上乘于肺也辛涼發散得汗則火自散而喉痺通也肝開竅于目散肝中邪熱故云歸目除肝邪氣邪氣散則正氣通血自調和而有安胎安中利五臟之功

葱 又名芤 綱目 菜伯 同上 和事草 同上 鹿胎

葱白 辛平 弘景曰白冷青熱傷寒湯中不得用青 作湯治傷寒々熱中風面目浮腫能出汗 本經 傷寒骨肉碎痛喉痺不通安胎歸目益目睛除肝中邪氣安中利五臟殺百藥毒根治傷寒頭痛 別錄 主天行時疾頭痛熱狂霍亂轉筋及奔豚氣脚氣心腹痛目眩止心迷悶 大明 通關節止衂血利大小便 孟詵 治陽明下痢下血 李杲 達表和裏止血 寗原 除風濕身痛麻痺蟲積心痛止大人陽脫陰 發法 毒腹痛小兒盤腸內鈎婦人妊娠溺血通乳汁散乳

瘑利耳鳴塗猘犬傷制蚯蚓毒時珍殺一切魚肉毒士良

思邈曰生葱同蜜食作下利燒葱同蜜食壅氣殺人

仲景曰生葱同棗食令人病同犬雉肉食令人病血

時珍曰服地黄常山人忌食之

發明 元素曰葱白味辛而甘平氣厚味薄升也陽也入手太陰足陽明經專主發散以通上下陽氣故活人書治傷寒頭痛如破用連鬚葱白湯主之仲景治少陰病下利清穀裏寒外熱厥逆脉微者白通湯主之內用葱白若面色赤者四逆湯加葱白腹中痛者去葱白成無己解之云腎惡燥急食辛以潤之葱白辛溫以通陽氣也 時珍曰葱生辛散熟甘溫外實中空肺之菜也肺病宜食之肺主氣外應皮毛其合陽明故所治之症多屬太陰陽明皆取其發散通氣之功通氣故能解毒及理血病氣者血之帥也氣通則血活矣金瘡 損折傷血出疼痛不止者王璆百一方用葱白砂糖等分研封之云痛立止更無瘢

痕也葱葉亦可用又葱管吹鹽入玉莖內治小便不通及轉脬危急者極有捷效余常用治數人皆驗〔宗奭曰〕多食昏人神〔詵曰〕多食發人虛氣上冲

方 感冒風寒 初起葱白一握淡豆豉一合煎服取汗 瀕湖集簡方 傷寒頭痛 如破連鬚葱白半斤生薑二兩水煮溫服 活人書 傷寒勞復 因交接者腹痛卵腫葱白搗爛苦酒和服 千金 風濕身痛 生葱搗爛入香油數滴水煎調川芎鬱金末各一錢取吐 心法 丹溪 胎動下血 疼痛搶心葱白煮濃汁飲之未死即安已死即出未效再服一方加川芎一方用銀器同米作粥食 深師 卒中惡死 或先病或平居寢臥奄忽而死皆是中惡急取葱心黃刺入鼻中七八寸男左女右鼻目血出即生無血不治此扁鵲秘方也 小兒卒死 葱涎灌入鼻中氣通得嚏即活 經驗 小兒盤腸 內釣腹痛用葱湯洗兒腹仍以炒葱搗貼

臍上良久尿出痛止　楊氏嬰兒寶鑑

陰毒腹痛

厥逆唇青卵縮六脉欲絶者用葱一大束切去根切去青留白二寸烘熱安臍上以熨斗熨之葱壞再換良久透入手足溫有汗即瘥乃内服四逆湯若手足不溫不治　活人書

脫陽危症

凡人大吐大瀉之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹痛外腎縮冷汗出厥逆須臾不救先以葱白熨臍法熨之後以葱白三七莖打爛酒煮灌之陽氣即回此華佗救卒病方也

卒心急痛

牙關緊閉欲死以老葱白五莖去皮鬚搗汁以匙送入咽中灌以麻油四兩得下咽即醒少頃虫積皆化黃水而下永不再發屢效　瑞竹堂

蚘虫心痛

用葱白二寸鉛粉二錢搗丸服之即止　葱能通氣粉能殺虫也　楊氏經驗方

小便閉脹

不治殺人葱白三斤切炒帕盛用二箇更互熨小腹氣透即通　本事

大腸虛閉

匀氣散用葱一莖薑一塊鹽一捻豆豉三七粒共搗作餅烘掩臍紮定氣通即愈不通再作　直指

急淋

陰腫 煨葱搗泥貼之 外臺

腫毒尿閉 曰腫毒未潰小便不通 取葱切入麻油煎至黑色去葱取油時塗腫處即通 普濟

水癊瘍腫 葱根白皮煮汁服一盞當下水出病已困者取根搗爛坐之取氣水自下 聖濟錄

陰囊腫痛 葱白乳香搗塗即時痛止腫消又方用煨葱搗泥入鹽塗之

小便尿血 葱白一握鬱金一兩水一升煎二合溫服日三 普濟

赤白痢 葱白切碎和米煮粥食 食醫心鏡

便毒初起 葱白和蜜搗傅怕果內服通氣藥即消

一切腫毒 葱汁漬之日三五度 永類

乳癰初起 葱汁一升頓服即散 千金

疔瘡惡腫 刺破以老葱生蜜搗貼兩疔出醋湯洗神效 聖濟

禿瘡 米泔洗淨葱搗泥和蜜塗之神效 見楊氏方

刺瘡金瘡 百治不效葱煎濃汁漬之甚良

金瘡瘀血 在腹者葱白二十莖麻子三升搗碎水九升煮升半頓服當吐出膿血而愈未盡再服 並出千金方

腦破

骨折 窨和葱白搗勻厚封立效 肘後 縊死 葱心黄刺耳鼻中有血出即甦

葱葉 煨研傅金瘡水入皸腫鹽研傅蛇虫傷及中射工溪毒 日華 主水病足腫 蘇頌 利五臟益目睛發黃疸 思邈

發明 〔頌曰〕煨葱治打撲傷見劉禹錫傳信方云取葱新折者煻火煨熱剝皮其間有涕便將罨損處仍多煨續續易熱者李抱真以毬杖按毬子其軍將以杖相格因傷拇指并甲爪擘裂遽索金瘡藥裹之强索酒飲而面色愈青忍痛不止有軍吏言此方三易而面色赤斯須曰已不痛凡十數度用熱葱并涕纏裹其指遂畢席笑語〔時珍曰〕按張氏經驗方云金創折傷血出用葱白連葉煨熱或鍋烙炒熱搗爛傅之冷即再易石城尉戴堯再試馬損大指血出淋漓余用此方再易而痛止明日洗面不見痕跡宋推官

鮑縣尹皆得此方每有創傷氣未絕者用此活人甚衆又凡人頭目重悶疼痛時珍每用葱葉插入鼻内三寸并耳内氣通即便清爽也

方

水病足腫 煮湯漬之日三五次 獨行方

小便不通 搗泥入蜜合外腎上即通 永類方

瘡傷風水 腫毒取葱青葉和乾薑黃柏等分煮湯浸洗立愈 食療

蜘蛛咬傷 編身生瘡青葱葉一莖去尖入蚯蚓一條在内待化成水取點之即愈 兵部手集

汁 辛溫治溺血飲之解藜蘆及桂毒 別錄 散瘀血止衄止痛治頭痛耳聾消痔漏解諸藥毒 時珍 能消玉為水化五石 弘景

發明 時珍曰葱汁功同葱白古方多用葱涎丸藥亦取其通散上焦風氣也勝金方取汁入酒少許

療癰不合一方詳乾薑下

滴鼻中治衄不止云即覺血從腦散下也又唐瑤經
驗方以葱汁和蜜少許服之亦佳云鄭媼用此甚效
老僕試之亦驗古云二物同食則害人何以能
治此疾恐人脾胃不同非甚急不可輕試也
方

衄血 見發明

痔漏作痛 葱汁白蜜和塗之先以木
鱉子煎湯熏洗其冷如冰
即效一人苦此早用之
腕即安也 唐仲舉方

中鉤吻毒 面青口噤欲死以
葱涕啖之即解 千
金

鬚

通氣 孟詵

療飽食房勞血滲入大腸便血腸澼成
痔研末酒服二錢 時珍
方

喉中腫塞 氣不通者葱鬚陰乾為末每用二錢
入胆礬末一錢和匀每吹一字 杜
壬方

鳴皐曰入手足陽明大腸胃經

鳴皐曰凡味辛者無不温蘇頌於葱薤皆云白冷青熱恐未必然大抵葱薤之性最其能通ミ則熱散亦猶生薑之体熱而用涼也

實 辛太温明目補中氣不足本經 温中益精日華 宜肺

歸頭思邈

方 目暗補中葱子半升為末每取一匙煎湯升半去滓入米煮粥食之亦可為末蜜丸梧子大食後米飲服一二十丸日三服 食醫心鏡

薤又名藠子音叫 火葱綱目

集解 時珍曰｜八月栽根正月分蒔宜肥壤數枝一本則茂而根大葉狀似韭ミ葉中實而扁有劍脊｜葉中空似細葱葉而有稜氣亦如葱二月開花紫白色根如小蒜一本數顆相依而生

薤白 辛苦温滑 頌曰白冷而青熱 去青用 治金瘡ミ敗本經 歸骨

除寒熱去水氣温中散結氣作羹食利病人諸瘡中

[杲曰]按後重者亦有氣虛血虛火熱風燥之不同

[鳴皋曰]日華云止久瀉冷痢東垣云治洩痢下重者亦當指久瀉冷痢也熱痢用之當佐以苦寒取其能入下焦泄大腸氣滯耳今治痢者不論寒熱悉加之宜其無效矣

風寒水氣腫痛搗塗之別録 煮食調中補不足止久痢冷瀉肥健人日華 治洩痢下重能泄下焦陽明氣滯李杲

[好古曰]下重者氣滯也四逆散加此以泄氣滯 治少陰病厥逆下痢及胸痺刺痛下氣散血安胎時珍 心病宜食利產婦思邈 治女人帶下赤白作羹食之骨鯁在咽食之即下孟詵 白者補益赤者療金瘡及風生肌肉蘇恭 同蜜搗塗湯火傷甚速宗奭 溫補助陽道時珍

[詵曰]發熱病不宜多食三四月勿食生者[大明曰]生食引涕唾不可與牛同食令人作癥瘕

發明[詵曰]一白色者最好服之可通神安魂魄益氣續筋力[頌曰]煮與蓐婦飲易產亦主脚氣[時珍]

曰丨味辛氣溫諸家言其溫補獨蘓頌謂其冷補蓋
亦不然也又按王禎云丨生則氣辛熟則甘美食之
有益老人宜之薛用弱齊諧志云一人得天行病後
遂能大餐日食至一斛五年家貧行乞一日至一園
大饑食丨一畦大蒜一畦便悶極卧地吐一物如龍
漸縮小有人撮飯於上即消成水而病尋愈按此亦
丨散結蒜消癥之驗也宗奭曰丨葉光滑露亦難
竚千金治肺氣喘急方中用之亦取其滑泄之義

方　胸痺刺痛仲景栝樓丨丨湯治胸痺痛徹心背
喘息欬唾短氣喉中燥痒寸脉沉遲
關脉弦數不治殺人用栝樓一枚丨丨半升白酒七
升煮二升分二服○千金治胸痺半夏丨丨湯用丨
丨四兩半夏一合枳實半兩生薑一兩栝樓半箇以
白截三升煮一升溫服○肘後治胸痛瘥而復發丨
丨五升擣截音在酢漿也汁飲立瘥　霍亂乾嘔不止以薤一握水三升
煮減半頓服　獨行方　奔豚氣
痛丨丨擣汁飲　赤痢不止丨丨黃柏煮汁
服之　肘後　陳藏器　赤白痢丨丨

煮粥食 食醫心鏡

小兒疳痢 ||生擣與米粉和蜜作餅炙熟與食不過三兩服 楊氏產乳

產後諸痢 多煮||食或作羹 范汪方

妊娠胎動 胎內冷痛|| 一升當歸四兩水煮服 古今録驗

瘡犯惡露 甚者殺人||擣爛以帛裹煨熟去帛傅之冷即易換亦可擣作餅以艾灸之熱氣入瘡水出即瘥也 梅師

疥瘡痛痒 煮薤葉擣爛塗之 肘後

手足瘑瘡 生薤一把以熱醋投入擣封瘡上取效 千金

毒蛇犬咬 諸傷||擣汁飲并傅之 葛洪方

蒚音力

蒜

又名小蒜

集解 保昇曰 小蒜野生處處有之苗葉根子皆似葫而細數倍也 頌曰 本草謂大蒜為葫小蒜為蒜爾雅云蒚山蒜也即小蒜也 宗奭曰 小蒜苗如葱針根白大者如烏芋子 時珍曰 家蒜有二種

[鳴臯曰]本草於大蒜下註云合蜜食殺人小蒜下不言然性味相同自應一律忌之

根莖俱小而瓣少辣甚者小蒜也根莖俱大而瓣多辛而帶甘者葫也大蒜也

辛温有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃温中除邪痺毒氣 別錄 主溪毒 弘景 下氣治蠱毒傳蛇蟲沙蝨瘡 日華 [恭曰]此蒜與胡葱相得主惡截毒山溪中沙虱水毒大效山人俚獠時用之 塗丁腫甚良 孟詵

[思邈曰]三月勿久食傷人志性黄帝書云同生魚食令人奪氣陰核痛[瑞曰]脚氣風病人及時病後忌食

發明 [頌曰]古方多用小蒜治冷霍亂煮汁飲之南齊褚澄治李道念雞瘕便瘥[時珍曰]李道念病五年褚澄診之曰非冷非熱當是食白瀹雞子過多也取|一升煮食吐一物涎裹視乃雞雛也吐凡十二枚而愈後漢書云華佗見一人病噎食不得下令取|虀大可二升飲之立吐一蛇而愈夏子益奇疾方

云人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也
用丨汁半兩和酒服當吐出如蛇狀觀三書所載則
丨乃吐蠱要藥而
後人少有知者

方

霍亂轉筋 入腹殺人以小丨葅各一兩擣
傅臍中灸七壯立止 聖濟

積年心痛 不可忍不拘十年五年者隨手見效濃汁煮小
蒜食飽勿着鹽曾用之有效再不發也 兵部
手集

水毒中人 一名中溪一名中濕一名水病似射工
而無物初得惡寒頭目微痛旦醒暮劇
手足逆冷三日則生虫蝕下部不痒不痛過六七日
虫蝕五臟注下不禁以小丨三升煮微熟大熟則無
力以俗身若身發赤斑文者
母以他病治之也 肘後

射工中人 成瘡者取丨
切片貼瘡上
灸七壯
千金

止截瘧疾 小丨不拘多少研泥入黃丹少許
丸如荧子大每服一丸面東新汲
水下至妙

陰腫如刺 汗出者小丨一升韭根一升楊
唐慎微
栁根二斤酒三升煎沸乘熱熏

時珍曰入太陰肺脾陽明胃大腸經布雅

日華入肝

洗永類

惡核腫結小｜吳萸等分擣傅肘後　五色丹毒無常及發足踝者杵｜厚封頻易葛氏

蜈蚣蝎螫嚼小｜塗之肘後方

大蒜

又名葫別錄時珍曰按唐韻云張騫使西域始得｜｜則小蒜乃中土舊有而｜｜來自胡地故曰葫

辛溫有毒久食損目歸五臟散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣別錄下氣消穀化肉蘇恭去水惡癢氣除風濕破冷氣爛痃癖伏邪宣通溫補療瘡癬殺鬼去痛藏器健脾胃治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪祟觧溫疫療勞瘧冷風傅風損冷痛惡瘡蛇虫蠱毒溪毒沙虱並擣貼

之熟醋浸經年者良日華温水搗爛服治中暑不醒搗
貼足心止鼻衂不止和豆豉丸服治暴下血通水道
宗奭搗汁飲治吐血心痛煮汁飲治角弓反張同鯽魚
丸治膈氣同蛤粉丸治水腫同黃丹丸治痢瘧孕痢
同乳香丸治腹痛搗泥傅臍能達下焦消水利大小
便貼足心能引熱下行治泄瀉暴痢及乾濕霍亂止
衂血納肚中能通幽門治關格不通時珍
思邈曰四月八月食葫傷神令人喘多食生葫行房
傷肝氣令人面無色生葫合青魚鮓食令人腹內生
瘡腸中腫又成疝瘕發黃疾合蜜食
殺人凡服一切補藥者不可食之

昂曰丨丨通竅以其臭也凡極香極臭者俱能通竅

發明

宗奭曰丨丨氣極臭置臭內中反能掩臭凡中暑毒人爛嚼三兩瓣溫水送下〻咽即知但禁飲冷水又鼻衄不止者搗貼足心衄止即拭去震亨曰丨丨屬火性熱喜散快膈善化肉暑月人多食之傷氣之禍積久自見養生者忌之化肉之功不足論也頌曰多食傷肺傷脾傷肝胆生痰助火昏神時珍曰丨丨入太陰陽明其氣薰烈能通五臟達諸竅去寒濕辟邪惡消癰腫化癥積肉食此其功也王禎稱之云化臭腐為神奇調鼎俎代醯醬携之旅途則炎風瘴雨不能加食餲腊毒不能害夏月食之解暑毒北方食肉麪尤不可無乃食經之上品也不知其辛能散氣熱能助火傷肺損目昏神之害也嘗有一婦衄血一晝夜不止諸治不效時珍以丨丨搗傅足心即血止真奇方也葉石林避暑録云一僕暑月馳馬忽仆地欲絕或用丨丨及道上熱土各一握研爛以新汲水和取汁决齒灌之少頃即甦蔵器曰有患痃癖者夢人教每日食丨丨三顆初服遂至瞑眩吐逆下部如火後有人教取数片合皮截去兩頭呑之名

鳴皋曰若腫毒無頭者以濕紙蒙上先乾者便是瘡頭可安炷灸之

昂曰謂頭上毒不得灸此言過矣頭為諸陽所聚艾宜小如椒粒炷宜三五壯而已

又按東垣灸元好問腦疽艾大如兩核許

曰內灸果大效也頌曰兵部手集云惡瘡腫毒號叫卧眠不得人不能别者取獨頭一一兩顆擣爛麻油和厚傅瘡上乾即易之屢用救人無不神效盧坦侍郎肩上瘡作連心痛悶用此便瘥又李僕射腦疽久不瘥與此方亦愈又肘後方云凡背腫取獨頭蒜横截一分安腫頭上炷艾如梧子大灸蒜百壯不覺漸消多灸為善勿令太熱若覺痛即起蒜ニ焦更換新者勿令損皮肉葛洪嘗苦小腹下生一大腫灸之亦瘥數用灸人無不應效又江寧紫石宮刻石記其事云但是發背及癰疽惡瘡初起有異皆可灸之惟要痛者灸至不痛不痛者灸至痛極而止疣贅之類灸之亦便成痂自脱其效如神時珍曰李迅云癰疽之法用灸勝于用藥緣熱毒中隔上下不通必得毒氣發洩然後解散凡初發一日之内便用大獨頭蒜切如錢厚貼瘡頭上灸之三壯一易大槩以百壯為卒一使瘡不開大二使内肉不壞三使瘡口易合一舉而三得之但頭及項以上切不可用此恐引氣上更生大禍也又史源云母背上作痒有赤暈半寸白粒

菜部

灸至百壯始覺痛而瘥由是推之頭毒若不痛艾大壯多亦無碍也

如黍灸二七壯其赤隨消信宿有赤流下長二寸舉家歸咎于灸外科用膏藥日增一暈二十餘日橫斜約六七寸痛不可言聞一尼病此得灸而愈予奔問之尼云剔時昏不知人灸八百壯方甦用艾一斛予歸以炷如銀杏大灸十數殊不覺乃灸四旁赤處皆痛每一壯燼則赤隨縮入三十餘壯赤暈收退蓋灸遲則初發處肉已壞故不痛直待灸到好肉方痛也至夜則火焮滿背瘡高阜而熱夜亦得睡矣至曉如覆甌高三四寸上有百數小竅色正黑調理而安蓋高阜者毒外出也小竅多毒不聚也色正黑皮肉壞也非艾火出其毒於壞肉之裏則內逼五臟而危矣庸醫傅貼涼藥消散之說何可信哉

方 疔瘡惡腫 用門臼灰一撮羅細以獨頭蒜染灰擦瘡頭候瘡自然出少汁再擦少頃即消散也 肘後方

五色丹毒 搗蒜厚傳乾即易之 肘後

關格脹滿 大小便不通獨頭蒜燒熟去皮綿裹納下部立通 外臺

乾濕霍亂 轉筋搗貼足心立愈 永類

泄

大蒜 八十

瀉暴痢 方同上亦可貼臍中 千金

下痢噤口 方同上

衄不止 方同上詳發明

水氣腫滿 ｜｜田螺車前子等分搗貼臍中水從便漩而下數日即愈 仇遠稗史

山嵐瘴氣 生熟｜｜各七片共食之少頃腹鳴或吐血或大便泄即愈 攝生妙用方

瘧疾寒熱 用桃仁半片安內關穴將獨頭蒜搗爛罨之用帛縛定男左女右即止 簡便方○一方獨頭蒜燒熟酒服

寒瘧冷痢 端午日以獨頭蒜十箇黃丹二錢搗丸梧子大每服九丸長流水下甚妙 千金方

腸毒下血 蒜連丸用獨頭蒜煨搗和黃連末為丸日日米湯服 濟生方

暴下血病 用｜｜五七枚去皮研膏入豆豉搗丸梧子大每米飲下五六十丸無不愈者 本草衍義

血逆心痛 生搗｜｜汁服一升即愈 肘後

鬼疰腹痛 不可忍者獨頭蒜一枚香墨和棗大搗和醬汁一合服 永類

心腹冷痛 醋浸｜｜至一二年者食數枚其效如神

瀕湖 獨蒜一枚和雄黃杏仁研為丸空
集簡方 **毘毒風氣** 腹飲下三丸靜坐少時下毛出即
安 孟 **喉痺腫痛** ｜｜塞耳鼻中日 角弓
洗食療 二易之 肘後 **產後中風** 反張
不語用｜｜三十瓣水三升煮 宋寧宗少
一升灌之即醒 子母秘錄 **小兒氣淋** 時病淋日
夜凡三百起國醫罔措孫琳用大蒜淡豆豉蒸餅三
物搗丸溫水下三十九日今日三服病當減三之一
三日病除已而果然賜以千緡或問其理曰小兒何
緣有淋只是水道不利三物皆能通利故也 談藪
金瘡中風 角弓反張不語｜｜一升無灰酒四
升煮爛并渣服得汗便瘥 外台 **婦人**
陰腫 ｜｜煮湯洗 **陰汗作癢** ｜｜淡豉搗丸梧子大
之效 永類 硃砂為衣每空腹灯心
湯下三 **毒蛇螫傷** 即嚼｜｜厚封之日六七易仍以
十九 ｜｜一升去皮以乳二升煮熟空
心頓服明日又進外以蒜一升搗 發熱如
小便煮三四沸浸損處 孟詵 **蛇瘕面光** 火炙人

飲丨丨汁一碗吐出如蛇狀即安 危氏

吐蠱 見小蒜發明

腿肚轉筋 丨丨擦足心令熱即安仍以冷水食一瓣 攝生

胡荽 又名香荽 拾遺 蒝荽 俗名 又作芫荽

辛溫微毒消穀利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒噴之立出通心竅 嘉祐 補筋脉令人能食治腸風用熱餅裹食甚良 孟詵 辟飛尸鬼疰蠱毒 吳瑞

詵曰 多食損人精神華佗云胡臭口臭齒䘌及脚氣人皆不可食病更加甚 藏器曰 久食令人多忘根發錮疾不可同邪蒿食令人汗臭產難 時珍曰 服一切補藥及藥中有白朮丹皮者不可食此伏石鍾乳

泉曰嘗見一小兒出痘係悶症昏不知人不啼不食醫用一鍋煮||上用蒸籠卧小兒於籠內以被覆之使熱氣薰蒸熱氣須得直不得過熱火頃兒啼痘出矣

卧

發明　時珍曰||辛溫香竄內通心脾外達四肢能辟一切不正之氣故痘瘡出不快者先發之諸瘡皆屬心火營血內攝於脾心脾之氣得芳香則運行得惡臭則壅滯故耳楊士瀛直指方云痘疹不快宜用||酒歆之以辟惡氣床帳上下左右皆宜挂之以禦汗氣胡臭天癸淫佚之氣一應穢惡所不可無者

方　痘疹不快||二兩切以酒煎沸蓋定勿令洩氣候溫微微含噀一身令遍勿噀頭面　經驗

熱氣結滯　經年數發者||半斤五月五日采陰乾水七升煮升半去滓分服未瘥再服　必效方

產後無乳　乾||煎飲　經驗

小便不通||二兩水二升煎一升入滑石末一兩分三四服　聖濟

鮮蠱毒||根搗汁半升和酒服立下神驗　必效方

肛門脫出||燒烟熏之即入　子母秘錄

胡荽　生薑　八十二

昂曰有聲有物為嘔有聲無物為噦有物無聲為吐或因寒因熱因食因痰氣逆上冲而然生薑能散逆氣故為嘔家聖藥東垣云辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推湯穀氣而已勿作表實用辛藥瀉之昂曰人特知陳皮生薑止嘔不知亦有發嘔之時以其性上升胃熱者非所宜也藿香亦然嗚皋曰胃熱作嘔

生薑

辛微溫久服去臭氣通神明本經 歸五臟除風邪寒熱傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐去痰下氣別錄 去水氣脹滿療咳嗽時疾和半夏主心下急痛和杏仁作煎下急痛氣實心胸擁隔冷熱氣神效搗汁和蜜服治中熱嘔逆不能下食甄權 散煩悶開胃氣汁作煎服下一切結實衝胸膈惡氣神驗孟詵 破血調中去冷氣汁解藥毒藏器 除壯熱治痰喘脹滿冷痢腹痛轉筋心滿去狐臭殺腹內長虫張鼎 生用發散熟用和中解食

此黄連所以止嘔也〔丹溪曰〕陰分收者多属陰虚宜用貝母勿用生薑以其辛散也〔昂曰〕能行血痺産後血上冲心及汗穢不盡煎服亦良〔鳴皋曰〕苦與辛合則降欲假其降宜與川連同用〔又曰〕凡水停中焦小便不利必用生薑乾薑以開太陽之路方效徒用寒凉滲利之藥無益也

野禽中毒成喉痺浸汁點赤眼搗汁和黄明膠熬貼風濕痛甚妙 時珍

乾生薑治嗽温中治脹滿霍亂不止腹痛冷痢血閉病人虚而冷宜加之 甄權 薑屑和酒服治偏風 孟詵 肺經氣分之藥能益肺 好古

之才曰秦椒為之使殺半夏莨菪毒惡黄芩黄連天鼠矢〔藏器曰〕生薑要熱則去皮要冷則留皮〔思邈曰〕八九月多食薑至春多患眼減筋力孕婦食之令兒枝指〔杲曰〕古云秋不食薑令人瀉氣蓋夏月火旺宜汗散之故食薑不禁辛走氣瀉肺故秋則禁之〔時珍曰〕食久積熱患目珍屢試有准凡病痔人多食兼酒食立發患瘡人多食則生惡肉此皆昔人所未言者也糟薑瓶内入蟬蜕則無筋

發明

成無己曰薑棗味辛甘專行脾胃之津液而和營衛藥中用之不獨專於發散也

杲曰生薑之用有四制半夏厚朴之毒一也發散風寒二也與棗同用辛溫益脾胃元氣溫中去濕三也與芍藥同用溫經散寒四也孫真人曰薑為嘔家聖藥蓋辛以散之嘔乃氣逆不散此藥行陽而散氣也或問生薑辛溫入肺何以云入胃口曰俗以心下為胃口者非矣咽門之下受有形之物及胃之系便是胃口與肺系同行故能入肺而開胃口也曰人云夜間勿食生薑令人閉氣何也曰生薑辛溫主開發夜則氣本收斂反開發之則違天道矣若有病人則不然也生薑屑比之乾薑則不熱比之生薑則不溫以乾生薑代乾薑者以其不僭故也俗云上床蘿蔔下床薑薑能開胃蘿蔔消食也

時珍曰薑去邪辟惡生啖熟食糟醬蜜煎無不宜之凡山行早行宜含一塊不犯霧露清濕之氣及山嵐不正之邪按方廣心法附餘云凡中風中暑中氣中毒中惡乾霍亂一切卒暴之病用薑汁與童便服立可解散蓋薑能開痰下氣童便降火也

頌

曰崔元亮集驗方載薑茶治痢以生薑切細和好茶一兩盌任意呷之便瘥熱痢連皮用冷痢去皮用大妙楊士瀛曰薑能助陽茶能助陰二物皆消散惡氣調和陰陽且解濕熱及酒食暑氣之毒不問赤白通宜用之東坡治文潞公有效

方

痰澼卒風 生薑二兩附子一兩水五升煮二升分服忌猪肉 千金

胃虛風熱 不能食用生薑汁半杯生地汁少許蜜一匙水二合和服之 食療

瘧疾寒熱 脾胃聚痰發為寒熱生薑四兩搗汁一酒杯露一夜於發日五更面北立飲未止再服 易簡

寒嗽不止 生薑五兩餳半升火熬熟食盡效 初虞世

久患欬噫 薑汁半合蜜一大匙煎溫服效 外臺方

乾嘔厥逆 頻嚼生薑嘔家聖藥也

嘔吐不止 生薑二兩醋二合石器煎連渣服又殺腹內長虫 食醫心鏡

心痞嘔噦 心下痞堅生薑八兩煮一升半夏五合洗盡涎滑水

鳴皋曰點眼一方久聞其效惜未試也

鳴皋曰辛藥必溫謂薑皮辛涼似不宜然昂曰薑皮能行水五皮散用之以皮行皮皋曰王氏云丨丨心脾二經氣分藥余以為脾胃二經藥以其守中也又為肺經藥

五升煮一升取汁同煮分服　千金　**反胃羸弱**　兵部手集用生薑二斤搗汁作粥食○傳信方用生薑切片麻油煎過為末軟棗釀嚼嚥　**消渴飲水**　生薑焙乾一兩為末以鯽魚胆和丸梧子大米飲下七十丸　聖惠　**暴赤眼腫**　寇宗奭曰用古銅錢刮生薑汁點之淚出今日點明日愈勿疑○一治暴風客熱目赤睛痛腫者臘月取生薑搗汁陰乾取粉入銅青末等分每以少許沸湯泡澄清溫洗淚出妙　**牙痛**　老生薑焙為末入枯礬末擦之一人日夜呻吟用之即愈　普濟　**食野禽毒**　**猘犬傷人**　並飲薑汁即解　小品　**刀斧金瘡**　生薑嚼傳勿動次日即生肉甚妙　扶壽　**跌撲損傷**　生薑汁和酒調麪貼之　簡易方

薑皮　辛涼消浮腫腹脹痞滿和脾胃去翳　時珍

乾薑　又名白薑　頌曰造法采根於長流水洗過晒為丨丨以漢溫池州者為良　時珍曰丨丨以母薑

以其性上僭也故仲景云亡血〻虛用人參肺寒者去參加丨丨無令氣壅也至於入肝入腎宜以肝腎藥引之

〔希雍曰〕丨丨言止血者蓋血虛則發熱〻則妄行丨丨炒黑則能引諸補血藥入陰分補血也

〔季曰〕韓太史鶴莊腹中患濕熱積滯泄瀉面目晦黑醫用消補藥不效淹延半年或令服丨丨炭遂暢下積滯而愈大明消宿食之文可徵也

〔希雍曰〕同朮用能逐風濕痺　炒黑同生地白芍當歸牛膝治產後惡露不盡血虛發熱　同橘皮朮貝茯苓治痰瘧久不愈

造之今江西襄均皆造以白淨結實者為良故人呼為白薑入藥並宜炮用

辛溫〔褚曰〕苦辛〔好古曰〕大熱　治胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢生者尤良本經　寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血別錄　治腰腎間冷痛冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑宣通諸絡脉去風毒冷痺夜多小便甄權　消痰下氣治轉筋吐瀉反胃乾嘔撲損瘀血止鼻紅解冷熱毒開胃消宿食大明　主心下寒痞目睛久赤好古

發明〔元素曰〕丨丨氣薄味厚半沉半浮可升可降陽中之陰也又曰大辛大熱陽中之陽其用有四

通心助陽一也去臟腑沉寒錮冷二也發諸經之寒氣三也治感寒腹痛四也腎中無陽脉氣欲絶黑附子爲引水煎服名薑附湯亦治中焦寒邪寒淫所勝以辛散之也又能補下焦故四逆湯用之｜｜本辛炮之稍苦故止而不移所以能治裏寒非若附子行而不止也理中湯用之者以其回陽也杲曰｜｜生辛炮苦陽也生則逐寒邪而發表炮則逐胃冷而守中多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣也須生甘草緩之辛熱以散裏寒同五味子用以温肺同人參用以温胃也好古曰｜｜心脾二經氣分藥也故補心氣不足或言｜｜辛熱而言補脾今理中湯用之言泄不言補何也蓋辛熱燥濕泄脾中寒濕邪氣非泄正氣也又云服｜｜以治中者必僭上不可不知震亨曰｜｜入肺中利肺氣入腎中燥下濕入肝經引血藥生血同補陰藥亦能引血藥入氣生血故血虛發熱産後大熱者用之止唾血利血須炒黑用之有血脱色白面夭不澤脉濡者此大寒也宜｜｜之辛温以益血大熱以温經時珍曰｜｜能引血藥

入血分氣藥入氣分又能去惡養新有陽生陰長之
意故血虛者用之凡人吐血衄血下血有陰無陽者
亦宜用之乃熱因熱用從治法也【又曰】大清外術言
孕婦不宜食｜｜令胎內消蓋其性熱辛散故也【韓
保昇曰】久服
令人目暗
方　**脾胃虛冷**　不下食成瘵者用｜｜漿水煮透取
出焙乾為末陳米粥丸每服三五十
丸神效
蘇頌　**脾胃虛弱**　食減易傷難化無力肌瘦｜｜研
末四兩以白餳浴化和丸桐子大
每米飲下三十
丸　十便良方　**陰陽易病**　傷寒後婦人雖愈未滿百
日不可與男子合為病拘
急手足拳腹痛欲死丈夫名陰易女名陽易宜汗之
即愈滿四日不可治也｜｜為末每用一兩白湯調
下覆被取汗手足伸
即愈　傷寒類要　**中寒水瀉**　｜｜炮為末粥飲下
二錢甚效　千金
寒痢青色　｜｜切豆大每米飲服六七
枚日三夜一甚效　肘後方　**血痢不止**　｜｜
乾薑

八十六

炒黑存性為末每服一錢　外臺用｜｜高
米飲下神驗　姚氏集驗　脾寒成瘧　良薑等分為末
每服一錢水煎服〇又｜｜炮皂角
炒黑為末臨發時酒服三錢　欬嗽上氣　炮去皮子桂
心去皮同研等分白蜜和擣三千杵丸梧子大每飮
下三丸日三服忌食葱麪油膩其效如神李亞每用
此治人而不傳方或誚其吝李曰凡人患嗽
多進涼藥若見此方必不服也　傳信方　冷氣欬
嗽｜｜末酒調服或　吐血不止　｜｜(宜炒黑)為末童便調服
餳丸服　姚僧坦　一錢良　廣利方
赤眼濇痛　｜｜粉泡湯點洗〇又方令人嚼｜｜
以舌日舐五六次以愈為度　聖濟　瘧
疽初起　｜｜炒紫為末醋調傳四圍留
頭自愈此奇方也　諸症辨疑　瘰癧不斂　｜
末生薑汁打糊為劑黃丹為衣隨瘡大小入藥在內
追膿盡生肉口合為度如不合以葱白汁調大黃末
搽之即愈
救急方

〔時珍曰〕入手足太陰肺脾二經〔昂曰〕色白故入肺味甘故歸脾肺為腎母故又益腎虛則補其母也脾為心子故又益脾子能令母實也能清虛熱者補陰之功能止泄痢者滲濕之功其性濇故又治遺精也

山藥 又名諸薯（音諸） 山藷（圖經） 薯蕷（本經） 山芋（吳普） 玉延（同上） 修脆（同上）

甘平補虛羸除寒熱邪氣補中益氣長肌肉強陰（本經）主頭面遊風止腰痛治虛勞羸瘦除煩熱（別錄）鎮心神安魂魄補心氣不足開心孔多記事（甄權）主泄精健忘（大明）益腎氣健脾胃止洩痢化痰涎潤皮毛（時珍）生搗貼腫硬毒能消散（震亨）

〔之才曰〕忌甘遂〔宗奭曰〕古方皆用乾｜｜蓋生則性滑不可入藥熟則滯氣只堪啖竹刀削皮陰乾或微火烘乾亦佳〔斅曰〕用山中野生者佳

〔發明〕〔訒曰〕利丈夫助陰力熟煮和蜜或為湯煎或為粉並佳乾之入藥更妙〔杲曰〕｜｜入手太陰仲

〔鳴皋曰〕余少患氣淋服縮泉丸得效遇一良醫謂余曰汝知縮泉用｜｜糊丸之意乎益智得｜｜則不上僭也初用米湯丸果覺上僭以｜｜丸則佳後余凡用辛燥藥必用｜｜灦湖以｜｜制蒼术大有理

景八味丸用乾｜｜以其凉而能補也亦治皮膚乾燥以此潤之〔時珍曰〕吴綬云｜｜入手足太陰二經補其不足清其虛熱又王履泂集云｜｜雖入手太陰然肺為腎之上源〻既有滋流豈無益此八味丸所以用其强陰也又曹毗杜蘭香傳云食｜｜可以辟霧露

方

心腹虛脹 手足厥逆或飲苦寒之劑多未食先嘔不能飲食｜｜半生半炒為末米飲下二錢一日二服大有功效忌鐵器生冷 普濟

噤口痢 ｜｜半生半炒為末服二錢米飲下 衛生易簡方

痰氣欬急 生｜｜擣爛半碗入甘蔗漿半碗和匀頓熱服 簡便單方

濕熱虛泄 ｜｜蒼术等分飯丸米飲服大人小兒皆宜 灦湖經驗

腫毒初起 ｜｜帶泥蓖麻子糯米等分水浸研傳之即散 普濟

項後結核 或赤腫硬痛以生｜｜一挺去皮蓖麻子二箇同研貼之如神 救急良方

【昂曰】百合潤肺寧心【嗚象曰】淚係肝熱觀於能止涕淚治邪魅及顛邪狂叫驚悸是又能清肺益肝也

【象曰】同柴胡知母等藥用亦治瘧

零餘子 即山藥子

甘温補虛損强腰脚益腎

百合 又名强瞿 別錄 蒜腦藷 俗名【弘景曰】俗呼强仇 即强瞿之訛【吳普曰】一名重邁 一名中庭

集解【恭曰】花白者宜入藥【時珍曰】｜｜葉似竹葉而短不似柳葉五六月莖端開大白花長五寸六出紅蕊四垂色亦不紅〻者葉似柳乃山丹也｜｜結實畧似馬兜鈴內子亦似之

甘平無毒【權曰】有小毒

治邪氣心腹脹痛利大小便補中益氣 本經 除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚 別錄 百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬 甄權 安心定膽 所以治百合病 益志養五臟治顛邪狂叫驚

朱二允曰久嗽之人肺心虛〻則宜斂｜｜之斂勝於五味之酸收也

李士材曰｜｜治百合病亦清心安神之效耳

悸産後血狂運殺蠱毒氣腸癰乳癰發背諸瘡腫 大明

心急黃宜蜜蒸食之 孟詵 治百合病 宗奭 溫肺止嗽 元素

發明 頌曰仲景治百合病有｜｜知母湯｜｜滑石代赭石湯｜｜雞子湯｜｜地黃湯凡四方病名百合而用｜｜治之不識其義 時珍曰王維詩云冥搜到｜｜真揆當重肉果堪止淚無欲縱望江目蓋取本草止涕淚之說

方 百合病｜｜知母湯治傷寒後百合病行住坐臥不定如有鬼神狀已發汗者用｜｜七枚泉水浸一宿更以泉水二升煮一升以知母三兩用泉水二升煮一升同｜｜汁再煮取升半分服○雞子｜｜湯治百合病已經吐後者｜｜七枚泉水浸一夜明旦更以泉水二升煮一升入雞子黃一箇分服○｜｜代赭石湯治百合病已經下後者｜｜七枚泉水浸一夜明旦更以泉水二升煮取一升

却以代赭石一兩滑石三兩水二升煮取一升同丨丨汁再煮取升半分服○丨丨地黃湯治百合病未經汗吐下者丨丨七枚泉水浸一宿明旦更以泉水二升煮取一升入生地黃汁一升同煎取升半分二服 並金匱要略

百合變渴 病已經月變成消渴者丨丨一升水一斗漬一宿取汁溫浴病人浴畢食白湯餅 陳延之小品方

百合變熱 丨丨一兩滑石三兩為末飲服方寸匕 小品方

百合腹滿 作痛者丨丨炒為末飲服方寸匕 同上

肺病吐血 新丨丨搗汁和水飲亦可煮食 衛生易簡方

耳聾耳痛 乾丨丨為末溫水服二錢日三 千金方

山丹

又名紅百合 日華

時珍曰葉短而濶微似竹葉白花四垂者百合也葉長狹尖如椰葉紅花不四垂者丨丨也莖葉似丨丨而高紅花帶黃而四垂上有黑斑點其子四月先結於枝葉閒入秋開花在顛項者卷丹也大抵一類三種也

〔時珍曰〕入太陰肺脾陽明腸胃少陽三焦氣分

甘涼〔正要曰〕平 治瘡腫驚邪〔大明〕 女子崩中〔時珍〕

萊菔〔音北〕又名蘆萉〔郭璞〕蘆音羅萉音北蘿蔔〔音北〕

根辛甘葉辛苦溫散服及炮煮服大下氣消穀和中去痰癖生搗汁服止消渴大驗〔唐本〕 利關節練五臟惡氣制麪毒行風氣去邪熱〔蕭炳〕 消痰止嗽治肺痿吐血溫中同羊肉銀魚煮食治勞瘦欬嗽〔日華〕 生搗服治禁口痢〔汪穎〕 汁服治吐血衂血〔吳瑞〕 寬胸膈利大小便生食止渴寬中煮食化痰消導〔甯原〕 治豆腐積〔汪機〕 主呑酸化積滯解酒毒散瘀血甚效末服治五淋丸服治白濁

煎湯洗脚氣飲汁治下痢及失音并烟熏欲死生擣北方燒石炭往往熏死未死者

塗打撲湯火傷生擣此即鮮 時珍

鳴案曰 亦忌何首烏

【思邈曰】不可與地黃同食令人髮白爲其澀營衛也

【時珍曰】多服ㅣㅣ動氣惟生薑能制其毒又伏硇砂

發明 【頌曰】ㅣㅣ功同蕪菁然力猛更出其右斷下方亦用其根燒熟入藥尤能制麪毒故相傳食麪必啖ㅣㅣ【炳曰】擣爛制麪食飽食亦不發熱酥煎食之下氣凡飲食過度生嚼食之便消【宗奭曰】服地黃首烏食ㅣㅣ則令人髭髮白世皆以爲此物味辛下氣速也然薑芥更辛何止能散而已蓋ㅣㅣ辛而又甘故能散緩而又下氣速也所以散氣用生薑下氣用ㅣㅣ【震亨曰】ㅣㅣ屬土有金與水寇氏言其下氣速人往往煮食過多停滯成溢飲豈非甘多而辛少乎【時珍曰】ㅣㅣ根葉同功生食升氣熟食降氣蘇氏寇氏止言其下氣速孫真人言久食澀營衛亦不知其生則噫氣熟則泄氣升降之不同也大抵入太陰

陽明少陽氣分故所主皆肺脾腸胃三焦之病李九
華云丨丨多食滲人血則其白人髭髮蓋亦由此非
獨因其下氣澀營衛也洞微志云有人病狂云夢中
見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌遂歌云五靈樓
閣起玲瓏天府由來是此中惆悵悶懷言不盡一丸
丨丨火吾宮有一道士云此犯大麥毒也少女心神
小姑脾神醫經言丨丨制麪毒故曰火吾宮火者數
也遂以藥并丨丨治之果愈張杲醫說云饒民李七
病衄甚危醫以丨丨汁和無灰酒飲之即止蓋血隨
氣運氣滯故血妄行丨丨下氣而酒導之故也又云
一人食豆腐中毒醫治不效偶見造豆腐者誤以丨
丨湯入鍋中遂致不成其人心悟飲丨丨湯而愈物
理之妙如此又延壽書載李師逃難入石窟中賊以
烟熏之垂死摸得丨丨嚼汁嚥下便甦此法可備急
不可
不知
方丨食物作酸丨丨生嚼數片即愈乾者熟者鹽灰
醃者及人胃冷者皆不效 瀕湖

生搗汁服或汁煮粥

胃噎膈 ｜｜蜜煎浸細こ嚼下良 普濟方 **消渴** 服或日乾為末每服二錢猪肉湯澄清調下日三 圖經本草 **肺痿嗽血** ｜｜和羊肉或鯽魚煮食妙 普濟 **衄**

血不止 方見發明又以汁注鼻中亦良 易簡 **下痢禁口** ｜｜一盞蜜一盞水一盞同煎早一服午一服日晡呑阿膠丸百粒無｜｜以子研汁亦可一方用枯礬七分同煎一方｜｜煮汁恣飲 **大腸便血** 大｜｜皮燒存性荷葉燒存性蒲黃生用等分為末每服一錢米飲下 普濟 **大腸下血** 蜜炙｜｜任意食之甚效 百一選方 **小便白濁** 生｜｜剉空留盞入吳茱萸填滿盞定糯米飯上蒸熟去萸以｜｜研丸梧子大鹽湯下五十丸 普濟 **沙石諸淋** 痛不可忍蜜浸炙乾如此數次不可炙焦細嚼鹽湯下日三 名瞑眩膏 普濟方 **偏正頭痛** 生｜｜汁一蜆殼仰卧隨左右注鼻中神效王荆公病頭痛有人傳此方數十年之病二注而愈以此治

人不可勝數如宜失音不語｜｜搗汁入薑汁服 普濟 喉痺｜｜汁和皂角漿服

取吐痰同上滿口爛瘡｜｜汁漱吐去涎妙 瀕湖 湯火傷｜｜汁塗之 聖惠

打撲傷皮未破者｜｜搗封之 邵氏

蘿蔔子

辛甘平研汁服吐風痰同醋研消腫毒日華下氣定欬

治痰消食除脹利大小便止氣痛下痢後重發瘡疹 時珍

發明震亨曰｜｜｜治痰有推牆倒壁之功(生用) 時珍曰｜｜｜之功長於利氣生能升熟能降升則吐風痰散風寒發瘡疹降則定痰欬嗽調下痢後重止內痛皆是利氣之效予嘗用之果有殊功

方

上氣痰嗽 歘促唾膿血以｜｜｜一合研細煎服 食醫心鏡

肺痰欬嗽 ｜｜｜半升淘淨焙乾炒黃為末以糖和丸芡子大綿裹含之嚥汁甚妙 勝金方

齁歘痰促 遇厚味即發者｜｜｜蒸熟晒研薑汁浸蒸餅丸梧子大每服三十丸口津嚥下名清金丸日三 醫學集成

痰歘 ｜｜｜炒皂莢燒存性等分為末薑汁和鍊蜜丸梧子大每服五七十丸白湯下 醫易單方

久嗽痰歘 ｜｜｜炒杏仁去皮尖等分蒸餅丸梧子大頻服 醫學集成

高年氣歘 ｜｜｜炒研蜜丸梧子大 勝金用｜｜每服五十丸 濟生秘覽

宣吐風痰 ｜末溫水調服三錢良久吐出痰涎○丹溪吐法｜｜｜半升擂細以水一椀濾取汁入香油少許溫服以桐油浸鵞翎晒乾探吐

中風口噤 ｜｜｜牙皂莢各二錢水煎服取吐 丹溪

小兒風寒 ｜｜｜生研末一錢溫葱酒服取微汗大效 衛生易簡方

風秘氣秘 ｜｜｜炒一合擂水

時珍曰入肺開胃鴻臯曰別錄云除腎經邪氣是亦入少陰矣

和皂莢末二錢服立通　壽域神方

年久頭風　｜｜｜生薑等分搗汁入麝香少許搐鼻立止　普濟方

瘡疹不出　｜｜｜生研末米飲服二錢良　衛生易簡方

芥

集解　蘇曰｜有三種葉大子粗者葉可食子入藥用葉小子細者葉不堪食子但作齏又有白｜子粗大白色如白粱米甚辛美從西戎來頌曰青｜似菘有毛味極辣紫｜莖葉純紫作齏最美有白｜見本條時珍曰青｜又名刺｜似白菘有柔毛有大｜又名皺葉｜大葉皺紋色尤深綠味更辛辣二｜宜入藥用有馬｜葉如青｜有花｜葉多刻缺如蘿蔔英紫｜莖葉皆紫石｜低小皆以八九月下種冬月食者俗呼臘菜春月食者俗呼春菜四月食者俗呼夏菜三月開黃花四出結莢一二寸子大如蘇子而色紫味辛研末泡過為｜醬

莖葉 辛温歸鼻除腎經邪氣利九竅明耳目安中久食温中 別録 止欬嗽上氣除冷氣 日華 主欬逆上氣去頭面風 孟詵 通肺豁痰利膈開胃 時珍

〔思邈曰〕同兎肉食成悪邪病同鯽魚食發水腫〔原曰〕瘡瘍痔疾便血者忌之〔詵曰〕煮食多動氣與風生食多發丹石大葉良細葉有毛者害人

發明〔時珍曰〕丨性辛熱而散故能通肺開胃利氣豁痰久食則積温成熱辛散太盛耗人真元肝木受病昏眼目發瘡痔而別録謂其明耳目者蓋知暫時之快而不知積久之害也素問云辛走氣〻病無多食辛多則肉胝而唇褰此類是矣

方 飛絲入目 青丨汁點之如神 摘元方 痔腫痛 丨葉搗餅頻坐之 談埜

鳴皋曰芥子自係肺經主藥而利氣豁痰又胃經藥其氣辛竄時珍云能散瘀是又旁及肝經矣

顖音信

翁經效方

芥子

辛熱歸鼻去一切邪惡疰氣喉痹（弘景）疰氣發無常處及射工毒丸服之或搗末醋和塗之隨手有驗（蘇恭）治風毒腫及麻痹醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研塗貼之又治心痛酒調服之（日華）研末作醬通利五臟（孟詵）研末水調塗頂顖止衄血（吳瑞）溫中散寒豁痰利竅治胃寒吐食肺寒咳嗽風冷氣痛口噤唇緊消散癰腫瘀血（時珍）

發明〔時珍曰〕｜｜功與萊同其味辛其氣散故能利
九竅通經絡治口噤耳聾鼻衂之證消瘀血癰
腫痛痺之邪其性熱溫中故又能利氣豁痰治嗽止
吐主心腹諸痛白｜子辛烈更甚治病尤良見本條
方　風毒麻痺醋研傅日華　撲損瘀血和生薑研塗同上　腰痛腎
痛同上　心痛酒調服之同上　止衂血研末水調貼頂顖吳瑞　感寒無
汗水調｜｜末填臍內以熱物隔衣熨之取汗楊起簡便單方　中風口噤舌本縮者｜｜
一升研入醋二升煎一升傅於頷頰下效聖惠方　耳卒聾芥子末人乳和綿裹塞之外臺
鬼疰勞氣｜｜三升研絹袋盛入三斗酒中七日溫飲日三廣濟　霍亂吐瀉｜｜
研水調塗臍上聖濟　反胃｜｜末酒服方寸七日三千金方　上氣嘔吐｜｜末蜜
丸桐子大井華水寅時下七丸申時再服千金　臍下絞痛方同上　腰脊痛｜｜

末酒調貼之立效 摘元 一切瘜腫 猪胆汁調丨丨末貼之 千金翼 瘜腫熱毒
家丨丨末同柏葉擣塗無不愈者大驗得山芥更妙 千金翼 婦人經閉 至一年者臍腹痛腰腿沉重寒熱往來用丨丨二兩為末熱酒調二錢食前服 陰症傷寒 腹痛厥逆丨丨研末水調貼臍 生生編

白芥子 又名胡芥 蜀本 蜀芥 時珍曰 種來自戎而盛於蜀故名

集解 恭曰 丨丨丨粗大白色如白梁米甚辛美 保昇曰 白芥葉大子白且粗入藥最佳 時珍曰 白芥處處可種但人知種之者少耳八九月下種冬生可食春深莖高二三尺莖易起而中空性脆大風雪須謹護之乃免摧折三月開黄花結角如芥角子大黄白色又一種莖中實者尤高大其子亦大雖是芥類迥然别種也然入藥勝於芥子

辛溫發汗主胸膈痰冷上氣面目黄赤又醋研傅射工毒別錄辟惡氣遁尸飛尸及暴風毒腫流四肢疼痛弘景燒烟及服辟邪魅日華藏器曰入鎮宅方用欬嗽胸脇支滿上氣多唾者每用溫酒吞下七粒思邈利氣豁痰除寒暖中散腫止痛治喘嗽反胃痺木脚氣筋骨腰節諸痛時珍

發明震亨曰痰在脇下及皮裏膜外非｜｜｜莫能達古方控涎丹用之正此義也時珍曰｜｜｜辛能入肺溫能發散故有利氣豁痰溫中開胃散痛消腫辟惡之功按韓悉云凡老人苦於痰氣喘嗽胸滿懶食不可妄投藥利之劑反耗真氣悉因人求治其親為處三子養親湯治之隨試隨效蓋｜｜｜主白芥子

〔昂曰〕過煎則無力

痰下氣寬中紫蘇子主氣定歎止嗽蘿蔔子主食消痞降氣各微炒研破看所主為君每劑不過三四錢用生絹袋盛入湯煮飲之勿煎太過則味苦辣若大便素實者入蜜一匙冬月加薑一片尤良南陵朱齊有辭贊之

方 反胃上氣｜｜｜末酒服一錢 普濟方 熱痰煩運｜｜｜黑芥子大戟甘遂芒硝硃砂等分為末糊丸梧子大量服一二十丸薑湯下名白芥丸 普濟方 冷痰痞滿黑芥子｜｜｜大戟甘遂胡椒肉桂等分為末糊丸梧子大每服十丸薑湯下名黑芥丸 普濟方 腹冷氣起｜｜｜一升微炒研蒸餅丸小豆大每用薑湯吞十丸甚妙 續傳信方 脚氣作痛方見白芷 小兒乳癖｜｜｜研成膏攤貼以平為度 本草權度 防痘入目｜｜｜調塗足心引毒歸下可免 ·全幼心法 胸脇痰飲｜｜｜五錢白朮一兩為末棗肉和

丸梧子大湯下 腫毒初起 ||| 醋調塗 五十丸 摘元 瀕湖集簡方

下氣 消食 治嗽 解毒 治瘡 降血

蔓菁 又名蕪菁 別錄 九英菘 食療 諸葛菜

根葉 苦溫 時珍曰辛甘苦 利五臟 別錄 常食通中 蘇頌 消食下氣治嗽止消渴去心腹冷痛及熱毒風腫乳癰妬乳寒熱 孟詵

方 衂血 蔓菁搗汁飲 十便良方 丁腫有根 用大鐵針刺作孔削蔓菁根如針大染鐵生衣捻入孔中再以蔓菁根鐵生衣等分搗塗有膿出即易須臾根出忌口 肘後方 乳癰寒熱 蔓菁根并葉蒷搗傅熱即換三五次即瘥只用根亦可此方已救數十人須避風 兵部手集 陰腫如斗 蔓菁根搗封能治人所不能治者 集療 犬咬傷重發者蔓菁根搗汁服

附後 飛絲入目 蔓菁葉汁滴之 神效 普濟 一切腫毒 生蔓菁根一握入鹽花少許同擣封之日三易之

子 苦辛平明目 別錄 療黃疸利小便水煮汁服主癥瘕積聚少少飲汁治霍亂心腹脹末服之主目暗 蘓恭 和油塗蜘蛛咬傷 藏器 油塗頭能變蒜髮 孟詵 入丸藥服令人肥健尤宜婦人 蕭炳

發明 〔藏器曰〕仙經言蔓菁子九蒸九曬為末可斷穀長服蜘蛛咬傷者恐毒入內為末酒服亦以油和塗之蔓菁園中無蜘蛛是其相畏也〔時珍曰〕蔓菁子可升可降能汗能吐能下能利小便又能明目解毒其功甚偉而世罕知用何哉 子油點燈甚明然烟損目

通肝 去風 去濕 通氣 髮長 明目 解毒 治黃疸

〔昂曰〕腹脹搗濾汁飲或吐或下腹中自寬得汗即愈

〔鳴泉曰〕丨丨丨之性生則以通為用蒸熟有補之功觀其明目治青盲是入肝經也能治黃汗急黃是入脾胆二經也能治霍亂腹脹通二便關格能吐能下是又中焦脾胃藥也能汗則又入肺也

〔又曰〕黃疸有因濕熱者有因血瘀者丨丨丨之治黃疸亦能通血分矣肝開竅於目目得血而能視惟能通血分故治目故蕭炳云尤宜婦人也

〔又曰〕其功長於治目自係肝經主藥

方　明目益氣 蔓菁子一升水九升煮乾如此三度研服方寸匕亦可煮粥食　外臺

明目 蔓菁子三升醋三升煮熟日乾為末井華水服日三抱朴子云服盡一升能夜視見物　千金

青盲障翳 但瞳子不壞十得九愈蔓菁子六升蒸之日乾以釜中湯淋之如是三遍研末酒服方寸匕日再

虛勞目暗 海上方方同上

補肝明目 蔓菁子一斤黃精二斤同和九蒸九晒為末米飲下○又方蔓菁子二升決明子一升酒煮為末水調服　聖惠

風邪攻目 視物不明肝氣虛者蔓菁子四兩入甆瓶中燒黑取出入蛇蛻二條又燒成灰每食後酒下半錢　聖濟

黃汗染衣 涕唾皆黃蔓菁子為末井華水服一匙日再加至二匙以知為度不過服五升當愈　外臺秘要

黃疸如金 生蔓菁子末湯服方寸匕日三　孫真人食忌

急黃及內黃 腹結不通蔓菁子末水絞汁服當得嚏鼻出黃水及下利則愈子油服一盞更佳　本草拾遺

二

昂曰寒泄熱甘益脾

行水治消渴貼腫毒

便關格脹悶欲死蔓菁子油空腹服一合即通汗出勿怪聖惠 心腹作脹蔓菁子打和水絞汁服以頃自利或吐或汗即愈外臺 霍亂脹痛蔓菁子水煮汁飲瀕湖集簡 妊娠尿澀蔓菁子末水服方寸匕子母秘錄 風疹入腹體强舌乾硬蔓菁子末酒服一錢聖惠 骨疽不愈骨從孔中出者蔓菁子擣傳之日一易千金 小兒頭禿蔓菁子末和傳日三千金

花辛平治虛勞目暗久服可夜讀書三月三日采花陰乾爲末每服二錢空心井華水下慎微

冬瓜又名白瓜本經

甘微寒弘景曰冷利 治小腹水脹利小便止渴別錄 擣汁服

止消渴煩悶解毒弘景益氣除煩除心腹滿去頭面熱孟詵消熱毒癰腫切片摩痱子甚良大明利大小腸壓丹石毒蘇頌

發明詵曰熱者食之佳冷者食之瘦人煮食練五臟爲其下氣故也宗奭曰凡患發背及一切癰疽者削一大塊置瘡上熱則易之分散熱毒甚良震亨曰丨丨性走而急寇氏謂其分散熱毒氣蓋亦取其走而性急也久病滑瀉虛寒者忌之孫眞人言九月勿食令人反胃須被霜食之乃佳詵曰丨丨一箇和桐葉飼猪肥與諸物食一冬大可三四倍

方消渴丨丨一枚埋地中一月取出破開取清水飲之或燒熟絞水飲之亦佳聖濟産後渴痢久病津液枯竭四肢浮腫口舌乾燥用丨丨一枚黃泥厚五寸包煨熟絞汁飲亦治傷寒

昂曰——亦行水之劑

行水
主折傷

補肝
明目
治腸
癰

渴痢古今錄驗 小兒渴痢——汁飲之千金 水病危急——任意吃之神驗

兵部手集 十種水氣浮腫欲滿大——一枚切蓋去瓤以赤小豆填滿蓋合簽紙泥封固糠火煨一日取出焙乾為末糊丸梧子大每服七十丸——煎湯下小便利為度楊氏

冬瓜皮 治驢馬汗入瘡腫痛陰乾為末塗之又主折傷損痛時珍

方 跌打損傷乾———一兩真牛皮膠一兩炒研末每服五錢好酒熱下仍飲酒一杯厚蓋取汗其痛即止極效摘元方 損傷腰痛———炒研酒服一錢生生編

冬瓜子 又名白瓜子

甘平別錄曰甘寒 除煩滿不樂作面脂令人好顏色別錄 去

〔案曰〕||絡所主通經絡行血脉下乳汁治疝痛及崩中乾血氣痛皆是肝家之病是為足厥陰肝經之藥

通經絡 行血脉 下乳 去風 治便血 療疝痛 血氣痛 發痘瘡

皮膚風潤肌膚大明補肝明目治腸癰時珍

方 補肝明目 治男子五勞七傷明目用||||七升絹袋盛投沸湯中須臾取晒乾如此三度又以清苦酒漬二宿晒乾為末日服方寸匕○又法取子三五升去皮為丸日服三五十丸外臺

多年損傷 不瘥者||||為末酒服 孫真人方

白帶 陳||||炒末米飲服五錢 救急良方

男子白濁 同上

絲瓜

又名天絲瓜 本事 天羅 事類合璧

甘平 入藥用老者 治痘瘡不快用枯者燒存性入朱砂研末蜜水調服甚妙 震亨 煮食除熱利腸老者燒存性服去風化痰涼血解毒殺虫通經絡行血脉下乳汁治

絲瓜

九十九

［汪頴曰］——本草諸書無考惟痘瘡及脚痤方中燒灰用亦取其性冷解毒耳
［果曰］一人臂痛十餘年諸治不效一醫與桂枝絲瓜絡服之遂愈足見其通脉絡臟腑而去風之功

大小便下血痔漏崩中疝痛卯腫血氣作痛痤疽瘡腫齒䘌痘疹胎毒 特珍 暖胃補陽固氣和胎 生編

發明［時珍曰］老——筋絡貫串聯屬故能通人脉絡及臟腑而去風解毒消腫化痰袪痛殺虫治諸血病

方 痘瘡不快 初出或未出多者可令少少者可令稀 老——近蒂三寸連皮燒存性研砂糖水服

腸風下血 本事方老絲瓜燒存性為末酒下二錢○普濟方危篤不可救者——一箇燒存性槐花減半為末米飲下 直指方

血崩不止 老——燒存性棕燒灰等分塩酒或塩湯下 奇效良方

經脉不通 ——一箇為末白鴿血調成餅研末每服二錢酒下先服四物湯日三服 見海上名方

乳汁不通 乾——連子燒存性研酒服一二錢被覆取汗 簡便單

方
乾血氣痛 婦人血氣不行上衝心膈變為乾血氣
者｜｜一箇燒存性空心溫酒下 壽
域
小腸氣痛 繞臍衝心連蔕老｜｜燒存性為末
方 酒調下三錢甚者不過兩三服即消 夘
腫偏墜 ｜｜初結者留之待瓜結盡葉落取下燒存
性為末用白蜜調成膏每燒酒服一匙患左
左腄患右ヽ 卒然中風 防風荊芥一兩升麻五錢薑
腄 保壽堂 三片水一盞煎半盞以｜｜
子研取漿半盞和勻 百藥不效者用此大
灌之 唐瑤經驗方 風氣牙痛 能去風惟虫牙不效
老｜｜一箇擦鹽燒存性研末頻擦涎盡即愈腮腫
以水調貼之馬叔敏云此嚴月軒家傳屢效之方一
試便可 水蠱腹脹 老｜｜去皮一枚剪碎巴豆十四
腄也 粒同炒豆黃去豆以瓜同陳倉米
再炒熟去瓜研末為丸梧子大每服百丸蓋米收胃
氣巴豆逐水｜｜象人脉絡借其氣以引之此元名
醫宋會
之方也
絲瓜

本草方藥參要卷七目録

菜部

茄 蒂 根 莖 葉　蕓薹 子　白菜

馬齒莧　萵苣子　木耳 桑耳 槐耳 白木耳

獸部

猪 全件附　犬 全件附　羊 全件附

牛 全件附　黄明膠　牛黄

馬 全件附　驢 尿 屎　阿膠

虎 全件附　犀角　羚羊角

鹿全件附　鹿角膠　麋茸角

麝　熊胆　象牙胆

水獺肝　猬皮　兎全件附　敗筆

鼠全件附

鱗介魚虫部

龍　蚺蛇胆　白花蛇

烏蛇　蝮蛇　蛇蜕

鯉魚　鯽魚　青魚

鱧魚　鱖魚　鱓魚

鰻鱺　石首魚　烏賊魚
膃肭臍　鮑魚　穿山甲
黿　瑇瑁　鱉
蠏　石蠏　海蛇
蝦　牡蠣　蛤粉 文蛤 海蛤
石決明　魁蛤　車渠
珍珠　田螺　蝸牛
蜂蜜　黃蠟　蜜蜂子
土蜂　大黃蜂　露蜂房

白蠟

本草方藥參要卷七

如皋戴鳴皋著

菜部

茄子 又名落蘇(拾遺) 崑崙瓜(御覽) 草鼈甲〔王隱居曰〕治瘧方用乾茄能治寒熱故名草鼈甲

散血
消腫

甘寒治寒熱五臟勞(孟詵) 治溫疾傳尸勞氣醋摩傅腫毒(大明) 老裂者燒灰治乳裂(震亨) 散血止痛消腫寬腸(時珍)

〔志曰〕多食發瘡及痼疾〔李廷飛曰〕秋後食多損目〔時珍曰〕生々編云——性寒利多食必腹痛下利女子傷子宮也

發明〔震亨曰〕——屬土故甘而喜降大腸易動者忌之老實治乳頭裂根煮湯漬凍瘡折蒂燒灰治口瘡俱獲奇效皆甘以緩火之義也〔時珍曰〕段氏酉陽雜俎言茄厚腸胃動氣發疾蓋不知茄之性滑不

茄蒂 花 根莖葉

〔鳴皋曰〕北方四五月新茄極佳無日不食無人不食曾無腹痛下利之說其發瘡及痼疾損目則有之一人患吼嗽歲發甚皋令其勿食茄是冬發甚輕

厚腸胃也

方　腸風下血　經霜ㄧㄧ連蒂燒存性為末每旦溫酒下二錢　靈苑方　腰脚拘

攣　腰脚氣血積冷筋急拘攣疼痛ㄧㄧ五十斤水五斗煮濃汁去滓更入小鍋中煎至一升即入生栗粉同煎令稀稠得所入射香朱砂末同丸梧子大每旦酒下三十丸近暮再服一月可愈男女通用皆效　圖經本草

磕撲青腫　老黃ㄧㄧ極大者切片焙乾為末卧時酒調服二錢一宿消盡無痕逐也　勝金方

墜損跌撲　散血止痛重陽日收老ㄧㄧ百枚去蒂切消石十二兩以磁器先鋪茄一重撒硝一重間鋪令盡以紙數重密置淨處上下以新磚承覆勿犯地氣至正月後取出去紙兩重日中曝之曝至二三月度茄已爛開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭再曝至成膏每以酒調半匙許空腹飲之日二惡血散則痛止而愈矣膏久乾硬米飲化用　圖經本草

發背惡瘡　上用

方酒服更以膏塗四圍甚妙圖經本草

大風熱痰 用黃老丨丨大者不拘多少以新瓶盛埋土中經一年盡化為水取出入苦參末同丸梧子大食已及卧時酒下三十丸甚效此方出江南人所傳

乳裂 同上 見發明

蒂 燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血痔吳瑞

生切擦癜風 時珍

發明 [時珍曰] 治癜風用茄蒂蘸硫附末摻之取其散血也白癜風用白茄蒂紫癜風用紫茄蒂

方 風蛀牙疼 茄蒂燒灰擦之或加細辛末等分 仁存堂

花 治金瘡牙疼 [時珍曰] 秋茄花乾之燒研塗痛處立止此海上名方也

根及莖葉 治凍瘡皴裂煮湯漬之良 開寶 散血消腫

鳴皋曰丨丨若云是蔓菁則惟江南有之北方並無此菜何云種自苦寒之地北方所種惟冬月之白菜夏月之小白菜所謂菘也且蔓菁之味亦不甚辛而日云辛溫江南人無日不食菜食油亦不覺其能破癥瘕積血時珍指丨丨為蔓菁不能無疑且丨丨之味甚佳何寇氏云不甚佳其衆

治血淋下血二痢陰挺齒䘌口蕈 時珍

方 血淋疼痛 茄葉烘乾為末每服二錢酒下或腸盐湯下隔年者尤佳 經驗良方

風下血 方同上 米飲下 牙齒䘌痛 茄根取汁塗之○陳茄根燒灰先以露蜂房煎水漱過傳之 海上名方 女子陰挺 茄根燒存性油調搽 乾坤生意 口中生蕈 用醋漱口以茄母燒灰飛盐等分醋調擱時時擦之 摘元方 取牙法 茄科以馬尿浸三日晒炒為末每用點牙即落真妙 鮑氏方

蕓薹 又名蔓菜 埤雅 油菜 綱目 寒菜 胡洽 胡菜 同上 時珍曰羌隴氐胡其地苦寒冬月多種此菜故名胡菜

寒菜

集解 宗奭曰丨丨不甚香經冬不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳 時珍曰丨丨方藥多用諸家註

不臭非葱蒜可比何道家忌為五葷之一
宜侯博雅攷證
又曰觀本經云辛溫其子又能行血破氣
疑是芥菜蔓菁之流蓋辛則能通也

亦不明今人不識為何菜珍訪攷之乃今油菜也
九月十月下種生菜形色微似白菜冬春採薹心
為茹開小黃花四瓣子如芥子灰赤色炒過榨油
黃色燃灯甚明食之不及麻油近人因有油種者
益
廣

莖葉 辛溫 [大明]曰凉 治風遊丹腫乳癰[唐本] 破癥瘕積血
[開寶] 治産後血風及瘀血[日華] 煮食治腰脚痺擣葉傅女
人吹乳[藏器] 治瘭疽豌豆瘡散血消腫伏蓬砂[時珍]
[別録]曰春月食之能發膝痼疾[詵]曰先患腰脚者不
可多食〻之加劇又損陽氣發瘡及口齒病胡臭人
不可食又能生腹中諸虫
道家特忌為五葷之一

發明 [藏器]曰｜｜破血故産婦宜食之[馬志]曰｜｜
宜血病[思邈]曰貞觀七年三月予在内江縣飲

多夜覺四體骨肉痛疼至曉頭痛額角有丹如彈丸腫痛至午通腫目不能開經日幾斃予思本草｜｜治風遊丹腫遂取葉搗傳隨手即消其驗如神也亦可搗汁服

方

丹毒 見發明

天火熱瘡 初起似痱漸如水泡似火燒瘡赤色急速能殺人｜｜葉搗汁調大黄末芒硝生鉄衣等分塗之 近效

一切腫毒 ｜｜苗葉根蔓菁根各三兩為末以雞子清和貼之即消若無蔓菁以商陸根代之甚效也 同上

血痢腹痛 日夜不止以｜｜葉搗汁二合入蜜一合温服 聖惠

腸風下血 同上

蕓薹子 辛温治夢中泄精與鬼交 思邈 行滯血破冷氣消腫散結治產難產後心腹諸疾赤丹熱腫金瘡血痔 時珍

發明

時珍曰蕓薹子葉同功其味辛氣溫能溫能散其用長於行血滯破結氣故古方消腫散結治產後一切心腹氣血痛遊風丹毒熱腫瘡痔諸藥咸用之經水行後加入四物湯服之云能斷產又治小兒驚風貼其頂顖則引氣上出也婦人方治產難歌云黃金花結粟米實細研酒下十五粒靈丹功效妙如神難產之時能救急

方

蕓薹散 治產後惡露不下血積氣衝刺痛後來纔遇冒寒踏冷其血必往來心腹間痛不可忍謂之血母並治產後心腹諸疾產後三日不可無此｜｜｜炒當歸桂心赤芍等分酒服三錢趕下惡物 楊氏產乳

補血破氣 追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍補血虛破氣塊甚效用｜｜｜微炒桂心各一兩良薑半兩為末醋丸梧子大每淡醋湯下五丸 靈苑方

腸風臟毒 下血｜｜｜生用炙甘草為末每服三錢水煎服 普濟方

蕓薹子 白菜

嗚皋曰北方之美無如黄芽白菜其味優於南方之笋多矣蘓恭云北土不生又云北土種之變為蕪菁又云味少苦豈彼之所謂菘非北土白菜之菘歟詳繹所云江南之白菜所謂箭幹白其味甚不佳雖煮熟少熟亦微帶苦其葉亞不似北菘之濶細長直上微似蔓菁葉所指之菘或是此也且北地人無論貧富無日不吃白菜未見少害至如大明孟詵弘景吳瑞時珍所說也

白菜 又名菘 別録

甘温 大明曰涼 **通利腸胃除煩解酒渴** 別録 **治瘴氣止熱氣嗽冬汁尤佳** 蕭炳 **和中利大小便** 寗原

大明曰涼微毒多食發皮膚風痒 詵曰發風冷內虛人不可食有熱者食之亦不發病性冷可知 弘景曰性和利人張仲景言藥中有甘草食菘即令病不除也 瑞曰夏至前食發氣動疾有足疾者忌之 時珍曰氣虛胃冷人多食惡心吐沫氣壯人則相宜

方 **小兒赤遊**行於上下至心即死菘菜搗傅之即止 張傑子母秘録 **漆瘡** 同上

方 **飛絲入目** ||揉爛汁滴之入目即出 普濟

馬齒莧 又名馬莧 別録 五行草 圖經 五方草 綱目

集解〔保昇曰〕有二種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀每十斤有八兩或十兩然至難燥當以槐木槌碎向日東作架晒之三二日即乾入藥須去莖〻無效〔斅曰〕大葉者不是｜｜｜亦無

水銀

酸寒治諸腫瘻疣目搗揩之破痃癖止消渴〔藏器〕治女人赤白下〔蘓頌〕飲汁治反胃諸淋金瘡流血破血癖癥瘕小兒尤良用汁治緊脣面皰鮮馬汗射工毒塗之瘥〔蘓恭〕作膏塗濕癬白禿杖瘡又主三十六種風煮粥止痢及疳痢治腸痛〔孟詵〕治瘡瘍殺諸蟲搗汁服當下惡物去白蟲和梳垢封丁腫又燒灰和陳醋滓先灸

帛曰赤反魚鱟

後封之即根出開寶散血消腫利腸滑胎解毒通淋治

產後虛汗時珍

時珍曰方士采取｜｜｜伏砒結汞煮丹砂伏硫黃死雄制雌別有法度

發明 時珍曰｜｜｜所主諸病皆取其散血消腫之功也 頌曰多年惡瘡百方不瘥痛焮不已者並搗爛傅上不過二三遍武元衡在西川苦脛瘡焮痒不可忍百醫不效到京有人傳此方用之便瘥事見兵部手集

方 脚氣浮腫心腹脹滿小便澀少｜｜｜和粳米醬汁煮食 食醫心鏡 產後血痢小便不通臍腹痛｜｜｜杵汁三合煎沸入蜜一合服 產寶 小兒血痢方同上 心鏡 小便血淋｜｜｜汁服 聖惠 赤白痢不問老稚男女孕婦悉可服｜｜｜搗汁

[鴨]彔曰]萵苣菜人所常食不見其害彭乘所云未免過甚甯原云明耳目李廷飛云久食昏目兩存之參驗可也

和雞子白溫服 海上方 腹中白蟲 ｜｜｜水煮一椀和塩醋空腹服少頃白虫盡出 食療 陰腫痛極 及痔瘡火丹一切爛瘡傅之皆效 臁瘡生虫 ｜｜｜為末蜜調傅之其虫自出神效 海上 牙痛 ｜｜｜汁含漱甚效 本事方

萵苣

苦冷微毒利五臟通經脈開胸膈 藏器 利氣堅筋骨去口氣明耳目 甯原 通乳汁利小便殺蟲蛇毒 時珍

[李廷飛曰]久食昏人目患冷人不宜食[時珍曰]按彭乘云｜｜有毒百蟲不敢近蛇虺觸之則目瞑不見物人中其毒以薑汁解之[藏器曰]紫｜｜有毒入燒鍊用[丹房鑑源云]｜｜用硫黃種結砂子制硃砂又曰紫｜｜和土作器火煅如銅也

萵苣子

鳴皋曰友人郭公之母患偏風不遂手足
拘攣痰涎甚多已數年矣或傳傅青主方
用白木耳四兩生研蒿苣子二兩炒研枸
杞子二兩炒研蜜丸服半斤全愈初不解
其義兹繹方中治腎黃如金則其入腎利
溺可知也治閃損腰痛下乳汁則其活血
可知也治癩腫是又能入肝也故用枸杞
子以入腎補腎而活血利氣也故陳藏器
謂蒿苣通經脉甯原謂蒿苣堅筋骨雖于
子缺之想其性亦同白木耳詳本條○傅
青主晉人名山工書法精醫道奇方極多
國朝定鼎屢徵不就

鳴皋曰木耳大腸藥也現人有腸滑者犯
之即瀉可知矣其治痔治痢皆涼大腸之

子入藥炒用　下乳汁通小便治陰腫痔漏下血傷損作
痛時珍
方　乳汁不行　蒿苣子三十枚研細酒服○又蒿苣
子一合甘草三錢糯米粳米各半合
同煮粥頻食之　小便不通　蒿苣子搗餅貼臍中
即通　海上仙方　腎黃如金　蒿苣
子一合細研水一盞煎五分服　外臺秘要　陰囊癩腫　蒿苣子一合擣末
水一盞煎五沸溫服　閃損腰痛　趁痛丸用白蒿苣子炒三兩白粟米炒
一撮乳香沒藥烏梅肉各半兩為末煉
蜜丸彈子大每嚼一丸熱酒下　玉機微義　髭髮不生　瘡疤上不生毛髮
先以竹刀括損以蒿苣子猢猻薑末頻擦之　摘元

木耳　又名木檽　木菌　木㙡　樹鷄　木蛾
桒木上生者名桒耳桒檽桒蛾桒鷄

力

時珍曰生生編云柳蛾補胃木耳衰精言老柳之蛾能補胃理氣朽木所生之耳有衰精冷腎之患

鳴皋曰木耳之性自係寒凉女子將出閣恐吉日月水來多吃木耳便能截止數日則凉血止血可知也治痔極效是能凉大腸也凡患痢者皆濕熱積滯阻於大腸故氣滯後重木耳能治痢以其性滑能利大腸而去其濕熱也○白色者名瓊耳能堅筋骨治腰膝痛一哥有醫語予云凡人骨節

菜部

桑黃桑臣生槐木上者名槐耳槐檽槐菌槐鵝赤鵝槐蛾柳木上生者名柳耳柳蛾

集解 恭曰煮漿粥安諸木上以草覆之即生蕈耳

時珍曰｜｜各木皆生其良毒必隨木性不可不審然今貨者多雜木惟桑柳楮榆之耳為多云 權曰蕈耳古槐樹桑樹上者良柘木者次之其餘樹上多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡背膊悶人 藏器曰｜｜惡蛇虫從下過者有毒楓木上生者令人笑不止采歸色變者有毒夜視有光者欲爛不生蟲者並有毒並生搗冬瓜蔓汁解之 時珍曰按張仲景云｜｜赤色及仰生者並不可食

桑耳甘平有毒 詵曰寒無毒 權曰平無毒 黑者主女人漏下赤白 因濕熱者 汁血病癥瘕積聚陰痛 本經 療月水不調其黃熟陳白者止久泄益氣不飢 此因大腸濕熱者 其金色者治癖飲積聚腹痛金

木耳 七

處有筋束之筋緊則堅筋弛則痛故老人骨痛也白木耳能緊筋使筋骨相着此係傅青主所說觀於婦人食白木耳產時令交骨不開則緊筋之說非無理矣鳴皋細繹郭公毋之症與白木耳丸方之義更有涼血袪風去濕之義在○白木耳丸見萵苣子上○白木耳生湖北鄖陽山中種此者初以為不祥為一木生白者則諸木之黑耳皆爛近年嗜之者多菜中以為珍品藥中亦用之此物遂貴每斤值十餘金

時珍曰桑耳軟耳也桑黃硬菰也其功性則一

瘡別錄治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子痃癖甄權止血衄腸風瀉血婦人心腹痛大明利五臟宣腸胃氣排毒氣壓丹石發熱孟詵

方 少小鼻衄 小勞輒出桑耳炒焦為末每發時以杏仁大塞鼻中數度即可斷 肘後

五痔下血 桑耳作羹空心飽食三日一作待孔卒痛如鳥啄狀取大豆小豆各一升作兩囊蒸之及熟更互坐之即瘥 聖惠

月水不斷 黃瘦血竭暫止數日復發小勞輒劇久疾失治者皆可服桑黃焙研每服二錢食前熱酒下 普濟

崩中漏下 桑耳炒為末酒服方寸匕日三 千金

赤白帶下 桑耳酒煎服 蘇頌

遺尿且澀 桑耳為末每酒下方寸匕日三 聖濟

（水字應是小字之訛）

心下急痛 桑耳燒存性熱酒服二錢 集簡

瘰癧潰爛 桑黃菰五錢水紅豆

一兩青苔二錢氷片一分為末雞子白調傅以車前艾葉桒皮煎湯洗之 纂奇方

咽喉痺痛 五月五日収桒上木耳白如魚鱗者臨時搗碎綿包彈子大蜜湯浸含之立效 近效方

足趾肉刺 先以湯浸刮去一層用黑木耳貼之自消爛不痛 近效

槐耳 苦辛平治五痔脫肛下血心痛婦人陰中瘡痛 蘊𦶜 治風破血益力 甄權

發明 〔頌曰〕一人患痔諸藥不效用木耳煮羹食之遂愈極驗

方 腸痔下血 槐耳為末飲服方寸匕 肘後 崩中下血 不問年月遠近槐耳燒存性為末酒溫服方寸匕 産寶 産後血痛 欲死槐鵝半兩為末酒濃煎服立愈 婦人良方 月水不斷 勞瘦暫止後發小勞輙劇者槐耳炒黃赤石脂各一兩為末食前熱酒服二錢

聖惠方

臟毒下血

槐耳燒二兩乾漆燒一兩為末每服一錢溫酒下　聖濟總錄

蚘虫心痛

槐耳燒存性為末水服棗許若不止飲熱水一升蚘虫立出　張文仲備急方

獸部

猪

又名豚（豬子曰豚）本經 豭音加牡曰豭 豶去勢曰豶

猪肉

壓丹石解熱毒 拾遺 補腎氣虛竭 千金

時珍曰 反烏梅桔梗黃連胡黃連犯之令人瀉犯蒼耳令人動風合百花菜呉茱萸食發痔合胡荽食爛人臍合龜鼈肉食傷人

發明 時珍曰 錢乙治小兒瘡病麝香丸以猪胆汁和丸猪肝湯服瘡渴者以丨丨湯或燖猪湯服其意蓋以猪屬水而氣寒能去火熱也 弘景曰 丨丨不宜多食令人暴肥蓋風虛所致也 震亨曰 肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣不降而諸症作矣 韓懋曰 凡肉皆有補惟丨丨無補

猪頭肉

有病者食之生風發痰 時珍 臘猪頭燒灰

鳴皐曰腦髓皆滑精病遺泄者不可食

治魚臍瘡 時珍

發明 時珍曰名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散傳之日數易而愈求其方曰但雪玄一味耳遍訪無知者有名醫郝允曰聖惠方治此用臘猪頭燒灰雞子白調傅即此也

猪脂 甘微寒解斑蝥芫青毒 別錄 利腸胃除五疸水腫 時珍 潤肺入膏藥主諸瘡 蘇頌 治皮膚風塗惡瘡 日華

猪腦 甘寒有毒 時珍曰一一損男子陽道臨房不能行事 治風眩腦鳴 別錄 主瘃腫塗紙上貼之乾則易 時珍

髓 甘寒治撲損惡瘡 蘇頌 塗小兒解顱頭瘡及臍腫

眉瘡瘑疥服之補骨髓益虛勞時珍

發明時珍曰丹溪治虛損補陰丸多用猪脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

血

鹹平生血治賁豚暴氣日華卒下血不止清酒和炒食之思邈清油炒食治嘈雜有虫時珍壓丹石解諸毒吳瑞

發明時珍曰陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈多以猪血炒食而愈盖以血導血歸原之意此固一說然亦有蚘虫作嘈雜者虫得血腥則飽而伏也又曰服地黃何首烏諸補藥者忌之云能損陽

心血

調朱砂末服治驚癇癲疾吳瑞治卒惡死及痘

瘡倒靨 時珍

發明 [時珍曰] 古方治驚風癲癇痘疾多用心血蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不息也猪為水畜其血性寒而能解毒制陽故也韓飛霞云猪心血能引藥入本經沈存中云猪血得龍腦直入心經是矣

尾血 治痘瘡倒靨用一匙調龍腦少許新汲水服 又治卒中惡死 時珍

心 治驚邪憂恚 別錄 治虛悸氣逆婦人血氣驚恐 思邈 主小兒驚癇汗出 蘇恭 鎮恍惚 劉完素

肝 治驚癇 作引 蘇恭 切生以薑醋食治脚氣當微洩若先

洩勿服藏器治冷勞臟虛久洩冷滑赤白帶下以一葉薄批蘸訶子末炙之再蘸再炙盡末半兩空腹細嚼陳米飲下頌作引補肝明目治肝虛浮腫時珍

發明時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝千金翼治痢疾有猪肝丸治脫肛有猪肝散諸眼目方多有猪肝散皆此意也○又曰餌藥人不可食合魚膾食生癰疽合鯉魚子食傷人神延壽書云猪臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

脾俗名聯貼治脾胃虛熱同橘紅人參葱薑白陳米煮羹食頌

肺補肺頌療肺虛咳嗽麻油炒同粥食又治肺虛

〔集〕曰同骨碎補炙食治腎虛久泄〔又〕曰楊介坪先生云少年患腰痛或教以猪腎炒食勿過熟須帶血遂愈

嗽血煮蘸苡仁末食之 時珍

腎 俗名腰子 理腎氣通膀胱 別錄 治耳聾 日華 除冷利 思邈 止消渴治產勞虛汗下痢崩中 時珍

發明〔時珍曰〕猪腎性寒不能補命門精氣方藥所用借其引導而已別錄理字通字最為有理腎有虛熱者宜食之若腎氣虛寒者非所宜矣又千金治消渴有猪腎薺苨湯補腎虛勞損諸病有腎瀝湯方甚多皆用猪羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

胰 音夷亦作胰〔時珍曰〕一名腎脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉乃人物命門三焦發源處也肥則多瘦則少 治肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦治痃癖羸瘦 能治多年虛嗽 藏器 治肺氣乾脹欬急潤五臟去皴皰䵟黵殺斑蝥地

胆毒治冷痢成虛（與補下藥同用）蘇頌 一切肺病欬嗽膿血不止 心鏡 通

乳汁 之才

肚 斷暴痢治虛弱 別錄 補虛損殺勞虫釀黃糯米蒸

搗為丸治勞氣并小兒疳蛕黃瘦病 日華 主骨蒸勞熱

蘇頌 消積聚治惡瘡 吳普

發明 時珍曰胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

腸 補下焦虛竭 孟詵 止小便 日華 去大小腸虛熱 蘇頌 調

血痢臟毒 時珍

脬 亦作胞 治夢中遺溺疝氣墜痛陰囊濕痒玉莖生

猪 十二

鳴皋曰猪胆眼科要藥外點内服俱不可缺效驗逾常

治疳　殺虫　治熱毒　痢　目疾要藥　瀉心火　肝火胆熱　通大腸

瘡

發明 時珍曰猪|所主皆下焦病亦以類從耳一妓病轉脬小便不通腹脹如鼓數日垂死或用猪|吹脹以管安上插入陰孔捻|氣吹入即大尿而愈此法載羅天益衛生寶鑑知者頗少亦妙法也

胆 苦寒治傷寒熱渴別錄骨蒸勞熱小兒五疳殺蟲蘓頌敷小兒頭瘡治大便不通灌之立下藏器通小便傅惡瘡殺疳虫治目赤目翳明目清心臟凉肝脾時珍

發明 成無己曰仲景以猪|汁和醋少許灌穀道中通大便神效蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也又治少陰瀉利不止厥逆無脉乾嘔煩者以白通湯加猪|汁主之若調寒熱之逆者冷熱必行則熱物冷服下咽之後冷體既消熱性便發故病氣自愈此所以和人尿猪胆鹹苦之物于白通熱劑之中使其氣相

從而無格拒之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脉微欲絶者通脉四逆湯加猪丨汁主之蓋陽氣太虚陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加丨汁苦入心而通脉寒補肝而和陰不致格拒也〔汪機曰〕朱奉議治傷寒五六日斑出有猪丨雞子湯〔時珍曰〕方家用猪丨取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝胆之火也

膚

〔汪機曰〕好古以為猪皮吳綬以為燖猪肘刮下黑丨二說不同吳說為是

甘寒治少陰下痢咽痛 時珍

發明

〔仲景曰〕少陰下痢咽痛胸滿心煩者猪丨湯主之用猪丨一斤水一斗煮五升取汁入白蜜一升白粉五合熬香分六服〔成無已曰〕猪水畜也其氣先入腎鮮少陰客熱加白蜜以除煩潤燥加白粉以益氣斷利也

蹄 治小兒驚癇燒灰服 別錄 治痘瘡倒陷 時珍

母猪乳 時珍曰取法須馴猪待小猪飲乳時提後脚急以手捋而承之非此法不可得 治小兒驚癇及鬼毒寒熱去來 蘇恭 小兒天吊大人猪雞癇病 日華

發明 時珍曰小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱｜｜氣寒以寒治熱謂之正治故錢乙云初生小兒一月内以｜｜頻滴之最佳張焕云小兒初生無乳以｜｜代之出月可免驚癇痘疹之患楊士瀛云小兒口噤不開｜｜滴之甚良月内胎驚同朱沙牛乳抹口中甚妙此法諸家方書未知用予用之有效

蹄 用母猪者 下乳汁洗傷撻諸敗瘡 別錄 通乳脉托癰疽煮清汁洗癰疽清熱毒去惡肉有效 時珍

[杲曰]用猪|湯煎藥洗瘡是以肉補肉之法

發明[時珍曰]外科精要洗癰疽有猪|湯數方用猪|煮汁去油煎衆藥醮洗也

懸蹄甲 一名猪退 治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕 本經 同

赤木燒烟熏辟一切惡瘡 仲景 [思邈曰]酒浸半日炙焦用 [時珍曰]古方有用左蹄甲者有用後蹄甲者未詳其義也

方 [肉] 小兒刮腸痢 禁口閉目至危者精猪肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻間聞香自然要食也 活幼口議 破傷風腫 新殺猪肉乘熱割片貼患處連換其腫自消 小兒火丹 猪肉切片貼之 男女陰蝕 肥猪肉煮汁洗 簡便 不過二十斤即瘥 千金 酒積面黄 腹脹以項肉一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香酒下當利出酒布袋也 普濟

方〔脂〕

發背發乳 猪脂切片冷水浸貼日易四五十片甚妙 急救方

方〔髓〕

骨蒸勞傷 脊髓一條猪胆汁一枚童便一盞柴胡前胡〻黄連烏梅各一錢韭白七根同煎七分温服不過三服其效如神 瑞竹堂方

小兒眉瘡 猪頸骨髓六七枚白膠香二錢同入銅器熬稠待冷為末麻油調塗

小兒頭瘡 猪䏰骨中髓和膩粉成劑煨香研末先用溫鹽水洗淨傅之 普濟

小兒疳瘡 同上

方〔血〕

中滿腹脹 旦食不能暮食用不着鹽水猪血澱去水晒乾為末酒服取洩甚效 李樓奇方

杖瘡血出 猪血一升石灰七升和劑燒灰再以水和丸又燒凡三次為末傅之

效 外臺

驚癇癲疾 心血調朱沙末服 吳瑞

心病邪熱 蕋珠丸用猪心血一箇靛花末一匙朱沙末一兩同研梧子大每酒服二十丸 奇效

痘瘡黑陷 臘月取猪心血瓶

乾之每用一錢入龍腦少許研勻酒服湏臾紅活用生血亦可神效　沈存中

催生　開骨膏用心血和乳香末丸梧子大硃沙為衣面東酒服一丸未下再服　婦人良方

卒中惡死　斷猪尾取血灌之並縛猪枕之即活　肘後方

肝方

休息痢　猪肝一具切片杏仁炒於淨鍋內一重肝一重杏仁入童便二升文火煎乾取食日一次　千金

中蠱腹痛　支太醫秘方猪肝一具蜜一升共煎分二十服或丸服　肘後

急勞瘦悴　日晚即寒熱驚悸煩渴用豶猪肝一具切絲生甘草末十五兩於鍋中布肝一重撒甘草末一重以盡為度入童便五升文武火煮爛搗丸梧子大每空心米飲下二十丸漸加至三十丸　聖惠方

脾方

脾積痞塊　猪脾七箇每箇用針刺爛以皮消一錢擦之七箇並同以磁器盛

十五 猪

鳴皋曰楊介坪先生云少年病腰痛或教吃腰子勿炒過熟帶血為佳食之遂愈

七日鉄器焙乾又用水紅花子七錢同搗為末以無灰酒空心調下一年者一服可愈二年以下者二服十年以下者三服　保壽堂方

腎虛遺精　多汗夜夢鬼交用猪腎一枚劈去膜入附子末一錢濕紙裹煨熟空心食之飲酒一杯　經驗

腎虛腰痛　用腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末三錢在内荷葉包煨熟食之酒下　本草權度

鳴皋曰甘遂不應用至三錢疑是三分

閃肭腰痛　雄猪腎一枚椒鹽淹過入甘遂末三錢荷葉包煨熟食之酒送下　儒門事親

卒然腫滿　用腰子批開入甘遂末一錢紙裹煨熟食以小便利為度否則再服　肘後

久嗽　腰子二枚入椒四七粒煮食　張文仲

久瀉不止　腰子批開入骨碎補末煨食神效　瀕湖

傳尸勞瘵　腰子一對童便二盞無灰酒一盞瓷罐盛之泥封炭火煨自戌至子時止待五更温熱飲酒食腰子病篤者只一月效　邵真人經驗方

癰疽發

背初起者用猪腰子同飛麪搗如泥塗之即愈

方〔胰〕猪胰酒治冷痢久不愈此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小腹雷鳴時〻心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩四支無力丈夫痃癖兩肋虛脹變為水氣服之皆效此法出于傳尸方取猪胰一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火温之酒熟納胰其中令消盡又取桂心末一小兩納酒中每旦温服一小盞午夜各再一服甚驗忌麪食油膩崔元亮海上方

膜内氣塊猪胰一具炙蘸延胡索末食之衛生易簡

肺氣咳嗽猪胰一具苦酒煮食不過二服效肘後

二十年嗽猪胰三具大棗百枚酒五升漬之秋冬七日春夏五日絞去渣七日服盡忌塩

方〔肚〕水瀉不止用雄猪肚一具入蒜煮爛搗丸梧子大每米飲服三十丸丁必卿云

予五更水瀉百藥不效用此方入雄猪肚
平胃散末三兩丸服遂愈　普濟　消渴飲水　一具煮
汁入少豉渴即飲之○仲景猪肚黄連丸用猪肚一
具入川連末五兩花粉白梁米各四兩知母三兩麥
冬二兩縫定蒸熟搗丸梧
子大每服三十丸米飲下

方　腸

腸風臟毒　奇效用川連入猪大腸内煮爛搗
丸梧子大米飲下三十丸○又方
入槐花末令滿傳定以醋煮爛搗為
丸桐子大每服三十丸温酒送下　臟熱血痢　上方同
臟寒洩瀉　體倦食減用大腸一條去脂以吳萸填滿
蒸熟搗丸桐子大每服五十丸米飲下
奇
效

方　脬

疝氣墜痛　用猪脬一箇洗入小茴香大茴香
破故紙川楝子等分填滿入青盐
一塊縛定酒煮熟食之　産後遺尿　猪肚猪脬各一枚
其藥焙搗為丸服之　糯米半升入脬内

更以脬入肚内同五味煮食之　醫林集要　同上

産後尿床方

胆

小陰下利不止厥逆無脉乾嘔者白通湯加胆汁主之葱白四莖乾薑一兩生附子一枚水三升煮一升入人尿五合猪胆汁一合分服　傷寒論

或瀉或止久而不愈二聖丸用黄連黄柏末各一兩以猪胆汁煮熟和丸緑豆大量兒大小每米飲服之　見總微論

赤白下痢臘月用猪胆百枚俱入黑豆在内着射香少許陰乾每用五七粒為末生薑汁調服　奇效

熱病虫䘌吐下用猪胆一枚醋一合煎沸服虫立死　梅師

傷寒斑出猪胆雞子湯用猪胆汁苦酒各三合雞子一箇合煎三沸分服汗出即愈　張文仲

喉風閉塞臘月初一日取猪胆五六枚用川連青黛薄荷僵蚕白礬朴消各五錢裝入胆内青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹横懸此胆在内盖好候立春日取出待風吹去胆外青紙研末瓷蔵每吹少許神效乃萬金不傳

之方部

真人經驗

膀病咳嗽　猪胆汁和人尿薑汁橘皮訶子皮同煮汁飲之良　拾遺方

小便不通　猪胆汁一枚熱酒和服。又用猪胆連汁籠住陰頭一二時汁入自通

消渴　猪胆汁五枚同定粉一兩同煎為丸芡子大每服二丸　聖濟總録

方　懸蹄甲

肺氣齁欵　猪爪甲二枚燒存性研入射香少許茶服　普濟

定欵化痰　用猪蹄甲四十九枚洗淨每甲入半夏白礬各一字罐盛固濟煅赤為末入射香一錢每用糯米飲下五分　經驗

犬

肉　鹹酸温安五臟補絶傷益氣　別録　宜腎　思邈　補胃氣壯陽道暖腰膝　日華　補五勞七傷益陽事實下焦　孟詵

鮋小魚也 〔孟詵曰〕凡食犬去血則力少不益人

反商陸畏杏仁同蒜食損人同菱食生癲同海鮋食之必得惡病

發明〔弘景曰〕黃犬肉大補虛勞黑者白者次之壯者尤勝〔時珍曰〕脾胃屬土喜暖惡寒犬性溫暖能治脾胃虛寒之疾脾胃溫和而腰腎受廕矣若素常氣壯多火之人則宜忌之不宜炙食令人消渴妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人

方

戊戌酒 大補元氣用黃犬肉一隻煮一伏時擣如泥和汁拌炊糯米三斗入麴如常釀酒候熟每旦空心飲之 養老方

戊戌丸 治男女一應諸虛不足骨蒸潮熱等證用黃童子犬一隻去皮毛腸肚同外腎于沙鍋內用酒醋八分水二升入地骨皮一斤前胡黃芪肉蓯蓉各四兩同煮一日去藥再煮一夜去骨再煮肉如泥擣濾入當歸末四兩蓮子蒼朮末各一斤厚朴橘皮末十兩甘草末十兩和杵丸梧子大空心鹽酒下五七十丸 乾坤秘韞

血 黑犬血治產難橫生血上搶心和酒服之別錄 熱

飮治虛勞吐血點眼治痘瘡入目及鬼擊病辟諸邪

鬼 時珍

胆 苦平有小毒明目本經 傅惡瘡別錄 殺虫除積能破

血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下時珍 治

刀箭瘡日華 去腸中膿水孟詵

方 眼赤癢丨汁點之聖惠 肝虛目暗白犬丨一枚螢火虫二七枚陰乾為末點之同上 血氣撮痛不可忍者黑犬丨一箇半乾半濕丸綠豆大蛤粉滾過每服四十丸鐵淬酒下痛立止經驗 反胃吐食不拘男女老少遠年近日五靈脂末黃犬丨汁和丸龍眼

羊頭蹄肉水腫人食之百不一愈

大每服一丸好酒半盞磨化服不過三服即效見本事方

痞塊肝積五靈脂炒烟盡真阿魏去砂研等分用雄黃犬丨汁丸黍米大空心嚥三十丸忌羊肉醋麪簡便方

陰莖 治陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾本經

乳汁 治十年青盲取白犬生子目未開時取乳頻點狗子目開後即瘥藏器

羊 又名羖牡羊也羝音低亦牡羊羯去勢曰羯

肉 大熱說曰溫 暖中治字乳餘疾汗出虛勞寒冷補中益氣別錄 利產婦思邈 治風眩瘦病丈夫五勞七傷孟詵

開胃健力日華

時珍曰熱病及天行病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多熱煮羊以杏仁或瓦片則易糜以胡桃則不臊以銅器煮之男子食之損陽女子暴下汪機曰反半夏菖蒲

發明

頌曰肉多入湯劑胡洽有大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆醫家通用大方也宗奭曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一婦冬月生產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也醫欲投抵當湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減水二服即愈杲曰羊肉有形之物能補有形肌肉之氣故曰補可去弱人參羊肉之屬是也人參補氣羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰長也時珍曰開河記云隋大總管麻叔謀病風逆起坐不得煬帝命太醫元方視之曰風入腠理病在胸臆須用嫩肥羊蒸熟摻藥食之則瘥如其言未盡劑而痊自後每食羊羔同杏酪五味日食數枚觀此則羊肉補虛之功可

證矣

方 羊肉湯 仲景治寒勞虛羸及產後心腹疝痛用羊肉一斤水一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪半斤生薑六兩煮取二升分四服胡洽方無黃芪千金有芍藥 金匱要略

胡洽大羊肉湯 治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤當歸芍藥甘草各七錢半水一斗煮肉取七升入諸藥煮二升服

崩中垂死 ||三斤水二斗煮一斗三升入生地黃一升乾薑當歸各三兩煮三升分四服 千金

骨蒸傳尸 用||一拳大煮熟皂莢一尺炙以無灰酒一升銅器內煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先啜肉汁乃服一合吐虫如馬尾為效 外臺

虛寒瘧疾 ||煮食更飲酒暖臥取汗 集驗

血 鹹平治產後血悶欲絕者熱飲一升即活 穌恭

熱

飲一升治産後血攻下胎衣治卒驚九竅出血解莽

草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發 時珍

發明 時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊丨十年一食前功盡亡此物能制丹沙水銀輕粉硇沙砒霜硫黃鍾乳陽起石等毒凡覺毒發刺飲一升即解服地黃首烏諸補藥者亦忌之嶺表異錄言其能解胡蔓草毒解毒之功如此本草不言誠缺文也

方 衄血一月不止刺羊丨熱飲即止 聖惠 産後血攻 熱羊丨一盞飲之三兩服甚妙 梅師 妊娠胎死不出及胎衣不下産後諸疾狼狽者刺血熱飲一小盞極效 見聖惠方

乳 甘溫潤心肺治消渴 甄權 補虛勞益精氣補肺腎

張鼎利大腸治小兒驚癇含之治口瘡日華主心卒痛可溫服之蚰蜒入耳灌之即化成水孟詵治大人乾嘔反胃時〻溫服之舌腫含之時珍鮮蜘蛛咬毒藏器曰有人為蜘蛛咬腹大如妊徧身生絲有僧教服羊乳遂愈

發明弘景曰牛羊丨補腎故北人多肥健時珍曰丹溪曰反胃人宜時〻飲之取其能開胃脘及大腸之燥也

骨髓甘溫利血脉益精氣以酒服之別錄却風熱久服不損人孫真人和酒服補血主女子血虛風悶孟詵潤肺氣澤毛髮滅瘢痕時珍○刪繁治肺虛毛悴有酥丨湯中用之

羊 二十一

方 肺痿骨蒸 煉羊脂煉羊|各五兩煎沸下鍊蜜及生地黃汁各五合生薑汁一合不住手攪微火熬成膏每日空心溫酒調服一匙 飲膳正要

白禿頭瘡 生羊||調輕粉搽之先以泔水洗淨一日二次數日愈 經驗

瘡痂不落 減瘢方用羊||煉一兩輕粉一錢和膏塗之 陳文仲

心 有孔者殺人 止憂恚膈氣 別錄 補心 藏器

方 心氣鬱結 羊|一枚回回紅花浸水一盞徐塗心上炙熟食之令人心安多喜 見正要

方

肺 補肺止欬嗽 別錄

方 久嗽肺痿 作燥羊|湯用|一具洗淨以杏仁柿霜真豆粉真酥各一兩白蜜二兩

和勻灌丨中白水煮　咳嗽上氣積年垂死用莨菪子
食之　葛可久方　炒熟羊丨切晒乾等
分為末七月七日醋拌每夜
服一方寸匕粥飲下　千金
腎　補腎虛耳聾壯陽益胃治虛損盜汗日華　療勞痢
甚效合蒜虀食之治癥瘕藏恭　治腎虛消渴時珍
發明　時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴
脚氣有丨瀝湯方甚多皆用羊丨煮湯煎藥蓋
用引導各
從其類也
方　五勞七傷陽虛無力經驗用羊丨一對去膜切
肉蓯蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹
下五味食○正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷
用羊丨三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉一斤同五
味煮成汁下　老人腰硬老人腎臟虛寒內腎結硬雖
米作粥食之　服補藥不入用羊丨一對杜

〔鳴皋曰〕目得血而能視血滯則結而目盲矣羊肝生用最破瘀行血熟用則無力矣凡諸血生用皆能破血肝藏血者也故與血同例丹溪治一人目飲熱酒致青盲丹溪曰此血因酒滯于胃也宜破瘀可愈重用藕木而痊亦此理也

仲長二寸濶一寸一片同煮熟空心食之令人內腎柔軟然後服補藥 雞峰備急

肝 苦寒 温〔頌曰〕補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝作生食神效 藕 恭〔弘景曰〕含猪肉及梅子小豆食傷人心〔思邈曰〕含生椒食傷人五臟最損小兒合苦筍食病青盲妊婦食之令子多厄

發明〔時珍曰〕羊肝補肝與肝合引入肝經故專治肝經受邪之病今羊肝丸治目有效可徵〔汪機曰〕羊肝明目性也他肝則否凡各畜臨殺時忿氣聚于肝故諸肝不利

方 肝虛目赤 青羊肝薄切水浸吞之極效 龍木論 病後失明 方同上

熱病失明 見目 藕 恭 青盲內障 白羊子肝一具川連一兩熟地黃二兩同搗丸梧子

鳴皋曰目病初起最忌用苦寒藥點之將邪熱激住惟猪羊胆雖苦寒不忌蓋胆爲血肉之類與黄連黄柏等不同也不必同蜜蒸但生用點之亦神效

大食遠茶服七十九日三服崔承元病内障失明有人遺此方以報德服之遂復明 傳信方

膽 苦寒治青盲明目 別録 點赤翳白翳 甄權 療疳時行熱熛瘡和醋服良 蘇恭 治諸瘡能生人身血脉 思邈

發明 時珍曰肝開竅於目胆汁減則目暗目者肝之外候胆之精華也故諸丨皆治目病夷堅志載二味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羯羊丨一枚入蜂蜜於内蒸之候乾研膏每含少許並點之一日淚止二日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二 草花之名

方 碧雲膏 臘月取羯羊丨以蜜調朴硝裝入紙套籠住懸簷下待霜出刮下點目神效 張三丰

代指作痛乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺冷水中三度即以羊丨塗之立愈甚效 外臺秘要

寫皋曰羊ㄧ治腹中諸疾是以腸中之物治腸中之患以類相從也其治痢與用白馬糞鴿屎白人中黄治熱毒下痢同義

寫皋曰 鷹若寒

脏 潤肺燥治嗽 時珍 治婦人帶下 外臺

方 遠年咳嗽羊ㄧ三具大棗百枚酒五升漬七日飲之 肘後

屎 苦平治小兒洩痢驚癎 別錄 晉竹木刺入肉治箭鏃不出 日華 治腹中諸疾疳熱燒烟熏痔瘻治骨蒸彌良 穗恭

方 疳痢欲死新羊ㄧ一升浸一夜絞汁日午服極重者不過三服愈 總錄 心氣痛不問遠近以山羊ㄧ七枚頭髮一團燒灰酒服永斷根 孫氏集效 慢脾驚風活脾散用羊ㄧ二十一枚炮丁香一百粒胡椒五十粒為末每服半錢用六年東日照處壁土煎湯下 聖濟

牛

丹溪治林德方咳而咯血謂肺癰非吐不可血耗非補不可惟倒倉法二法兼備服之而愈又治蕭伯善便濁滑精亦用倒倉法而愈又治許謙公病心痛用烁藥靈丹艾灸雜治數年不愈自分為棄人丹溪先

獸部

黃牛肉 甘温安中益氣養脾胃 別錄 補益腰脚止消渴及唾涎 思邈

[日華曰]丨丨丨微毒食之發藥毒動病不如水牛[詵曰]黃牛動病黑牛尤不可食自死者不可食[藏器曰]牛病死者食之發痼疾痃癖令人洞下疰病黑牛白頭者不可食獨肝者大毒令人痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之故肝獨也水牛則無之[時珍曰]仲景云噉蛇牛毛髮白而後順者是也中其毒者惟人乳可解之食經云牛自死白首者食之殺人疥牛食之發痒黃牛水牛合猪肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食令人熱病煮牛肉入杏仁蘆葉則易爛

發明 [時珍曰]韓懋言牛肉補氣與黃芪同功觀丹溪倒倉法論則牛之補土可心解矣丹溪倒倉論曰腸胃為積穀之寶故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰

用防風通聖散下其積滯而病稍起思食然兩足難移次年行倒倉法節節應手復生子活十四年又臨海林兄久嗽吐血發熱消瘦衆以為瘵百方不應丹溪脉之兩手弦數日輕夜重計無所出亦用倒倉而安次年生子

嗚峯曰觀於飲數十杯身體覺痛可見藥力之周身悉到也

丹溪曰倒倉法中年後行一二次亦却病養生之一助也

積血互相纏糾發為癱瘓為勞瘵為蠱脹成形成質為窠為血以生百病而中宮愆和自非丸散所能去也此方出自西域其法用黃牡牛肉二十斤長流水煮成糜去滓濾取汁再熬成琥珀色收之前一晚不食至旦空腹坐密室取汁每飲一杯少時又飲積數十杯身體覺痛如病在上則吐在下則利在中則吐而且利利後必渴即飲已溺數椀以滌餘垢行後倦卧覺饑先與米飲次與薄粥三日後方與厚粥軟飯調養半月即精神煥發沉疴悉亡矣須忌牛肉五年蓋牛坤土也黃土色也肉者胃之所樂也熟而為液無形之物也故能由腸胃而透肌膚毛竅指爪無所不到在表者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自利而除有如洪水泛漲陳莝順流而去盎然渙然潤澤枯槁而有精爽之樂也王綸曰牛肉本補脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢耳借補為瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者似難施之

汪昂曰胃槁胃冷脾不磨食故氣逆而成反胃氣血不足其本也曰痰飲曰食積其標也胃槁者滋血生津胃冷者温中調氣東垣云上焦吐者由乎氣治在和中而降氣中焦吐者由乎積治在行氣而消積下焦（亦有因熱者）吐者由乎寒治在温中而散寒又曰噎膈不通服香燥藥取快一時破氣而燥血是速其死也不如少服藥飲牛丨加韭汁或薑汁或陳酒為佳江南臬司多公患禁口痢粒米不進鄭奠一令服牛丨以之亦

獸部

水牛肉 消水腫 藏器 餘同黃牛

鼻 水牛者良 治消渴同石燕煮汁服 藏器 治婦人無乳作羹食最效 孟詵 口眼喎邪火炙熨之即漸正 宗奭

乳 甘微寒補虛羸止渴 別錄 養心肺解熱毒潤皮膚 日華 冷補下熱氣 藏器 患熱風人宜食之 孟詵 老人煮食有益 思邈 治反胃嘔噦補益勞損潤大腸治氣痢除黃疸 方見秦艽 時珍

藏器曰凡服丨必煮一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之同生魚食作瘕 ○ 制秦艽

牛 二十五

〔纂曰〕噎膈有二種有因憂鬱恚怒者治在血分氣分當和血調氣有因胃槁及下焦枯乾者惟有潤法嘗見西人得此病最多皆因早起不食油膩但飲乾燒酒作點心久久胃家津液燒乾食入濇滯不能下復行吐出此等症惟飲牛乳以潤其枯竭若得津液復行食入自可滑下其吐可止香附藥如火上加薪矣

北牛曰榛南牛曰犑

發明〔恭曰〕榛牛乳性平生飲令人利熱飲令人口乾溫可知也水牛乳作酪濃厚勝榛牛〔弘景曰〕榛牛乳佳〔震亨曰〕反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯為上策不宜用人乳人乳有飲食之毒七情之火也〔時珍曰〕乳煎蓽茇治氣痢有效蓋一寒一熱能和陰陽也按獨異志云唐太宗患氣痢衆醫不效金吾長張寶藏進乳煎蓽茇方立愈逾月疾復作復進之又平授鴻臚卿其方用牛乳半斤蓽茇三錢同煎減半空腹頓服

血　鹹平治金瘡折傷垂死下水蛭時珍

發明〔時珍曰〕元史云布智兒從太祖征回回身中數矢悶仆幾絕太祖命取一牛剖其腹納之牛腹浸熱血中移時遂甦又李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫胸幾絕亦用此法而甦此法知者甚少故書於此以備緩急

鳴皋曰牛骨丨炒麪日服潤肺補腎治勞傷極損果有捷效

方 誤吞水蛭腸痛黃瘦牛丨熱飲一二升次早化豬油一升飲之即下 肘後

髓 甘溫補中填骨髓久服延年 本經 平胃氣通十二經脈 思邈 治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服 孟詵 潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙 時珍

方 補精潤肺壯陽助胃用鍊牛丨四兩胡桃肉四兩杏仁四兩山藥末半斤煉蜜一斤同搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服 瑞竹堂方

腦 治風眩 蘇恭 治脾積痞氣 時珍

方 偏正頭風諸藥不效者如神用白芷川芎各三錢為細末以黃牛腦子撒藥在上瓷器盛之加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗 保壽堂方 脾積痞氣牛丨丸大

有神效黃牛丨子一枚去皮筋搗爛皮硝末一斤蒸餅六箇晒研和勻糊丸梧子大每服三十丸空心好酒下日三服百日有驗聖濟

氣積成塊牛丨散牛丨一枚去筋雄雞肶一具連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉香砂仁各三兩皮硝一椀杵千下入生鍋内文武火焙乾研為細末入輕粉三錢令勻每服三錢空心酒下日三同上

膽苦大寒除心腹熱渴止下痢及口焦燥別録臘月釀槐子服明目治疳濕彌佳蘇恭釀黑豆百日後取出每夜吞一粒鎮肝明目藥性釀南星末陰乾治風痰有奇功蘇頌除黃殺虫治癰腫時珍

喉白水牛者良治反胃吐食取一具去膜及兩頭逐節

時珍曰｜｜｜厥陰少陰肝腎血分之藥

牝牛曰牸

以醋浸炙燥燒存性每服一錢米飲下神效 時珍

發明 時珍曰普濟方云反胃吐食藥物不下結腸三五日至七八日大便不通如此者必死昔周禪師得正胃散方于異人十痊八九用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉收之臨時炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋盡為度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效

牛角䚡 時珍曰此即角尖中堅骨也 藏器曰水牛黃牸牛者可用餘皆不及

苦溫 甄權曰苦寒

下閉血瘀血疼痛女子帶下血燒之酒服 本經

燒灰治赤白痢 宗奭 主血崩瀉血水泄 藥性 治水腫 時珍

發明 時珍曰｜｜｜筋之粹骨之餘而䚡又角之精也乃厥陰少陰血分之藥燒之則性濇故止血

鳴皋曰牛角牛蹄俱能接骨為能散瘀以骨補骨也

痢血崩

諸病

牛角 苦寒 之才曰平 水牛者煎汁治熱毒風及壯熱 日華 沙牛者治喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似喉痺者取灰塗乳上嚥下即瘥 蘇頌 治淋破血 時珍

方 石淋破血 ||燒灰酒服方寸匕日五服 總錄 血上逆心煩悶刺痛 水牛角燒為末酒服方寸匕 子母秘錄方

牛蹄甲 損傷接骨 乾坤秘韞用||| 一個乳香沒藥各一錢入甲內燒研末以黃米粉糊和成膏傅之

牛涎（日華曰以水洗老牛口鹽塗之少頃即出）治反胃（日華）水服二匙終身不噎（思邈）灌一合治小兒霍亂入鹽少許頓服一盞治喉痺口噤（時珍）

方　噎膈反胃　香牛飲用｜｜一盞入射香少許銀盞頓熱先以帛束緊胃脘令氣喘解開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與食　危氏得效方

牛屎　苦寒治水腫乾者燒之傅惡瘡（別錄）傅小兒爛瘡爛痘及癰腫不合能滅瘢痕（時珍）絞汁服治消渴黃疸脚氣霍亂小便不通（蘇恭）

發明（時珍曰）｜｜散鮮熱毒利洩故能治腫疸霍亂疳痢諸疾燒灰則收濕生肌拔毒故能治癰疽

爛痘諸疾也宋孫法宗苦頭瘡遇神
教以丨丨煮傅之即驗如其言果愈
方　水腫尿澀黃丨丨一升絞汁飲溲
利即瘥勿食鹽　梅師　濕熱黃病丨黃
丨日乾為末麪糊丸梧子大　霍亂吐下不止四支逆
食前白湯下七十丸　簡便
冷用黃丨丨
半升水二升煮三　痞痢垂死丨丨一升水二升
沸服半升　外臺　攪清服汁　必效　痘瘡
潰爛　白龍散以臘月黃丨
丨燒白灰傅之甚妙　癰腫不合丨丨燒末用鷄
子白和封乾即
易之神效
千金月令方
黃明膠　又名牛皮膠食療　水膠外臺　海犀膠
甘平治吐血衄血下血々淋下痢妊婦胎動下血風
濕走注疼痛打撲傷損湯火灼瘡一切癰疽腫毒活

〔嗚皋曰〕友人觀公言親見一婦乳腫硬如木石醫不能療亦不能名其症或教以牛皮膠化傳乾則再上漸柔軟而愈皋竊思之甚有理牛肉膏既能化數十年之老痰癖積而通血脉則牛皮與肉之性應不相遠故亦通血脉血脉通則腫硬消矣觀方中傳瘰腫乳癧發背等方可相發明〔汪昂曰〕阮氏唐氏方能使毒不內攻如果效驗勝于服蠟礬丸矣

血止痛濇燥利小大腸 時珍

方

肺痿吐血 ｜｜｜炙花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黃汁調下 普濟

肺破吐血 或嗽血不止海犀膏｜｜｜一大片炙黃塗酥再炙研末用白湯化三錢服之即止 斗門

吐血咯血 ｜｜｜一兩切片炙黃新綿一兩燒研每服一錢食後米飲下 食療

跌撲損傷 真牛皮膠一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒存性研末每服五錢熱酒一鍾調服仍飲酒二三杯煖臥取微汗即瘥 藺氏方

諸般癰腫 ｜｜｜一兩水半升化開入黃丹一兩煮勻以鴉翎掃上瘡口如未成者塗四圍自消 本事

乳癧初發 ｜｜｜以濃醋化塗之立消 楊起簡便

發背初起 阮氏經驗用｜｜｜四兩酒一盌重湯頓化隨意飲盡不能飲者滚白湯飲之服此毒不內攻不傳要症〇唐氏經驗加穿山甲四片同燒存性云極妙無比

黃明膠 牛黃

鳴皋曰｜｜入肝胆經兼入心經

鳴皋曰近世以四牛黃為重應牛黃為光近日北京回民甚衆宰牛甚多其黃較別處有香氣故京黃一兩價四五十金○回民殺牛手捡其胆内有硬核者即黃也連胆携至藥肆售之大約俱得于胆中所謂生黃角黃心黃未嘗見也○據藥肆人云駝黃亦能透甲但駝黃較牛黃大

鳴皋曰世以牛黃羚羊等為風藥誤矣肝熱極則生火〻盛極則自生風〻火相煽而氣升痰壅為驚搐等症原無關外襲之風讀喻嘉言書誠不磨之論也牛黃能涼肝胆肝胆涼則風息矣世遂疑牛黃能駈風

鳴皋曰葉天士云牛黃能治膻中瀰漫之熱故熱症中熱入心包舌絳神昏如寐者往〻用至寶丹

昂曰牛黃苦通竅故能發痘墮胎

鳴皋曰世言小兒多服牛黃則痴呆不知

牛黃 又名丑寶

集解 恭曰｜有｜必多吼以盆水承之伺其吐出迎喝即墮水中名生黃最佳散黃粒如麻豆漫黃若鷄子黃蔵在肝胆間 斆曰 喝迫而得者名生黃殺死角中得者名角黃心中剝得者名心黃肝胆中得者名肝黃 頌曰｜｜如鷄子黃大重疊可揭而氣香者佳磨指甲黃透甲者為真 宗奭曰｜｜輕鬆自然微香西戎犛牛黃堅而不香又有駱駝黃亦能相亂不可不審

甘涼治驚癇熱盛狂痓除邪逐鬼 本經 治小兒百病諸癇熱口不開墮胎 別錄 主中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虛乏 日華 安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜啼 甄權 益肝胆定精神除熱止驚辟惡氣除百病 思邈 清心

小兒臟腑之氣未全肝熱過甚則抽搐痰壅邪竄心胞則神昏及用牛黃等凉藥病雖愈而心氣過傷竅為之閉以致痴呆當時雖不用牛黃未必不痴呆也及至痴呆而歸咎于牛黃良藥蒙冤矣

昂曰中風中臟者重多滯九竅中腑稍輕多着四肢若外無六經形症內無便溺阻隔為中經絡為又輕初宜順氣開痰後宜養血活血不宜專與風藥大抵五臟皆有風而犯肝者為多肝屬風木而主筋肝病不能榮筋故有舌強口噤喎邪癱瘓不遂不仁等症若口開為心絕手撒為脾絕眼合為肝絕遺尿為腎絕吐沫鼻鼾為肺絕髮直頭搖面赤如粧汗綴如珠者皆為不

獸部

化熱利痰凉驚甯原痘瘡紫色發狂譫語者可用時珍曰出王氏方

之才曰人參為使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨龍胆草地黃常山蜚蠊畏牛膝乾漆時珍曰別錄言丨丨惡龍胆而錢乙治小兒急驚疳病凉驚丸射香丸皆兩用龍胆治驚癇解熱殺虫與丨丨主治相近亦肝經藥也不應相惡

發明李杲曰丨丨入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦射之劑入骨髓透肌膚以引風出若風中腑及血脉者用之恐引風邪流入骨髓如油入麪莫之能出也時珍曰牛之黃牛之病也因其病在心及肝胆之間凝結成黃故還能治心及肝胆之病正如人之淋石復能治淋也

方 初生三日 去驚邪辟惡氣以丨丨一豆許研細入蜜綿蘸令吮之 姚和衆方 七

牛黃 馬 三十

治若止見一二症猶有可治者○〔又曰〕心熱則火自生𤸎肝熱則木自生風〻火相搏膠痰上壅遂致中風不語○〔鳴皋曰〕自生二字宜玩

〔希雅曰〕同犀角琥珀天竺黄勾藤茯神真珠金箔射香朱沙治小兒驚癇百病　入外科内服藥能解疔腫瘡疽毒並可入傅藥止痛散毒如神　同鍾乳真珠皂莢煅牙末僵蚕紅鉛氷片明礬没藥蛀竹屑天靈盖為丸土茯苓湯下治結毒有神

目口噤——為末竹瀝化一字灌之　外臺

初生胎熱或身體黄——一豆大密調乳化時〻滴口中形色不實者少與　錢氏

小兒熱驚——一杏仁大竹瀝薑汁各一杯和勻與服　總微論

小兒驚侯小兒積熱毛焦睡語發驚者—六分朱沙五錢同研以犀角磨汁調下一錢　同上

驚癇嚼舌迷悶——豆許研和蜜水灌之　廣利

馬

肉　有毒〔士良曰〕有大毒　**煮汁洗頭瘡白秃**　時珍○出聖惠

鬐膏　鬐項上也白馬者良　**有小毒治偏風口僻**　時珍

發明〔時珍曰〕靈樞經云卒口急僻者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鉤〻之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰飲美酒噉炙肉為之三拊而已靈樞無

註世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡于口會太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱于右〻中寒則逼熱于左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒啖炙肉云

肝 有大毒 時珍曰按漢武帝云食肉毋食馬肝又云文成食馬肝而死

駒衣胞 治婦人天癸不通煆存性為末每服三錢入麝香少許不過三服良 孫氏集效

馬汗 有大毒 詵曰患瘡人觸｜｜毒攻心欲死者燒粟幹灰淋汁浸洗出白沫乃毒氣

三十一 馬

也嶺南有人用此得力

西馬溺 辛寒有毒破癥結堅聚男子伏梁積疝婦人瘕積 別錄 熱飲治反胃殺虫 時珍

發明 時珍曰｜｜｜治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與奴皆患腹痛奴死剖腹得一鱉尚活以諸藥投口中不死灌以馬尿即化成水乃服｜｜｜而愈反胃亦有因蟲積者故亦能治之

方 食髮成瘕 咽中如有虫上下者是也 **伏梁心疾** ｜｜｜三升飲之 千金

銅盌盛｜｜｜一升旦旦飲之 小品 **痞塊心痛** 僵蚕末二錢｜｜｜調服並塗塊上 摘元 **頭瘡白禿** ｜｜｜洗之 孟詵 **惡刺瘡** ｜｜日漬十次愈 同上 **利骨取牙** ｜｜｜浸茄根三日炒為末點之即落勿近好牙 鮑氏

〔鳴皋曰〕馬屎彪寒凡人畜之糞皆寒豈馬屎獨溫乎友人魏公言馬屎絞汁治絞腸痧如神此方甚有理蓋以腸胃中之遺物而藉以通腸胃也又馬屎能解毒絞腸痧多由熱毒凝結故治之

馬通〔時珍曰〕馬屎曰通牛屎曰洞猪屎曰零 徵溫止吐血衄血下血金瘡出血婦人崩中 別錄 絞汁服治傷寒時氣當吐下者 藏器 治時行病起合陰陽垂死者 絞汁三合日夜各二服 又治杖瘡跌打損傷中風作痛者炒熱包熨數十遍極效 孟詵 燒灰水服治久痢 時珍

方 吐血不止 燒白丨丨以水研絞汁服 梅師 衄血不止 用赤丨丨絞汁飲一二升乾者浸水亦可並滴鼻中 千金 卒中惡 吐利不止不知是何病丨丨一丸絞汁灌之乾者水浸汁亦可此扁鵲方也 肘後方 攪腸沙痛 欲死者丨丨研汁飲之立愈 經驗 傷寒勞復 丨丨燒末冷酒服方寸匕 聖惠 熱毒攻手足 腫痛欲脫以水煮馬

糞汁漬之
外臺

驢溺 辛寒有小毒浸蜘蛛咬瘡良 藏器 治反胃噎膈
癬癘惡瘡並多飲取瘥 時珍

發明 震亨曰 一婦病噎用四物加｜｜與服以防其
生虫数十帖而愈 時珍曰 張文仲言幼年患反
胃每食羹粥諸物須臾吐出貞觀中諸名醫奉敕調
治不能療命在旦夕一人云服｜｜極效遂服二合
所食止吐一半再服二合食粥便定次日奏知宮中
患反胃者數人一時同服俱瘥此物稍有毒服時不
可過多須熱飲之
病深者七日當效

尿 絞汁服主心腹疼痛諸疰忤癥癖反胃不止牙
痛 治水腫每服五合良 畫體成字者為蟬水用牡驢 ｜不成字者為濕水用騍驢

〔張元素曰〕氣味俱薄而升陽也入手少陰心足少陰腎厥陰經肝〔楊士瀛曰〕||為肺經要藥又為大腸經要藥〔昂曰〕亦滋益腎氣

|〇燒灰吹鼻止衄甚效和油塗濕癬惡瘡 唐本 時珍

男卒心痛 驢|絞汁五合熱服即止 肘後方

經水不止 及血崩用黑驢|燒存性麪糊丸梧子大每空心酒下五七十丸神妙 龔雲林醫鑒

疔瘡中風 腫痛驢|炒熨極驗 普濟方

小兒眉瘡 黑驢|燒研油調塗立效 聖惠

阿膠

集解〔頌曰〕以阿縣城北井水作煮者為真其井官禁真膠極難得其膠以烏驢皮得阿井水煎成乃佳陳藏器言諸膠皆能療風止泄補虛而驢皮膠主風為最是||所以勝諸膠也〔時珍曰〕阿井乃濟水所注取其水攪濁水則清故煮膠服之下膈疎痰止吐蓋濟水清而重其性趨下故治於濁及逆上之痰古方所用多是牛皮後世乃貴驢皮以黃透如琥珀或光黑如漆者為真真者不作

〔鳴皋曰〕汪昂云傷暑伏熱成痢者必用之又云妊婦血痢尤宜又云瀉者忌用按痢疾總因大腸阻滯蓋大腸回曲者也或因熱燒乾津液以致乾糞留結少許于回曲之處是以腹痛後墜用消黃以通之可愈他若氣滯用木香血滯用桃仁杏仁痢多而腸液乾澀則用潤劑總不過以通爲用也通則不痢矣——滑腸瀉者忌用惟痢疾却取其滑以通其滯與用肉蓯蓉同例至于痢久腸虛阻滯雖去而闔闢大開須用澀劑故治痢不外通澀二法

皮臭夏月亦不濕軟

昔平治內崩勞極洒洒音蘇如瘧狀安胎益氣本經丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足養肝氣別錄益氣止痢藥性〔頌曰〕止瀉痢得黃連黃蠟尤佳

治吐衄血淋尿血腸風下血女子血痛血枯經水不調崩中帶下胎前產後諸疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽喘疾肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調大腸之聖藥也時珍

得火良薯蕷為之使畏大黃〔時珍曰〕炒成珠用或以麪炒或以火炙或以蛤粉炒或以草灰炒或水化酒

〔昂曰〕蛤炒去痰蒲黃炒止血

化各從
本方

發明 葳器曰諸膠皆主風止瀉補虛而驢皮主風為最宗奭曰驢皮煎膠取其發散皮膚之外也用烏者取其烏色屬水以制熱則生風之義時珍曰｜｜大要只是補血與液故能清肺益陰而治諸証按陳自明云補虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無已曰陰不足者補之以味｜｜之甘以補陰血楊士瀛云凡治欬嗽不論肺虛肺實可下可溫須用｜｜以安肺潤肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後瞳人不正者以｜｜人參煎服最良｜｜育神人參益氣也又痢疾多因傷暑伏熱而成｜｜乃大腸之要藥有熱毒留滯者則能疎導無熱毒留滯者則能平安數說足以發｜｜之蘊矣

方 肺風歎促 涎潮眼竄用好｜｜炒以紫蘇烏梅焙研等分煎 直指 老人虛秘 ｜｜二錢葱白三莖煎入蜜二匙 千金 赤白痢 黃連｜｜丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢
阿膠

赤白裏急後重小便不利｜｜一兩川連三兩
茯苓二兩為末丸梧子大每服五十丸　和劑　吐血
不止　千金翼｜｜二兩蒲黃六合生地三升水煮服
口經驗用｜｜蛤粉各一兩入辰沙少許為末
藕節搗汁　大衄不止　口耳俱出用｜｜蒲黃各半兩
入蜜調服　每服二錢水一盞生地汁一合
煎六分溫服急以　妊娠血痢｜｜二兩酒
帛束兩乳　聖惠　煎服　梅師　妊娠下血
不止｜｜三兩酒　胎動　產寶膠艾湯用｜｜炒熟
煎服　梅師方　艾葉蔥白水煎服　產寶　產
後虛閉｜｜只殼各一兩滑石二錢半為末蜜丸梧
子大每服五十丸溫水下未通再服　和劑
久嗽經年｜｜人參各二兩為末每用三錢豉湯　肺
一盞蔥白少許煎服日三　聖濟摠錄
損吐血　并開胃用｜｜炒三錢木香一錢糯米一合
半為末每服一錢百沸湯點服日二　普濟
虎　又名烏醜音徒左傳作烏菟烏檡漢書大蟲　肘後
李耳　郭璞

虎骨 辛微熱無毒之才曰平 治邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸治惡瘡鼠瘻頭骨尤良別錄 治筋骨毒風攣急屈伸不得走注疼痛治尸疰瘧疾犬咬毒甄權 煮汁浴去骨節風毒腫和醋塗膝止脚痛腫脛骨尤良孟詵 追風定痛健骨止久痢脫肛時珍

頌曰用雄虎者勝藥箭射殺者不可入藥

時珍曰用｜｜槌碎酥炙或酒或醋炙用

發明 頌曰兵部手集有｜｜酒治臂脛痛崔元亮海上方治腰脚不隨有｜脛｜酒方宗奭曰虎金也風木也木受金制故嘯則風生所以治風病攣急屈伸不得走注骨節風毒癲疰驚癇諸病機曰虎死而脛猶矻立不仆故治脚脛無力用脛骨時珍曰｜｜通用凡辟邪疰治驚癇溫瘧頭風當用頭骨治手

鳴臬曰久瘧邪

瘧寒瘧可用溫瘧不宜用蓋性熱也

足諸風當用脛骨治腰背諸風當用脊骨各從其類也諸證辨疑云虎之一身筋節氣力皆出前足故以脛骨為勝

方　臂脛痛｜｜酒不拘深淺皆效用脛骨二兩打碎炙黃羚羊角屑一兩新芍藥二兩切好酒浸七日秋冬倍之每日空腹飲若要速服即以銀器盛于火傍煖養三日亦可　兵部手集

腰脚不隨拘急冷痛虎脛骨五六寸打碎酥炙黃擣細絹袋盛酒一斗浸之煻火微溫七日任飲當微利便效○又方虎腰脊骨一具前脚全骨一具打碎炭火炙待脂出投無灰酒中密封七日秋冬三七日任飲十年久病三劑可瘥　崔元亮海上方

歷節風走痛百節皆痛不可忍虎頭骨一具打碎酥炙浸醇酒五宿隨量飲之　聖惠方

休息痢｜｜炙焦為末飲服方寸匕日三　張文仲方

肉 酸平無毒益氣力止多唾別錄食之治瘧辟精魅孟詵○弘景曰熱食虎肉傷齒

膏 治反胃 時珍○虎｜半斤切清油一斤瓷瓶浸一月勿洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫服以瘥為度油盡再添

肚 治反胃吐食 時珍○取生者勿洗新瓦固煆存性入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神效

膽 治小兒驚癇蔵器小兒疳痢神驚不安研水服之孟詵

虎睛 治瘧疾小兒驚悸孟詵主驚啼客忤鎮心安神

日華

明目去翳 時珍○[微曰]丨丨以生羊血浸一宿漉出微火焙乾用[時珍曰]千金治狂邪有丨丨湯丨丨丸並用酒浸炙乾用

方 **虎睛丸** 治癇疾發作涎潮搐搦時作譫語丨丨一對微炙犀角屑大黃遠志去心各一兩梔子仁半兩為末蜜丸綠豆大每溫酒服二十丸 千金 **小兒驚癇** 及夜啼丨丨一枚為散竹瀝調少許與服 姚和衆 **邪瘧時作** 生丨丨一枚臘月猪血少許硃沙阿魏各一分為末端午粽尖七枚和黍米大綿裹塞耳中男左女右 聖惠方

虎牙 治丈夫陰瘡及疽瘻 孫真人 殺癆蟲 時珍

方 **白虎風痛** 大丨丨一副四箇赤足蜈蚣十條酒浸三日晒乾天麻二兩乳香沒藥各一兩麝香半兩為末每服二錢溫酒下日三服 聖濟總錄

元素曰入陽明胃經 杲曰涼心瀉肝清胃中大熱

鳴皋曰本經治迷惑藥性治煩毒入心海藥治風毒攻心毒說治心風煩悶是又手厥陰少陰之藥也

鳴皋曰——今都中尚有真者其形下大如座子上粗而短據藥肆人云所謂將軍帽者此也來自暹羅他處俱不可用形長者來自西藏俗名天馬角小藥肆用以亂——皋察其紋理切作薄片總是白底黑花其尖則黑多白少未見有黃花者即今出南亦不聞出——也藥肆之說亦難作準即集解之說亦多可疑宜俟訪考

恭曰牸是雌犀

爪 繫小兒臂辟邪惡 別錄

皮 治瘧疾 藏器 辟邪魅 時珍

發明 時珍曰今人卒中惡病燒——飲之或繫衣服亦甚驗也起居雜記云其毛入瘡有大毒

犀角

集解 時珍曰——出西番南番滇南諸處有山犀水犀兕犀三種又有毛犀似之山犀居山林人多得水犀出入水中最難得並有二角鼻角長而額角短水犀皮有珠甲而山犀無之兕犀即犀之牸也止有一角在頂文理細膩斑白分明不可入藥蓋犀角文大而牸角文細也陳藏器謂犀無水陸郭璞謂犀有三角蘇頌謂毛犀為牯犀皆出訛傳今並正之毛犀即旄牛也——紋如魚子形謂之粟紋紋中有眼謂之粟眼黑中有黃花者謂之正透黃中有黑花者為倒透花中復有花者為

重透並名通犀乃上品也花如椒豆斑者次之烏犀純黑無花者為下品

苦酸鹹寒（別録曰微寒　李珣曰大寒）治百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆蛇毒除邪不迷惑魘寐（本經）傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣令人酸健（別録）鎮心神鮮大熱散風毒治發背癰疽化膿作水治時疾熱如火煩毒入心狂言妄語（藥性）治心煩止驚鎮肝明目安五臟補虛勞退熱消痰鮮山瘴溪毒（日華）主風毒攻心毷氉熱悶赤痢小兒驚癇（海藥）燒灰水服治卒中惡心痛飲食中毒藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶中風失音以水磨服治小兒驚

〔昂曰〕傷寒下早熱乘虛入胃則發斑下遲熱留胃中亦發斑
〔暴曰〕丨丨地黃湯治傷寒畜血發黃及熱盛吐衄不止
〔弘景曰〕入藥生犀為佳現成器物多被蒸煮及染手汗不堪用

〔介賓曰〕丨丨性升而善散故治傷寒熱毒表閉煩熱昏悶而汗不得解者磨尖攙入藥中取汗速如響應仲景曰如無丨丨以升麻代之者正以此兩物俱入陽明功皆升散今人莫得其解每致疑詞是但知丨丨解心熱而不知丨丨之能升能散尤峻于升麻也倘中氣虛弱脉細無神及痘瘡血虛真陰不足等症凡畏汗畏寒畏散者皆忌之嗚呼按此景岳獨得之解

獸部

癇孟詵磨汁治吐血衄血下血及傷寒畜血發狂譫語發黃發斑痘瘡稠密內熱黑陷或不結痂毒盛則不結痂瀉肝涼心清胃解毒

時珍〇〔之才曰〕松脂為之使惡雷丸雚菌

〔時珍曰〕升麻為之使惡烏頭烏喙〔斆曰〕忌鹽孕婦勿服能消胎氣〔頌曰〕有黑白二種黑者為勝角尖尤勝〔李珣曰〕丨丨鋸成片紙裹納懷中待熱擣之立成粉歸田錄云人氣粉犀

〔宗奭曰〕湯劑生犀磨汁為佳

發明〔時珍曰〕丨丨犀之精靈所聚足陽明藥也胃為水穀之海飲食藥物必先受之故丨丨能解一切諸毒五臟六腑皆禀氣于胃風邪熱毒必先干之故丨丨能治諸血及驚狂斑痘之症抱朴子云犀食百草之毒及衆木之棘所以能解毒凡蠱毒之鄉有飲食以此角攪之有毒則生白沫無毒則否以之煮毒藥則無復毒熱也北户錄云凡中毒箭以丨丨刺瘡中立愈由犀食百毒棘刺也淮南子云丨丨置穴

狐不敢歸則犀之精靈辟邪不惑益可見矣

方

吐血不止 似鵝鴨肝用生｜｜桔梗各一兩為末酒下一錢 總錄

中忤中惡 思氣其症或暮夜如廁或出郊外忽然倒地厥冷握拳口鼻出清血須臾不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖耳勿移動令人圍繞擊鼓或燒蕪合香候醒乃移動用｜｜五錢入射香辰沙各二錢半為末服二錢 華真人

小兒驚癇 嚼舌仰目者｜｜濃磨服效 廣利

痘瘡稠密 生｜｜濃磨冷飲 錢乙小兒

食雉中毒 同上方

瘭疽惡瘡 喜着十指狀如代指根深至肌能壞筋骨毒氣入臟殺人宜燒鉄烙之或炙百壯飲｜｜汁 千金

山嵐瘴氣 ｜｜磨服 集簡

下痢鮮血 ｜｜地榆生地各一兩為末蜜丸彈子大每用一丸水煎去渣服 聖惠

麢羊 又名羚羊俗名麢羊 說文

集解 別錄曰丨丨角出石城華陰山谷弘景曰今
出建平宜都蠻山中及西域多兩角一角者
為勝角多節蹙〻圓繞別有山羊角極長惟一邊
有節〻亦踈大不入藥用乃爾雅云羱羊者恭曰
丨丨今南山商洛間大有梁州真州亦貢其角細
如人指長四五寸而文蹙細山羊或名野羊大者
如牛角可為鞍　又有山驢大如鹿皮可作靴有
兩角大小如山羊角俗人亦用之陶氏所謂一邊
有粗文者是此非山羊也藏器曰山羊山驢丨丨
三種相似而丨丨有神夜宿防患以角掛樹不着
地但角彎中深銳緊小有掛痕者為真其踈慢無
痕者非也真角耳邊聽之集〻鳴者良陶氏言一
角者謬也頌曰今秦隴龍蜀金商州山中皆有戎
人捕得來貨其形似羊青色而大其角長一二尺
有節如人手指握痕又最堅勁郭璞註爾雅云麢
似羊而大其角細而圓銳羱似吴羊其角大而墮
出西方本草諸註各異覩今所市者與爾雅之丨
丨陶註之山羊蘇註之山驢大都相似今人相承

時珍曰｜｜入厥陰肝經最捷〔鳴皋曰〕
〔鳴皋曰〕｜｜
亦入少陽膽經
〔昂曰〕｜｜｜痘科多用以清肝火而本草
｜｜｜無温理
不言治痘
〔鳴皋曰〕｜｜｜鹹寒之品而別錄言能起

用之以為辨羊細角長四五寸者佳々彎有磨角成痕處詳諸說此乃真｜｜角而世多不用何也又閩廣山中出一種野羊彼人亦謂之｜｜也陳氏謂耳邊聽之鳴者良今牛羊但殺之者聽之皆有聲不獨｜｜也自死角則無聲矣〔寇氏曰〕諸角附耳皆有聲不如有掛痕一說為盡之然有偽作者宜察焉〔時珍曰〕｜｜角短小辨羊角長大山驢之身而羚之角但稍大而節蹙慢耳陶言羚有一角者陳氏非之按寰宇志云安南高石山出羚羊一角極堅能碎金剛石則羚固有一角者矣金剛百鍊不消物莫能擊惟｜｜角扣之則自碎又貘骨充佛牙物亦不能破用此角擊之亦碎皆相畏

耳

羚羊角　鹹寒〔別錄曰〕微寒〔權曰〕甘温　明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥令人不魘寐本經除邪氣驚夢

陰利丈夫人頗疑之蓋人之外腎其強弱
係于內腎以其氣本乎內腎也而其體則
筋々則本乎肝々盛則筋強矣肝之合為
胆而外腎之強弱取決焉如微房之人平
日亦不少獨新娶之夕陽不起或外遇而
陽不起何也心有所怯而胆氣不至也若
胆大之人雖腎甚虛亦無此患故古人有
治陽痿先治胆之說甚有理也｜｜｜肝
胆二經藥又能強筋治痿用熱藥可以此
為引經
鳴皋曰｜｜｜雖寒終係血肉之品不同
於苓連如產後風搐不妨放胆用之蓋風
搐非此不能定也予治一婦胎動下血搐
餘遂至血竭變為抽搐予於四物中加羚
羊訾議紛々卒用之而搐止血亦止而胎
不下予曰萬勿再行血胎因無血故澀而
不下再行血則血更傷矣養血以聽之當
無恙半月後胎果下
鳴皋曰｜｜｜安胎甚良胎前肝火甚者
必用之且其性能散血下氣也

狂越瘵傷寒時氣寒熱々在肌膚濕風注毒伏在骨
間及食噎（此肝經鬱火之噴）不通強筋骨起陰利丈夫別錄治中風筋攣
附骨疼痛作末蜜服治卒熱悶及熱毒痢血疝氣（諸疝皆肝病）孟詵
治一切熱毒風卒死昏亂不識人散產後惡血衝心
煩悶燒末酒服治小兒驚癇治嵐瘴及噎塞藥性治驚
悸心胸惡氣瘰癧惡瘡溪毒藏器平肝舒筋定風安魂
散血下氣辟惡解毒治子癇痙疾時珍〇敩曰有神
羊角甚長有二十
四節內有天生木胎此有神力抵千羊凡使不可單
用要不拆原對繩縛鐵銼々細窶褁避風旋々取用
擣篩極細更研萬
匝入藥免刮人腸

〔鳴皋曰〕世以｜｜為驅風藥而不知其實清肝火之藥也肝熱則自生風育陰可以息之予於外感之風多用荆防于內生之風多用｜｜乾蝎其應如响東壁云定風定字最確

〔鳴皋曰〕｜｜｜目疾要藥不可缺也

發明〔時珍曰〕羊火畜也而羚羊屬木故其角入厥陰肝經甚速也肝主木開竅于目其發病也目暗障翳而｜｜能平之肝主風其合為筋其發病也小兒驚癇婦人子癇大人中風搐搦及筋脉攣急歷節掣痛而｜｜能舒之魂者肝之神也發病則驚駭不寧狂越僻謬魘寐卒死而｜｜能安之血者肝之藏也病則瘀滯下注疝氣毒痢瘡腫瘰癧産後血氣而｜｜能散之相火寄於肝膽在氣為怒病則煩懣氣逆噎塞不通寒熱及傷寒伏熱而｜｜｜能降之羚之性靈而筋骨之精在角故又能辟邪惡而解諸毒碎金剛而燒烟走蛇虺也本經別錄甚著其功而近世罕能發揚惜哉

方 噎塞不通｜｜｜為末飲服方寸匕 胸脇通滿並以角摩噎上 外臺

腹痛熱滿同上 ｜｜燒末水服方寸匕 子母秘錄

墮胎腹痛血出不止 ｜｜｜燒末三錢豆淋酒下 普濟

産後煩悶汗出不識人｜｜｜燒末東流水服方寸匕末

䳥曰｜｜能舒筋產難者多交骨不開骨不開筋緊也故用以催生有效

埤雅云鹿仙獸六十年必懷璚于角斑痕紫色行則有涎故曰鹿戴玉而角斑魚懷而鱗紫

時珍曰鹿茸鹿角右腎精氣不足者宜之

昂曰惟脉細相火衰者宜之鳴象曰能通督脉

希雍曰入手足厥陰心包肝手足少陰心腎經

獸部

愈再服或加只寶芍藥 千金 忌直慎用

血氣逆煩｜｜｜燒末水服 肘後

臨產催生｜｜｜磨尖酒服方寸匕 產寶

小兒下痢｜｜｜中骨燒末飲服方寸匕 秘錄

遍身赤丹｜｜｜燒末鴉子清調塗神效 外臺

赤斑如瘡 痒甚則殺人｜｜磨汁摩之數百遍效 肘後

山嵐瘴氣｜｜｜末水服一錢、 集簡

鹿

又名斑龍 濱寮 時珍曰｜喜山而屬陽故夏至則解角牝無角牡有角大如小馬黃質白斑牝者小而無斑

鹿茸

集解 宗奭曰｜｜以如紫茄者為上取其難得耳然太嫩血氣未具其實少力堅者又太老惟長四五寸形如分歧馬鞍茸端如瑪瑙紅玉破之如朽木者最善凡含血之物肉差易長筋次之骨

鹿

四十一

最難長故人自胚胎至成人二十年骨髓方堅惟
麋鹿角自生便堅兩月之久大者至二十餘斤骨
生之速無速于此者所以能補骨血堅陽道益精
髓也頭者諸陽之會上鍾于茸角豈可與凡血為
此
哉

甘溫治漏下惡血益氣生齒不老本經療虛勞洒洒如
瘧羸瘦四肢酸痛腰脊痛小便數洩精溺血破瘀血
在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢安胎下氣殺鬼精物
久服耐老不可近丈夫陰令痿別錄補男子腰腎虛冷
脚膝無力夜夢鬼交精溢自出女子崩中漏血赤白因氣血虛者可用
帶下炙末空心酒服方寸匕壯筋骨日華生精補髓益

鳴皋曰鹿茸性熱不止于溫
鳴皋曰｜｜能發痘本草所未言有痘因
重小兒之氣血不能供以至毒不外出而
紫陷枯萎｜｜能峻補氣血其性熱而外
發能送毒出成膿近醫用之間有回生者
若非氣血不供由熱毒太甚而陷者似不
可用
希雍曰婦人衝任脈虛則為漏下惡血或
瘀血在腹或為石淋男子肝腎不足則為
寒熱或虛勞洒洒如瘧或羸瘦四肢酸痛
腰脊痛或泄精溺血此藥走命門心包及
肝腎之陰分補下元真陽故主以上諸症
瘕腫疽瘍皆營氣不從所致甘溫能通血
脈和腠理故亦主之

陽養血强筋健骨治一切虛損耳聾目暗眩運虛痢等疾［時珍］

寫泉曰用牛乳入乳黃便浸俱佳

［說曰］｜｜不可以鼻嗅之中有小白虫視之不見入人鼻必爲蟲顙藥不及也［斅曰］凡使｜｜用黃精自然汁浸兩日切焙擣用免渴人［時珍曰］瀋寮濟生諸方有用酥炙酒炙及酒蒸焙用者當各隨本方

發明［時珍曰］瀋寮方云一道士貨斑龍丸一名茸珠丹歌曰尾閭不禁滄海竭九轉靈丹都慢說惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下穴其方蓋用｜｜鹿角膠鹿角霜也又戴原禮證治要訣治頭眩運甚則屋轉眼黑用茸珠丹甚效或用｜｜半兩無灰酒三盞煎一盞入射香少許溫服亦效云茸生于頭以類相從也

方

斑龍丸｜｜酥炙鹿膠炒珠鹿角霜陽起石太熱煆酒淬肉蓯蓉酒浸棗仁柏子仁炒黃芪

鹿

布雍曰鹿茸稟壯健之性故能峻補腎家真陽角熬成膠則氣味甘緩能通周身血

審炙各一兩當歸附子炮熟地九製各八錢辰沙半錢各為末酒丸梧子大酒下五十丸　澹寮

陰虛腰痛　不能反側｜｜炙兔絲子各一兩茴香半兩為末以羊腎二對酒煮爛搗丸梧子大每服三五十丸酒下　本事

精血耗涸　耳聾口渴腰痛白濁上燥下寒不受峻補者｜｜酒蒸當歸酒浸各一兩焙為末烏梅肉煮膏搗丸梧子大每米飲服五十丸　濟生

虛痢危困　回血氣衰弱者｜｜酥炙一兩為末入射香五錢以燈心煮棗肉和丸梧子大每米飲下三五十丸　同上

飲酒成瀉　骨立不能食但飲酒即瀉用｜｜酥炙肉蓯蓉煨一兩入生射香五分為末陳米飯丸米飲下　名香

白帶　因衝任虛寒者｜｜酒焙二兩金毛狗脊白歛各一兩為末用艾煎醋打糯米糊丸梧子大每溫酒下五十丸日二　濟生　茸丸　普濟

鹿角　鹹溫主惡瘡癰腫逐邪惡氣治留血在陰中

脉生用則味鹹氣温惟散熱行血消腫辟惡氣而已鹹能入血軟堅温能通行散邪故主瘡腫逐邪惡及留血在陰中少腹血急痛折傷惡血等症也

嗚皋曰鹿角以通為用為行血活血要藥生用行血尤良熟則温生則平

除少腹血痛腰脊痛折傷惡血 別錄 治中惡心腹痛 蘇恭 水磨生服則不熱行血尤良

水磨汁服治脫精尿血夜夢鬼交醋磨汁塗瘡瘍癰腫熱毒 日華 蜜炙研末酒服强骨髓補陽道絶傷又治 大 婦人夢與鬼交清酒服一撮即出鬼精燒灰治婦人胞中餘血不盡欲死以酒服方寸匕日三甚妙 孟詵

時珍曰杜仲為之使

發明 時珍曰｜｜生用則散熱生血消腫辟邪熟用則益腎補虛強精活血鍊霜熬膏則專于滋補

方 脫精尿血 水磨汁服 日華 骨虛勞極 面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜唾用｜｜二兩牛膝酒蒸一兩半為末蜜丸梧子大鹽酒下五十丸 濟生 腎

虛腰痛如錐刺不能動揺｜｜屑三兩炒黃研
末空心溫酒服方寸匕日三　肘後方　婦人
腰痛方同上日四　妊娠腰痛｜｜燒赤投一升酒中
五服　產乳　又燒又浸如此數次細
研酒服　產後腹痛血不盡者｜｜燒研末豉汁
產寶　服方寸匕日二　子母秘錄　妊娠
下血不止｜｜屑當歸各半兩用水　胎死腹中｜｜
煎減半頓服不過二服　普濟　三寸
為屑煮葱豉湯和服　墮胎血瘀不下狂悶寒熱｜｜
立出　百一選方　屑一兩研極細豉湯
服一錢日三　血　小兒瘧疾生研為末先發時以
當下　聖惠、　乳調服一字　千金　小兒
流涎脾熱也｜｜屑末米　面上皯皰｜｜尖磨濃汁
飲服一字　普濟　厚塗之神效
面上風瘡｜｜尖磨酒塗之　聖惠　跌打損傷血瘀骨痛｜｜末
酒服方寸匕日三
千　竹木入肉不出｜｜燒末水和塗上刺
金方　立出久者不過一夕　千金　乳發初

起不治殺人｜｜尖磨濃汁塗之並令人嚼去黃水隨手即愈梅師吹乳掀痛｜｜屑炒
黃為末酒服二三錢仍以梳梳之唐氏經驗鬼魅諸病病人不肯言與｜｜屑水服方寸匕
即言實也
錄驗

鹿角膠一名白膠本經粉名鹿角霜時珍曰煮爛成粉者為鹿角霜取粉熬膠或只以濃汁熬成膠者名
鹿角膠
甘平別錄曰溫治傷勞絶腰痛羸瘦補中治婦人血閉無
子止痛安胎本經治吐血下血崩中不止四肢作痛多
汗淋露折跌傷損別錄治漏下赤白藥性炙擣酒服補虛
勞又治勞嗽尿精尿血瘡瘍腫毒時珍○得火良畏大黃

發明〔𣪊曰〕凡使鹿角勝于麋角〔頌曰〕今醫家多用麋
角云力緊于鹿角也〔時珍曰〕東坡云鹿陽獸見
陰而角鮮麋陰獸見陽而角解故補陽以鹿角為勝
補陰以麋角為勝按此說與沈存中鹿茸利補陰麋
茸利補陽之說相反以
理與功推之藴說為是

方 異類有情丸 韓氏醫通云凡丈夫中年覺衰便
可服此盖血氣有情各從其類非
金石草木比也鹿角霜龜板酒浸七日酥炙各三兩
鹿茸酒洗酥炙虎脛骨長流水浸七日酥炙各二兩
四錢犢猪脊髓九條共研擣蜜丸梧子大空心鹽
湯下五七十丸如厚味善飲者加猪胆汁一二合

盜汗遺精 鹿角霜二兩生龍骨炒牡蠣煅各一兩為末
酒糊丸梧子大每鹽湯下四十丸 普濟

面 甘溫補中益氣生者治中風口僻切片貼之 別錄

口 華佗云中風口偏者以生
鹿丨同生椒擣貼正即除之

養血治產後風虛邪僻

時珍○[詵曰]同雉肉蒲白鮑魚蝦食發惡瘡

發明[思邈曰]凡藥餌之人久食鹿丨服藥必不得力為其食解毒之草制諸藥也[時珍曰]邵氏言鹿一身皆益人大抵鹿純陽多壽之物能通督脉又食良草故其肉角有益無損

骨 微熱作酒主内虛續絕傷補骨以骨補骨除風思邈燒灰水服治小兒洞注下痢 時珍○千金鹿骨煎補益虛羸用鹿丨一具枸杞根二斤各以水一斗煎汁五升和勻共煎五升日二服良

髓 治傷中絕脉欬逆酒和服良別錄壯陽令人有子同地黃汁煎膏填骨髓日華補陰強陽益髓潤燥澤肌時珍○聖惠鹿丨煎治肺痿咳嗽傷中脉絕用鹿丨生地黃汁各七合酥蜜各一兩杏仁桃仁各三兩去

纂曰凡血無不活血行血須生用鹿血之性又能補陽故兼行氣須現刺熱飲為尤佳取其生氣未散也諸氣痛欲危者總由肝血大虛肝陽不歛土衰木横或血瘀經絡而然熱飲鹿血有瘀者則血活而瘀散瘀散而氣行無瘀者則補血補氣而又能活血行氣故主之也

皮炒酒一升同搗取汁先煎杏仁桃仁地黃汁減半入三味煎如稀餳每含嚥一匙日三

血 治陰痿補虛止衄治折傷以血散血狂犬傷 攝衆 治肺痿吐血及崩帶 日華 諸氣痛此肝家氣血俱虛之痛欲危者飲之立愈 汪頴 大補虛損益精血解痘毒藥毒 時珍

發明 頌曰近世服鹿一酒者云得于射生者因采捕入山失道數飢渴將委頓獲一生鹿刺一數升飲之飢渴頓除歸遂覺血氣充盛異人令服者刺鹿頭角間一和酒飲更佳 時珍曰近世有斑龍晏法孫氏解痘毒有陰陽二血丸皆古所未知者

方 斑龍晏 養壯鹿一二隻以時喂之將行晏法夜前減食次早縛鹿于床令有力者抱定前足掐其首使不得動用三稜針刺其眼之大眥前毛孔名天池穴以銀管長三寸許插向鼻梁坐定咂

其血飲藥酒數杯再咂再飲以醉為度流出者亦可接和酒飲々畢避風行升降工夫為一晏用生肌散傳鹿傷養之月可一度一鹿可用六七年不拘男女老少服之無疾而壽乃仙家服食丹方之一也藥酒以八珍散加沉香木香煮之　韓飛霞補益方

陰陽二血丸

鹿丨兔血曬乾乳香末藥各一兩雄黃々連各五錢硃砂射香各一錢為末蜜丸綠豆大每服十丸酒下兒小者減之治小兒痘瘡未出者稀已出者減　孫氏集效方

麋

時珍曰丨似鹿而色青黑大如小牛肉蹄目下有二竅為夜目牡者有角喜澤而屬陰故冬至解角

麋茸　甘温治陰虛勞損一切血病筋骨腰膝酸痛滋陰益腎　時珍

麋角　甘熱治風痺止血益氣力　別錄　作屑熬香酒服

麋　四十六

鳴皋曰麋茸大而毛青大於鹿茸兩倍鹿茸小而毛黃陳自明以大小分之甚確但予所見北都之鹿茸麋茸如此南方所產不知何如

鳴皋曰麋茸鹿茸性俱相近而熱予泥于東壁氏補陰之說用之屢屢知其仍偏于補陽也東坡謂鹿角見陰而解麋角見陽而解遂謂鹿茸補陽麋茸補陰亦似有理用之始知其不然也孟詵蘇恭俱言麋之功力勝鹿必有所試矣大抵鹿茸麋茸俱性熱補陽又係血肉之品與草木石之燥

大益人 弘景 酒服補虛勞添精髓益血脉暖腰膝壯陽療風氣偏治丈夫 日華 作粉常服治丈夫冷氣及風筋骨痛若卒心痛一服立瘥漿水磨塗面令人光華赤白如玉 孟詵 滋陰養血功與茸同 時珍

○時珍曰麋鹿茸角人罕能分別陳自明以小者為鹿茸大者為麋茸亦臆見不若親視其采取為有準也造膠霜並與鹿角同法又集靈方錯屑以牛乳浸透隔水蒸待屑軟如麪取出焙研成霜用

發明 詵曰麋角常服大益陽道煎膠與鹿角同功茸亦勝鹿茸 恭曰麋茸功力勝鹿茸膠亦勝鹿膠 日華曰麋角屬陰故治腰膝不仁補一切血病也 時珍曰鹿之茸角補陽右腎精氣不足者宜之麋之茸角補陰左腎血液不足者宜之此千古之微秘前人方法雖具而理未發出故論者紛紛又楊氏家藏治

烈者不同以血補血故補陰亦勝但欲補陽佐以桂附欲補陰須佐以歸地耳

虛損有二至丸兩角並用但藥性過温止宜于陽虛寒濕血痺者耳于左腎無與焉千金言麋角丸百一十方惟容成子羔所服者特出衆方之外今觀其方比二至丸似可常服

補心神安五臟填精髓理腰膝聰明耳

方　麋角丸

目新麋角四五具自蛻角根下平者不堪用去尖一寸截斷以長流水浸十宿每夜換水軟即取出削去皺皮鎊之鎊取白處至心即止以青粟米泔浸兩宿瀝出置新絹上晒乾以無灰酒于大磁器中浸兩宿其藥及酒俱入淨釜中初用武火煎一食時後以文火微煎柳木枝徐攪不得住手時時添酒以成煎為度煎時須以平旦下手不得經宿看屑如稀膠即以牛乳五升酥一片漸次下後項藥仍以麋角一條炙黃為末與諸藥同製之檳榔通草秦艽肉蓯蓉人參兔絲子酒浸兩宿別擣焙乾甘草各一兩共擣為末將膠再煎一食頃似稠粥即止火少時投諸藥末相和得宜衆手一時丸如梧子大如粘手以酥塗手酒服三十丸日加一丸加至五十丸為度

日二百日內忌房事服至一月腹內諸疾自相驅逐有微利勿怪患氣者加木香枳實青皮各一兩服至三年腸胃如筋合時勿令陰人孝子鷄犬見之婦人服之尤佳如口乾眼澁內熱者即服三黃丸微利之如此一度發動後方始條暢也 孫真人方

二至丸 補虛損生精血去眼濕壯筋骨鹿角鎊以酥一兩酒一升慢火炒乾取四兩麋角鎊酥二兩醋一升煮乾慢火炒乾取四兩蒼耳子酒浸一宿焙半斤山藥白茯苓炙黃芪各四兩酒浸當歸五兩酒浸肉蓯蓉去心遠志人參沈香各二兩熟附子一兩共為細末酒煮糯米糊丸桐子大每服五十丸鹽湯下日二服 楊氏家藏

麋角丸 使人丁壯不老房室不勞顏色不衰麋角末十兩生附子一枚雀卵和丸日服二十丸溫酒下二十日大效亦可單熬為末酒服但性緩不及有附子者 彭祖服食經

麝 又名射父 爾雅 香獐

集解〔弘景曰〕｜形似獐而小黑色常食柏葉又噉蛇其香正在陰莖前皮內別有膜袋裹之今人以蛇蛻皮裹香云彌香是相使也｜噉蛇多至寒則香滿自以爪剔出着屎中覆之常在一處不移曾有遇得乃至斗許此香絶勝殺取者今出羌夷者多真出隨郡義陽晉溪諸蠻中者亞之出益州者形扁仍以皮裹之多偽〔時珍曰〕｜出西北者香結實出東南者謂之土｜亦可用力次之南中靈貓其氣如｜人以雜之

麝香 辛溫無毒辟惡氣殺鬼精物去三蟲蠱毒溫瘧驚癇〔本經〕療中惡心腹暴痛脹急痞滿去目中膚翳婦人產難墮胎〔別錄〕佩服辟惡夢及尸疰鬼氣療蛇毒 弘景曰抱朴云入山辟蛇以｜｜着足爪中有效 殺臟腑蟲〔通經絡〕治瘧疾吐

麝 四十八

風痰納子宮暖水臟止冷帶下日華治小兒客忤止小便利又能蝕疽瘡膿水藥性通諸竅開經絡透肌骨解酒毒消瓜果食積治中風中氣中惡痰厥積聚癥瘕

時珍○甄權曰忌大蒜李廷飛曰||莫近鼻有蟲入腦令人患癩久帶其香透關多令人成異疾

發明杲曰||入脾治肉病凡風病在骨髓者宜用之使風邪得出若在肌肉用之反引風入骨莫之能出也丹溪曰五臟之風不可用||以瀉衛氣口鼻出血乃陰盛陽虛有升無降當補陽抑陰不可用腦麝輕揚飛竄之劑婦人以血為主凡血海虛而寒熱盜汗者宜補養之不可用||之散琥珀之燥嚴用和曰中風不省以||清油灌之先通其關則後免語蹇癱瘓之證而他藥亦有效也時珍曰嚴氏言風病必先用||而丹溪言風病血病必不可用皆非通論蓋||走竄能通諸竅之不利開經絡之

壅遏若諸風諸氣諸血諸痛驚癇癥瘕諸病經絡壅閉孔竅不利者安得不用為引導以開之通之耶非不可用也但不可過耳濟生方治食瓜果成積作脹者用之治飲酒成消渴者用之 云果得麝則壞酒得麝則敗此得用｜｜之理者也

方 中風不省 ｜｜二錢研入清油二兩和勻灌之其人自甦也 濟生 中惡客忤 項强欲死｜｜少許乳汁塗兒口中取效 廣利方 破傷風水 毒腫痛不可忍｜｜末一字納瘡中出盡膿水便效 普濟 中惡霍亂 ｜｜一錢醋半盞調服 聖惠 諸果成積 傷脾作脹氣急用｜｜一錢生桂末一兩飯丸綠豆大大人十五丸小兒七丸白湯下蓋果得麝則落木得桂則枯也 濟生 酒果消渴 方見枳椇子 偏正頭痛 久不除者晴明時將髮分開用｜｜五分皂角末一錢薄紙裹置患處以布裹熱鹽於上熨之冷則易如此數次永不發 簡

〔齊東野語曰〕熊胆善辟塵撲塵水上投胆米許則塵豁然而開也

便單方

五種蠱毒｜｜雄黃等分爲末以生羊肝如指大以刀割開裹藥呑之　衛生口

肉肉毬有根如線五寸餘吐出乃能食物捻之痛徹心｜｜一錢研水服日三自消　夏子益奇疾

催生易産續千金｜｜一錢研水服立下〇濟生方　勝金散治人弱難産｜｜一錢盬豉一兩以舊青布裹之燒紅爲末以秤錘淬酒服二錢即下郭稽中云産難及橫逆生者乃兒枕破而敗血裹子服勝金散逐其敗血自生也

死胎不下｜｜一錢桂心末二錢酒服即下　本事

鼠咬成瘡｜｜封之　經驗

蠶咬成瘡蜜調｜｜傅之　廣利

山嵐瘴氣水服｜｜三分解之　集簡方

熊〔時珍曰〕如豕色黑者｜也大而色黃白者羆也小而色黃赤者魋也熊頭長脚高力能拔樹虎亦畏之遇人則人立而攫之故俗呼人｜爾雅翼曰猪｜形如豕有馬｜形如馬者即羆也

[時珍曰]手少陰心厥陰心包足陽明胃經藥

[鳴皋曰]猪胆羊胆等類俱用為肝胆經引經則一一當亦屬足少陽足厥陰藥也

[鳴皋曰]凡猪羊牛胆皆可治疸不獨熊胆也

[希雍曰]凡胆皆極苦寒而走肝胆瀉有餘之熱蓋以類相從也小兒疳積多致目內生翳障者以肝脾二臟邪熱壅滯則二臟之氣血日虛閉塞日甚故也用此瀉肝胆脾家之熱則內清而外障去矣如不因疳症而生障翳及痘後蒙蔽者多因肝腎兩虛宜滋陰養血清熱為急諸胆皆不得用

有痛疾者不可食熊肉令終身不愈

熊膽 苦寒治時氣熱盛變為黃疸暑月久痢疳𧏾心痛疰忤蘇恭 治諸疳耳鼻瘡惡瘡殺虫日華 小兒驚癇瘈瘲以竹瀝化兩豆許服之去心中涎甚良孟詵 退熱清心平肝明目去翳殺蚘蟯虫時珍○[權曰]惡防己地黃[頌曰]一一陰乾用然多偽者但取粟許滴水中一道若線不散者真[時珍曰]錢乙云一一佳者通明每以米粒許點水中運轉如飛者餘胆亦轉但緩耳

發明 [時珍曰]一一苦入心寒勝熱手少陰厥陰足陽明經藥也故能涼心平肝殺虫為驚癇疰忤翳障疳痔虫牙蚘痛之劑焉

方 赤目障翳 每以一一少許化開入冰片少許銅器盛點之奇妙痒加生薑粉少許

希雍曰｜｜又能拔毒長肉生肌去漏管為瘡家用

齊東野語 小兒鼻蝕｜｜化抹之 聖惠 十年痔漏｜｜塗之神效一切方不及也

外臺 蚘虫心痛｜｜一大豆許水化服大效

外臺 小兒驚癇方見大蟲

牙痛｜｜入片腦猪胆調搽 攝生方

諸疳羸瘦｜｜使君子末等分研勻磁器蒸溶蒸餅丸麻子大每米飲下二十丸 保幼大全

象牙｜甘寒 諸鐵及雜物入肉刮牙屑敷之立出 開寶

諸物刺咽中磨水服亦出 蘇頌 主風癇驚悸一切邪魅

熱疾骨蒸及諸瘡並宜生屑入藥 時珍

發明 時珍曰周禮壺涿氏掌水蟲欲殺其神者以棒木貫象齒而沉之則其神死而淵為陵註云棒木山榆以｜｜作十字貫于木而沉之則龍罔象之類死也觀此則象之駈怪辟邪宜乎其能治心肝驚

痼迷惑邪魅之疾也

方 小便不通 脹急者｜｜生煎服之 救急 小便過多 燒灰飲服 總錄

象膽 苦寒與熊膽同功 時珍○〔斅曰〕｜｜乾了上有青竹文斑光膩其味微帶廿

方 內障目翳 如偃月或如棗花用｜｜半兩鯉魚胆七箇熊胆半兩牛胆半兩射香一分石決明末一兩糊丸綠豆大每茶下十丸日二 總錄

水獺

集解 〔弘景曰〕獺有兩種入藥惟取以魚祭天者一種形大而頸如馬身似蝙蝠者為獱獺不入藥 〔時珍曰〕｜｜狀似青狐而小毛色青黑似狗膚如伏翼長尾四足水居食魚今川沔漁舟往〻馴

〔杲曰〕獺肝厥陰肝經藥

〔希雍曰〕獺肝能益陰氣補虛損保勞極入肝入腎之藥

〔杲曰〕瘵多見鬼症以肝虛則見鬼肝藏魂〻不安舍而邪祟乘之也獺肝能益肝而善除邪祟故治瘵

畜之使捕魚甚捷

獺肝 甘温〔頌曰〕肉及五臟皆寒惟肝温也 治鬼疰蠱毒止久嗽除此勞虫之病魚鯁並燒研酒服之別錄 治虛勞嗽病藥性 治傳尸勞極虛寒客熱四肢寒瘧及產勞蘇頌 殺虫時珍 ○〔頌曰〕諸畜肝葉皆有定惟丨丨一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多偽也

發明〔宗奭曰〕丨丨治勞用之有驗〔頌曰〕仲景治冷勞有丨丨丸崔氏治九十種蠱疰傳尸骨蒸伏連殗殜諸鬼毒癘疾有丨丨丸二方倶妙〔詵曰〕疰病一門倶患者以肝一具火燒水服方寸匕日再服葛洪云尸疰鬼疰乃五尸之一又挟諸鬼邪為害其病變動乃有三十六種至九十九種大畧使人寒熱沉〻默〻不知病之所苦而無處不惡積月累年淹滞至死〻後傳至絕門覺有此患惟以丨丨一具陰乾為

〔纂曰〕一一詳其所主自係厥陰肝經藥而兼入手陽明大腸者也下血陰蝕肝之病也凡疝無不屬肝也又治五痔及腸風痢疾脫肛是兼入大腸

〔纂曰〕凡鋒銳之物皆能達病所如皂刺棗刺是也猬刺鋒銳又係血肉之類故治痔特佳且猬之陰伏有類狐鼠及獺故亦能辟蟲

末水服方寸匕日三以瘥為度〔時珍曰〕五月五日午時急砍一竹竹節中必有神水瀝取和一一為丸治心腹積聚病甚效也

方 鬼魅一一末水服方寸匕日三 千金翼 腸痔有血一一燒末水服一錢 肘後

下血不止一一一具煮熟食之妙 飲膳正要

猬皮 又名彙古猬字毛刺 爾雅 蝟〔宗奭曰〕一一治胃逆開胃故從虫從胃

苦平治五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮服之 本經 療腹痛疝積燒灰酒服 別錄 治腸風下血痔痛有頭多年不瘥炙末飲服方寸匕燒灰吹鼻止衄血甚驗解一切藥力 藥性〇〔甄權曰〕得酒良畏桔梗麥冬炒黑

鳴皋曰余聞真人云彼處有呪蠱之術用蛇蝦蟇之類日呪之俟蠱成放出害人但有猬之家蠱不敢入則猬之治蠱有來由矣

入藥方

五痔下血 衍義云用｜｜穿山甲等分燒存性入肉豆蔻一半空腹熱米飲下一錢炒〇外臺用｜｜三指大熏黃如棗大熟艾一錢穿地作坑調和取便熏之取口中有烟氣為佳將息三日再熏之三度永瘥勿犯風冷忌鴨魚猪肉生冷二十日後用藥補之

腸痔有虫 ｜｜燒末生油和塗 肘後

腸風下血 白｜｜一箇慱焦去皮留刺木賊半兩炒黑為末每服二錢熱酒下

蠱毒下血 ｜刺燒末水服方寸匕當吐蠱出 千金方

五色痢疾 楊氏方 ｜｜燒末酒下

大腸脫肛 ｜｜一片燒磁石煅五錢桂心五錢為末每服二錢米飲下 壽域

眼睫倒刺 猬刺棗刺白芷青黛等分為末隨左右目嗃鼻中口含冷水 葉氏摘立

反胃吐食 ｜｜燒灰酒服 瑞竹堂

猘犬傷人 ｜｜頭髮等分燒灰水服 普濟

外臺方

兎肉 辛平〔詵曰〕酸冷〔時珍曰〕甘寒 治熱氣濕痹止渴健脾壓丹石毒 日華 臘月作醬食去小兒豌豆瘡 藥性 涼血解熱毒利大腸 時珍○〔弘景曰〕妊娠不可食令子缺脣不可合白鷄肉及心肝食令人面黃合獺肉食令人病遁尸不可合薑橘芥食〔藏器曰〕｜｜久食損陽事令人瘦黃八月至十月可食餘月傷人神氣

死而眼合者殺人

發明〔宗奭曰〕兎白毛者得金之氣入藥尤效秋深可食金氣全也〔時珍曰〕今俗以兎飼小兒云令出痘稀蓋亦因其性寒而解熱耳故又能治消渴丹石毒也若痘已出及虛寒者宜戒之劉純治例云反胃結腸甚者難治常食｜｜則便自行又可證其性寒利矣

方 消渴｜｜煮極爛去渣澄汁渴即冷飲不過二兎即愈 海上

血　酸寒凉血活血鮮胎中熱毒催生時珍

方　兎血丸小兒服之稀痘臘八日取生兎一隻刺血和蕎麥麪少加雄黃四五分丸綠豆大初生以乳汁下二三丸遍身發紫點為驗兒長成常以兎肉啖之保壽堂　催生丹臘月以蒸餅染兎血陰乾為末每服二錢乳香湯下指迷　心氣痛談埜翁方臘八日取生兎血和麪丸桐子大每白湯下二十一丸○或加茶末乳香丸服

腦　催生滑胎時珍

方　催生丹臘月取兎腦髓一個攤紙上陰乾入乳香末同研以猪肉擣和丸芡子大紙袋盛懸風處每服一丸醋湯下未下更服用冷酒下此仙方也經驗　發背痛甚臘月兎腦入瓶內蜜封久彌佳痛時每用厚塗熱痛即止如水也頻換取瘥勝金

風熱上衝目暗常食甚好生食效尤速

「泉曰」」去目翳治癆瘵五疳應係足厥陰肝經之藥

「泉曰」」治痔漏以腸中之物治腸中之病也

獸部

肝 明目補勞治頭旋眼眩 日華○和決明子丸服最明目

發明 「時珍曰劉守真云兎肝明目因其氣有餘以補不足也眼科書云兎肝能瀉肝熱盖兎目瞭而性冷故也

皮毛 燒灰酒服方寸匕治産難及胞衣不出餘血搶心脹刺欲死者極驗 蘊茶 頭皮灰主鼠瘻及鬼疰毒氣在皮膚如針刺毛灰治灸瘡不瘥 藏器 皮灰主婦人帶下毛灰主小便不利 時珍

兎屎 一名望月沙 明月沙聖惠 翫月沙集驗 兎蕈炮炙論 治目中浮翳勞瘵五疳疳瘡痔瘻殺虫解毒 時珍○臘月收

兎

五十四

發明

時珍曰｜｜能解毒殺虫故治目疾疳勞瘡痔方中往往用之諸家本草不言亦缺漏也沈存中良方云江陰萬融病癆四體如焚寒熱煩躁夜夢一人腹擁一月光明使人心骨皆寒醒而孫元規遺藥服之遂愈問之乃明月丹也

方

明月丹 治癆瘵追虫用｜｜四十九粒硇沙如｜｜大四十九粒為末生蜜丸桐子大月望前以水浸甘草一夜五更取汁送下七丸有虫下急鉗入油鍋內煎殺三日不下再服 蘇沈良方

痔瘡下虫 ｜｜慢火炒黃為末每服二錢入乳香五分空心酒下日三 集驗方

痘瘡入目 ｜｜為末茶服一錢 普濟

痘後生翳 直往山中東西地上尋｜｜二七枚不許回顧以雌雄梹榔各一枚同磨不落地井水調服百無一失如神 藺氏經驗

敗筆 時珍曰惟兎毫入藥

燒灰水服治小便不通及數難淋

時珍曰丨腎子治腎病

瀝陰腫脫肛中惡 唐本 酒服二錢治男子交婚之夕莖

痿 藥性 酒服二錢治産難漿飲服二錢治咽喉痛不下

飲食 時珍

發明 時珍曰 筆不用新而用敗者取其沾

濡膠墨也膠墨能利小便胎産故耳

方 心痛不止 丨丨頭三枚燒灰 勝金方 聖妙

無根水服 經驗 催生 寸金散丨丨

頭燒灰生藕汁一盞調下立産○陸氏治産難第一

方用兎毫丨丨頭三枚燒灰金三片以蠟和丸酒服

鼠 日華曰 牝丨不入藥 治踒折續筋骨生搗傅之三日一易

別錄 猪脂煎膏治打撲折傷凍瘡湯火傷 説曰 臘月以油煎枯去渣

熬膏收用 頌曰 油煎入蠟 煎油治小兒驚癇 日華 五月

傅湯火傷滅瘢痕極良

五日同石灰搗收傳金瘡神效時珍煎膏治諸瘡瘻弘景

發明

完素曰|善穿用以治瘡瘻者因其性而為用也

方

鼠瘻潰爛壯|一枚亂髮一鷄子大以三歲臘猪脂煎令消盡以半塗之以半酒服姚氏云不傳之妙法也

瘡腫熱痛蠶|膏用大壯|一箇清油一斤煎焦滴水不散濾去渣再煎下炒紫黃丹五兩柳枝不住攪勻滴水成珠下黃蠟一兩熬帶黑色成膏甕瓶收之每用攤貼止痛而涼經驗方

潰瘻不合雄|燒末傳之千金

破傷風病口噤角弓反張雄|一箇和尾燒灰臘猪脂和塗梅師

又方取活|去五臟乘熱貼之

婦人狐瘕因月水來或悲或驚或逢疾雨暴風被濕致成狐瘕精神恍惚月水不通胸脇腰背痛引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其瘕手足成形者殺人未成者可治用活雄|一箇以新絮裹之黃泥固住入地坎中桒薪燒其

杲曰腎主骨鼠治腎病故主骨蒸勞極用骨尤良以骨治骨也

上一日夜取出去滓入桂心末六銖爲末每酒服方寸匕不過二服當自下 外臺素女經 令子易産 牡丨燒末井花水服方寸匕日三 子母秘錄 乳汁清少 雄丨一頭燒末酒服方寸匕勿令婦知 同上 杖瘡腫痛 未生毛丨同棗棋子入麻油中浸釀臨時取塗甚效 西湖志 湯火傷 小老丨泥包燒末菜油調塗 談埜翁方

肉 甘平治小兒哺露大腹炙食之 別錄 小兒疳疾腹大貪食黃泥裹燒熟取肉作羹食勿食骨甚瘦人 孟詵

骨 主骨蒸勞極殺虫及小兒疳瘦酒熬入藥 蘇頌 炙食治小兒寒熱諸疳 時珍○並用雄鼠

胆 點目治青盲雀目不見物滴耳治聾 時珍○時珍曰胆在

肝之短葉間大如黃豆正白色貼而不垂衛生家寶方言其胆紅色者何耶

發明 時珍曰癸水之位在子氣通于腎開竅于耳注精于瞳其標為齒鼠亦屬子宮癸水其目夜明在卦屬坎其精在胆故胆能治耳聾青盲睛能明目而骨能生齒皆腎病也諸家不言胆能治聾肘後方甚稱其妙云能治三十年老聾若卒聾者不過三度也有人側卧瀝胆入耳須臾汁從下耳出初時益聾十日乃瘥矣後世羣方祖此多用之

弘景曰其胆纔死便消不易得也

方 多年老聾 衛生家寶方勝金透關散用活鼠一枚熱湯浸死破喉取胆真紅色者是也用川烏頭一箇炮去皮真華陰細辛二錢胆礬半錢為末以胆和勻焙乾研細入射香半字管吹入耳中口含茶水日二次十日見效〇聖惠方臘月收鼠胆二枚熊胆一分水和滴少許入耳日二 青盲 鼠胆鯉魚胆各二枚和勻滴之立效 聖惠

鳴臯曰李氏所引不過術家無稽之言而主治不錄近醫用治慢驚頗有效者余取視之極臊臭火焙時其氣尤不可近因思汪昂云惟極香極臭之物可以通竅祛邪如射香極香能通竅絡壅閉此物極臭亦能通竅絡故治慢驚也又係腎丸自能補腎補腎通竅以定風甚合治慢驚之法○焙熟研用毒死者不可用

鼎曰目燒研點目不如生刺取瀝點目

時珍曰丨丨入足厥陰肝經

王子接曰婦人病溫後毒移男子為陰易男子必手足拘攣顛厥陰之証南陽以韭

慢驚要藥

鼠印 即外腎中丸也 佩之令人悅媚 時珍○時珍曰岣嶁神書云丨丨合歡註云雄鼠外腎丸上有文似印兩腎相對有符篆朱文九折者尤佳以十一月十二月或五月五日七月七日正月朔旦子時面北向子位割取陰乾佩于青囊中男左女右繫臂上人見之無不歡悅所求如心

鼠目 明目 弘景○附後治目澀好眠取丨丨燒研和魚膏點目皆

治骨蒸

脊骨 治齒折多年不生者研末日揩之甚效 藏器○雷公炮炙論云長齒生牙賴雄鼠之骨末

牙 牙痛 老鼠去皮以硇沙擦上俟肉爛化盡取骨焙末入蟾酥二分樟腦一錢每用少許點牙根上立止 孫氏集效

鼠糞 弘景曰兩頭尖者是 雄丨丨牝丨丨不用 微寒無毒 時珍曰小毒誤食令人目

根為君滑利通陽疾于下行再以丨丨之陰靈引入至陰之處以通陰舒陽〔鳴岑曰〕按李王二公之言是丨丨專為厥陰肝經引經藥也但陰易由交接後毒由腎入南陽用丨丨是又為腎經引經矣似不輕為肝經也再觀後方用塗瘡毒而能散癰腫服之而散吹奶及乳癰南陽丨丨湯云服之得粘汗為效則丨丨之性又能宣通也〔王子接曰〕丨丨亦治膀胱水結〔皋曰〕丨丨入足厥陰少陰而以通為用嘗見友人以丨丨為君佐以樟腦乳香末藥水劑研末填臍中上蓋槐木薄皮以艾炷如彈丸大炙之治腹中痞塊血塊及經脉不通腹中結痛頗有效驗則丨丨宣通之力可知也普濟用塗臍中治大小便秘古方已有之矣

治小兒大腹痞疾葱豉同煎服治時行勞復別錄黃疸成○仲景及古今名方多用之

治痼疾明目日華治男子陰易腹痛通女子月經下死胎研末服治吹奶乳癰鮮馬肝毒塗鼠瘻瘡燒存性傅折傷疔腫諸瘡時珍

發明〔時珍曰〕丨丨入足厥陰經故所治皆厥陰血分之病上列諸症是矣

方 傷寒勞復 外臺用雄丨丨二十枚豉五合水二升煮一升頓服○活人書丨丨豉湯治勞復發熱用丨丨二七枚梔子二十四枚只殼三枚為粗末水一盞葱白二寸豉三十粒煎一盞分三服

男子陰易 及勞復瘕丨丨湯用丨丨兩頭尖者十四枚韭根一大把水二盞煎一盞溫服得粘汗為效未汗再服南陽活人書

大小便秘 雄丨丨末傅臍中立效普濟

室女

鼠

經閉 牡||一兩炒研空心溫酒服二錢 千金

子死腹中 雄||二七枚水三升煮一升取汁作粥食胎即下

產後陰脫 以溫水洗軟用雄||燒烟熏之即入 熊氏

婦人吹奶 ||七枚紅棗七枚去核包||燒存性入射香少許溫酒服 集要

乳癰初起 雄||七枚研末溫酒服取汗即散 壽域

乳癰已成 用新濕||黃連大黃各等分為末以黍米粥清和塗四圍即散 姚僧坦

鼠瘻潰壞 新||一百粒收瓷器中五六十日研碎即傳之效 千金

疔瘡 ||亂髮等分燒灰刺瘡頭納入大良 普濟

卒擊吐血 胸腹刺痛||燒末水服方寸匕不省者灌之 肘後

折傷瘀血 傷損筋骨疼痛||燒末猪脂調傅之急累不過半日痛止 梅師

小兒鹽齁 ||燒研水酒空心服之一歲一錢

小兒窩瘡 ||研香油調塗之

中馬肝毒 ||三七枚研水飲 梅師

猫咬成

五十八

瘡||燒末油調傅曾經效驗 壽域

毒蛇傷野||水和塗 邵真人

小兒白禿||瓦煅存性同輕粉麻油調塗 百一

狂犬咬傷||二升燒末傅之 梅師

時珍曰入手足少陰心腎厥陰肝經

鶴皐曰氣不歸元之欬逆用一一之重鎮入腎攝氣歸元而欬逆止故又治腎不納氣之嗽當與補腎藥同進女子漏下崩帶男子遺洩下焦之病惟重鎮之品可以沈入下焦而濇以止脫與用赤石脂同例其止瀉痢膿血病久腸虛者可用新病者不可用也吐血衄血不止以其氣血上逆也惟重鎮之法可以止之

鱗介魚虫部

龍

集解 別錄曰生晋地川谷及太山巖水岸上穴中 弘景曰今多出梁益巴中白地錦紋舐之著舌者良皆是龍蛻非實死也 普曰色青白者良 恭曰今出晋地五色具者良 宗奭曰曾有崖中崩出龍骨一副皮體頭角皆備不知是蛻是斃

龍骨 甘平無毒 別錄曰微寒 治心腹鬼疰精物老魅欬此氣不歸元之欬逆逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇 本經 心腹煩滿恚怒氣伏在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕四肢枯萎夜臥自驚汗出止汗縮小便溺血養精

神宂魂魄安五臟白龍骨主多寐洩精（別錄）逐邪氣安心神夜夢鬼交虛而多夢止冷痢下膿血女子崩帶（甄權）主懷孕漏胎止腸風（入大腸）下血（重鎮法）鼻洪吐血止瀉痢渴疾澀腸胃（日華）益腎鎮驚止陰瘧收濕氣脫肛生肌斂瘡（時珍）

○〔權曰〕忌魚及鐵器〔之才曰〕得人參牛黃良畏石膏〔時珍曰〕許洪云牛黃惡丨丨而丨丨得牛黃更良又龍喜食燕肉畏鐵故食燕肉者忌渡水祈雨者用燕鎮水患者用鐵〔斆曰〕用丨丨搗粉絹袋盛之用燕子一隻去腸肚安袋于內懸井面上一宿取出研細入補腎藥其效如神〔時珍曰〕近世方法但煅赤為粉亦有生用者如急用酒煮焙乾或云須水飛過晒乾每斤用黑豆一斗蒸一伏時用否則著人腸胃晚年作熱也

發明 時珍曰其氣收陽中之陰入手足少陰厥陰經斅曰氣入丈夫腎臟中故益腎藥宜用之時珍曰澀可去脫故成氏云||能收歛浮越之正氣固大腸而鎮驚又主帶脉為病

方 健忘||遠志等分九服 千金 勞心夢洩 方同上蜜丸朱砂為衣蓮子湯下 遺尿||桒螵蛸等分蜜丸塩湯下 梅師 老瘧||方寸匕先發一時酒一升心絨半煮三沸及熱服盡 傷寒毒痢 同之消書 傷寒八九日至十餘日大煩渴作熱三焦溫覆取汗效 肘後有瘡蟲下痢或張口吐舌目爛口舌生瘡不識人用此除熱毒止痢||半斤水一斗煮四升沈之井底冷服五合漸漸進之 外臺 熱病下痢欲死者||半斤研水一斗煮至五升候極冷稍飲得汗愈 肘後 吐衄九竅出血並用||末吹入鼻中昔有人衄血斗餘用此即止 三因方 小兒臍瘡||粉撲之 聖惠 陰汗||牡蠣粉撲之 醫宗三法

龍 蚺蛇 乖

[時珍曰]蚺蛇胆主厥陰太陰之病肝脾

龍齒 澀涼[當之曰]大寒 主驚癇癲狂心下結氣不能喘息[本經] 小兒身熱不可近大人骨間寒熱殺蠱毒[別錄] 餘同龍骨[時珍曰]修治同龍骨或云以酥炙

發明[時珍曰]龍者東方之神故骨與角齒皆主肝病許叔微曰肝藏魂能變化故魂遊不定治之以一一即此義也

蚺蛇音髯 埋頭 又名南蛇[綱目] 埋頭蛇[時珍曰]身大而行徐以行不舉首者為真故名

集解[頌曰]一一弘景言出晉安蘇恭言出桂廣以南今嶺南諸郡皆有之弘景曰大者二三圍在地行不舉頭者是真舉頭者非真也[保昇曰]若蛇而粗短[藏器曰]酉陽雜俎云一一長十丈嘗吞鹿鹿消盡乃遶樹則腹中之骨穿鱗而出[時珍曰]劉恂錄異記云一一大者五六丈圍四五尺小者

希雅曰今人受杖時用此嗡化可得不死其功能獲心止痛使惡血下上薄心有神力也[襄按]如緣氏言是亦活血行血之品也

三四丈身有斑紋如故錦又顧岕海槎錄云||胆以小者為佳王濟手記云横州山中多||能食麞鹿肉極腴美皮可冒鼓作樂器

膽 甘苦寒有小毒治目腫痛心腹䘌痛下部䘌瘡 別錄 小兒八癎 甄權 殺五疳水化灌鼻中除小兒腦熱疳瘡䘌漏灌下部治小兒疳痢同麝香傅齒疳宣露 孟詵 破血止血痢蟲蠱下血 藏器 明目去翳主大風 時珍 ○[段成式]曰其胆上旬近頭中旬近心下旬近尾[弘景]曰真胆狹長通黑皮膜極薄舐之苦甜[恭曰]剔取粟許着淨水中浮游水上回旋行走者為真其沉者非真也勿多着多着亦沉散[詵]曰人多以猪胆虎胆偽之雖水中走亦遲耳

〔希雍曰〕同血竭乳香末藥狗頭骨灰䗪虫天靈蓋象牙末麻皮灰丹砂作丸臨杖服一丸護心止痛多杖無害

發明〔時珍曰〕｜｜稟己土之氣其｜受甲乙風木故其味苦中有甘所主皆厥陰太陰之病能明目涼血除疳殺虫〔慎微曰〕顧含養嫂失明須用｜｜｜含求得用之遂復明也

方　**小兒急疳瘡**　水調｜｜｜灌之　聖惠　**小兒疳痢**　羸瘦多睡坐則閉目食不下用｜｜｜豆大二枚煎通草汁研化隨意飲之并塗五心下部　楊氏產乳　**痔痛**　｜｜｜香油調塗　醫方摘要　**牙齦宣露**　出膿血｜｜｜三錢枯礬一錢杏仁四十七粒研勻以布揩齦　嗽盡血摻之　聖惠

白花蛇

又名蘄蛇　綱目　褰鼻蛇〔宗奭曰〕蛇鼻向下獨此鼻向上

集解〔頌曰〕黔中及蘄州鄧州皆有之其文作方勝喜螫人足黔人有被螫者立斷之續以木腳此蛇入人室屋中作爛瓜氣者不可嚮之須速辟除之〔時珍曰〕｜｜｜湖蜀皆有今惟蘄蛇擅名然

希雍曰｜｜｜性走竄有毒癩風疥癬頑痹等證誠為要藥然而中風口面喎斜半身不遂定緣陰虛血少內熱而發與得之風濕者殊科非所宜也

蘄地亦不多得市肆所賣官司所取皆自興國州山中來其蛇龍頭虎口黑質白花脇有二十四方勝文腹有念珠斑口有四長牙尾有佛指甲長一二分腸形如連珠多在石南藤上食其花葉人以此尋獲之先撒土一把則蟠而不動以叉取之去腸物炕乾出蘄地者雖乾枯而眼光不陷他處則否元　長慶集云巴蛇凡百種惟｜｜｜人不常見毒人則毛髮豎立飲于溪澗則泥沙盡沸巴人亦用禁術制之熏以雄黃烟則腦裂也今蘄蛇亦不甚毒則黔蜀之蛇雖有白花恐性類不同故入藥獨取蘄產者也

甘鹹溫有毒治中風濕痹不仁筋脉拘急口面喎邪半身不遂骨節疼痛脚弱不能久立暴風瘙痒大風慎用**疥癬**開寶○頌曰｜｜｜治風速于諸蛇黔人治疥癬遍體諸藥不効者生取此蛇切斷以磚燒紅

鳴皋曰——稟毒烈之性能通經絡而驅風濕無處不到故能攻楊梅毒瘡治痘瘡黑陷

沃醋令氣蒸罨蛇于上以盆覆一夜如此三次去骨取肉芼以五味令爛頓食之瞑睡一晝夜乃醒瘡庀隨皮便退其疾如此

治肺風鼻塞浮風癮疹身上白癜風癧瘍斑點甄權**通治諸風破傷風小兒風熱慢急驚風搐搦**此風藥宜慎用**瘰癧漏疾楊梅瘡痘瘡倒陷**時珍○頌曰頭尾各一尺有大毒不可用只用中段乾者以酒浸去皮骨其骨須遠弃之傷人毒與生者同宗奭曰凡用去頭尾換酒浸三日去盡骨此物甚毒不可不防時珍曰黔蛇長大故頭尾可去一尺蘄蛇小只可各去三寸亦有单用頭尾者大蛇一條只得淨肉四兩而已久留易蛀取肉密封藏之十年亦不壞也又曰得酒良

發明斆曰蛇性竄能引藥至於有風疾處故能治風時珍曰風善行數變蛇亦善行數蜕而花蛇食石南所以能透骨搜風截驚定搐為風痺驚搐癩癬惡瘡要藥取其內走臟腑外徹皮膚無處不到也凡

服蛇酒藥
切忌見風

方　驅風膏　治風癱瘓風遍身疥癬｜｜｜四兩酒炙天麻七錢半薄荷荊芥各二錢半為末好酒三升蜜四兩熬膏每服一盞溫湯下日三急于暖處取汗　醫壘元戎

白花蛇酒　治諸風痺無新久及惡瘡疥癩等症｜｜｜一條洗淨去頭尾酒浸取淨肉一兩去骨刺入全蝎當歸防風羌活各一兩獨活白芷天麻赤芍甘草升麻各五錢剉碎以絹袋盛用糯米二斗如常造酒以袋置缸中待成取酒同袋密封煮熟寘陰地七日出毒每飲数杯常令相續　瀕湖

又一方　治諸風癘癬用｜｜｜一條如法取淨肉絹袋盛之蒸糯米一斗安麴于缸底寘蛇于麴上以飯安蛇上密蓋三七日取酒以蛇晒乾為末每服三五分酒下仍以濁酒及糟作餅食之佳　瑞竹堂

又一方　｜｜｜一條取淨肉四兩羌活二兩歸身二兩天麻二兩秦艽二兩五加皮二兩防風一兩剉勻絹袋盛入金華酒

罈內懸浸水煮一日埋陰地數日每飲一二杯渣日
乾研酒丸桐子大每服三五十丸酒下忌見風犯欲
及羊魚鵝麪發 治營衛不和陽少陰多手足
風之物 瀕湖 又一方 舉動不快｜｜｜淨肉一兩
天麻狗脊各二兩為末好酒一升浸之隔湯煮成 治
膏入生薑汁半杯熬勻每服半匙神效 備急
癩 ｜｜｜五寸取肉炙乾雄黃一兩飛細白蜜一斤
杏仁一斤研爛同鍊為膏每服一錢酒下日三須
先服通天再造散下去 三日 偏正頭風 時作時止｜｜｜
虫物用此除根 取肉南星漿煮軟
切炒各一兩石膏荊芥各二兩地骨皮二
錢半為末每服一錢茶下日三 聖濟 潔古白花
蛇散 治大風病｜｜｜烏梢蛇各取肉二錢酒炙雄
黃二錢大黃五錢為末每服二錢白湯下三日
一 治楊梅瘡 先服發散藥後服此用｜｜｜肉酒炙
服 龜板酥炙穿山甲炙蜂房炙頭粉朱砂
各一錢為末紅棗肉為丸梧子大每服七丸冷茶下
日三忌魚肉服盡則愈後服土茯苓藥調之 近方

托痘花蛇散 治痘黑陷｜｜｜連骨炙勿令焦三錢大丁香七枚為末每服五分以水和淡酒下神效移時身熱即紅活也 王氏手集

三蛇愈風丹 治癘風手足麻木眉毛脫落皮膚瘙痒及一切風瘡｜｜｜烏梢蛇土蝮蛇各一條並酒浸取肉焙乾苦參末四兩為末以皂莢一斤切酒浸去酒以水一椀挼取濃汁石器熬膏和丸梧子大每服五六十丸煎通聖散下以粥飯壓之日三服三日一浴取汗避風○治例

無蝮蛇有大風子肉二兩

烏蛇

一名烏梢蛇 綱目 黑花蛇 綱目

集解 〔志曰〕｜｜生商洛山背有三稜色黑如漆性善不噬物〔頌曰〕蘄州黃州山中有之乾寧記云此蛇不食生命不害人多在蘆叢中其身烏而光頭圓尾尖眼有赤光至枯死眼不陷如活者稱之重七錢至一兩者為上十兩至一鎰者為中粗大者力彌減也作偽者用他蛇熏黑亦能亂真但

一眼不光耳〔宗奭曰〕||脊高世稱劒脊烏梢尾細
長能穿小銅錢百文者佳有長丈餘者蛇類中惟
此入藥最多〔斅曰〕蘄州||頭上有逆毛二寸一
路可長半分許頭尾相對入藥如神只重一兩以
下腹下白帶子長一寸者雄也宜入藥用去頭及
皮鱗帶子切斷苦酒浸一宿柳木炭炙乾再以酥
炙用或用酒煮乾用亦可〔時珍曰〕||有二種劍
脊細尾者為上一種長大無劍脊而尾稍粗者名
風梢蛇亦可治
風而力不及

甘平無毒〔權曰〕有小毒

治諸風頑痹皮膚不仁風瘙癮疹疥癬開寶熱毒風皮肌生癩眉毛脫落瘑疥等瘡甄權功與白花蛇同而性善無毒時珍

方 大風 朝野僉載云商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有||墮酒罌中病人不

鳴皋曰此法大妙凡用毒藥俱可倣此可稱無弊用其真亦佳

知飲酒漸瘥○治大風用烏梢蛇三條取肉焙末蒸餅丸以喂烏鴉待盡烹鴉取肉焙末酒服一錢不過三五鴉可愈

膏 治耳聾綿裹豆許塞之神效 時珍

蝮蛇 又名反鼻蛇

集解 〔弘景曰〕｜｜黄黑色如土白斑黄頷尖口毒最烈虺形短而扁毒與蝮同〔恭曰〕｜｜作地色鼻反口長身短頭尾相似山南漢沔間多有之一名虺無二種也〔頌曰〕｜｜形不長頭扁口尖頭斑身赤紋斑亦有青黑色者人犯之頭足貼着東間諸山甚多草行不可不慎〔藏器曰〕｜｜錦紋亦有與地同色者着足斷足着手斷手不爾合身糜爛七八月毒盛時嚙樹以洩其毒樹便死又吐涎沫於草木上着人成瘡名曰蛇漠瘡卒難治療方與蛇螫同〔時珍曰〕蝮與虺陶氏言是二種蘇恭言

是一種爾雅云蝘蜓身博三寸首大如擘是以蝘
蜓爲一種也郭璞云一一惟南方有之一名反鼻
細頸大頭焦尾鼻上有針錦紋如綬紋間有毛如
豬鬣大者長七八尺蜓則所在有之俗呼土蜓與
地同色顏師古曰以俗名證之郭說爲是蓋蝘長
大蜓短小自不難辨陶說爲是柳子厚一一文云
目兼蜂蠆色混泥塗其頸蹙惡其腹次且褰鼻鉤
牙穴出榛居頗盡其狀也抱朴子云一一中人甚
急即時以刀割去瘡肉投於地其
沸如火炙須臾焦盡人乃得活

甘溫有毒釀酒療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蠱毒

別錄

五痔腸風瀉血 甄權 諸惡風惡瘡瘰癧皮膚頑痹半
身枯死 藏器 ○頌曰一一囓人急治之用細辛雄黃
等分爲末內瘡中日三四易之又以瓜蔞根
桂末着管中密塞勿令走氣
佩之中毒急敷之緩則不救

發明〔時珍曰〕癩疾感天地肅殺之氣而成惡疾也｜稟天地陰陽毒烈之氣而生惡物也以毒物攻毒病從其類也藏器曰取活蛇一條着器中投以醇酒一斗封定埋馬溺處一年取開蛇已消盡酒味猶存有患諸證者不過服一升當覺身習〻而愈然有小毒不可頓服又曰生癩者取一條或他蛇亦可燒熱坐上當有赤虫如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中

方　白癩｜｜一條勿令傷酒一斗漬之糠火煨稍熟取蛇一寸和臘猪脂搗傅　肘後

膽　治䘌瘡別録殺下部虫甄權治諸漏研傅之若作痛杵杏仁摩之時珍

脂　綿裹塞耳聾時珍

它蛻一名龍退綱目龍子衣本經龍子皮別録弓衣本經蛇符別録蛇筋吳普蛇皮甄權

蝮蛇　蛇蛻

集解〔弘景曰〕草中少見虺蝮蛻惟有長者多是赤鏈黃頷輩其皮不可辨但取石上完全者佳〔頌曰〕蛇蛻無時但着不淨即蛻大飽亦蛻〔斅曰〕凡使勿用青黃蒼色者只用白色如銀者醋浸炙乾用時珍曰今人用｜｜先以皂莢水洗淨或酒醋蜜各浸炙黃用或燒存性或鹽泥固煅各隨本方

鹹甘平無毒火熬之良〔權曰〕有毒 治小兒百二十種驚癇蛇癇癲疾瘈瘲弄舌搖頭寒熱腸痔蠱毒本經 大人五邪言語僻越止嘔逆明目燒之療諸惡瘡別錄 治喉痹鬼魅甄權 炙用辟惡止小兒驚悸客熱煎汁傅癧瘍白癜風催生日華 安胎孟詵 止瘧〔藏器曰〕正發日取塞耳又以手持少許并服鹽醋汁令吐 辟惡去風殺虫燒末服治婦人吹奶大人喉風退

目翳消木舌傳小兒重舌重齶唇緊解顱面瘡月蝕天泡瘡大人丁腫漏瘡腫毒煮湯洗諸悪虫傷時珍○畏磁石及酒或曰孕婦忌用

發明 時珍曰入藥有四義一能辟悪取其變化性靈也故治邪僻鬼魅蠱毒諸疾二能去風取其屬性竄也故治驚癇癜駁喉舌諸疾三能殺虫故治悪瘡痔漏癬疥諸疾用其毒也四有蛻義故治膜翳胎産皮膚諸疾會意從類也

方 小兒喉痺燒末乳汁服一錢 心鏡 纏喉風氣閉者||灸當歸等分為末酒服一錢取吐○一方用||燒烟筒吸入即破○又方||裹白梅含之嚥汁 小兒木舌及重舌乳服末少許 千金 小兒口緊不能開合飲食言語即死||燒末拭淨傅之 千

金

小兒頭瘡 面瘡月蝕並用｜｜燒末臘猪脂和傅 肘後

痘後目翳 齊東埜語云小兒痘後目翳｜｜一條焙天花粉五錢為末以羊肝破開夾藥縛定米泔煮食予女及甥皆用此得效真奇方也

卒生目翳 ｜｜一條洗剪碎麪和餅炙焦黑為末每食後服一錢 聖惠

橫生逆產 衣胞不下千金方用｜｜炒焦為末面向東酒服一刀圭即順○十全博救方用｜｜盐泥固濟煆二錢榆白皮湯下○濟生秘覽治逆生須臾不救｜｜一具蟬退十四箇頭髮一握並燒存性分二服酒下仍以小針刺兒足心三七下擦盐少許即生也

乳吹 ｜｜一尺七寸燒末酒下 產乳

腫毒無頭 ｜｜灰猪脂和塗 肘後

石癰無膿 堅硬如石｜｜貼之經宿即愈 總錄

諸漏有虫 ｜｜灰水和傅即虫出 千金

丁腫魚臍 外臺用｜｜雞子大水煮三四沸服汁立瘥○直指治魚臍瘡出水四畔浮漿｜｜灰存性雞子清和搽

惡瘡似癩

十年不瘥全——一條燒灰豬脂和傅　癜風白駮——仍以一條燒存性酒服　見千金方

耳忽大痛如有虫在內奔走或血水流出或乾痛不可忍者——燒存性灰醋調搽　聖惠

研末吹之立愈經驗秘方也　楊拱醫方摘要

鯉魚　甘平〔宗奭曰〕素問言魚熱中脉訣言熱則生風食之多能發風動熱〔時珍曰〕朱丹溪言諸魚皆動風動火不獨鯉也日華曰涼非也　煮食治欬逆上氣黃疸治水腫脚氣別録　治懷妊身腫及胎氣不安日華　煮食下水氣利小便時珍　作膾去冷氣痃癖氣塊結在心腹藏器　燒末能發汗定欬嗽下乳汁消腫米飲調服治大人小兒暴痢用童便浸煨止反胃及惡風入腹時珍

詵曰｜｜脊上兩筋及黑血有毒溪澗中者毒在腦俱不可食凡炙｜｜烟入目損目光三日内必驗也天行病後下痢及宿癥俱不可食服天門冬咮沙人不可食不可合葵菜犬肉食

發明 時珍曰｜｜陰中之陽其功長於利小便故能消腫脹黄疸脚氣喘嗽濕熱之病作膾則性温故能去症結冷氣之病燒之則從火化故能發風寒平肺通乳解腸胃及腫毒之邪也劉河間云鯉之治水鷲之利水因其氣相感也

方 水腫 范汪方用大｜｜醋三升煮乾食一日一一作○外臺用大｜｜一箇赤小豆一升煮熟食飲汁一一頓食盡當下利即愈甚良 妊娠水腫方同上 水腫脹滿｜｜赤尾一斤一箇破開不見水及鹽入生礬末五錢於腹内紙包外以黄泥包煨熟食〻頭者上消食身尾者下消一日食盡屢試屢效 醫方摘要 妊娠感寒｜｜燒末酒服方寸匕令汗出 秘録 胎

動不安 婦人數傷胎下血｜｜一箇阿膠一兩炒糯米二合入葱橘皮鹽各少許煮食五七日效

太平聖惠方

惡風入腹 久腫及女人産後風入産戶內如馬鞭噓吸短氣咳嗽者｜｜大者尿浸一宿文火炙熟去皮空心頓食忌鹽醋 外臺

反胃 ｜｜童便浸一夜炮焦研末同米煮粥食 壽域神書

膽 塗小兒熱腫點眼治赤腫 甄權 滴耳治聾 藏器

方 目翳 大鯉魚｜滴銅鏡上陰乾刮下點少許 總錄

鯽魚 又名鮒魚 〔說曰〕寬大者是｜｜狹小者是鰤

甘溫止下痢治腸痔 保昇○夏月熱痢有益冬月不宜 生擣塗惡核腫毒不散同赤小豆擣塗丹毒燒灰和醬汁塗諸瘡

十年不瘥者以猪脂煎灰服治腸癰蘇恭合小豆煮汁

〔寫本曰醸礬一法亦治水腫哮喘〕

服消水腫炙油塗婦人陰瘡殺虫止痛釀白礬燒研

飲服治腸風血痢時珍

〔鼎曰〕和蒜食少熱同沙糖食生疳虫同芥菜食成腫

疾同猪肝雞雉鹿肉食生癰疽同麥門冬食害人

發明〔震亨曰〕諸魚屬火獨||屬土有

調胃實腸之功若多食亦能動火

方　水腫||三尾去腸以商陸赤小豆等分填

滿煮熟去魚食豆小便利即愈肘後　血

崩||一箇長五寸者去腸入血竭乳香

在内燒存性末服三錢酒調下搞玄　消渴||去腸

留鱗茶葉填滿煨熟食之心統　腸風大||去腸留鱗入五倍子

末填滿泥固煅存性為末酒

服一錢百一　反胃吐食大||去腸留鱗綠礬末填滿泥

固煅存性研末每米飲服一錢日

鱗介魚虫

陳藏器註鯖魚云似鯉形長身圓肉厚而鬆狀類青魚

二

本事 浸淫毒瘡 凡卒得毒氣攻身或腫痛或赤痒上下周匝煩毒欲死此浸淫毒瘡也生||切片和鹽搗貼頻易之 聖惠方

青魚 時珍曰青亦作鯖大者名鯇魚

集解 頌曰||生江湖間南方多北地時或有之似鯇而背正青色其頭中枕骨蒸令氣通日乾狀如琥珀荊人煑拍作酒器梳篦甚佳

膽 臘月收取陰乾 苦寒點暗目塗熱瘡 開寶 消赤目腫痛吐喉痺痰涎療惡瘡 時珍

發明 時珍曰東方青色入通肝膽肝膽開竅於目用||膽以治目疾蓋取此義其治喉痺骨鯁則取涌洩係乎酸苦之義也

青魚 鱧魚

七十

方

乳蛾喉痺｜｜｜含嚥○萬氏用胆礬入胆中陰乾點之○一方用朴消代胆礬

赤目障翳｜｜｜點之○一方加黃連海螵蛸等分一切障翳魚胆丸用｜｜｜鯉魚胆青羊胆牛胆各半兩熊胆二錢半射香少許石決明一兩為末糊丸梧子大每空心茶下十九龍木論

鱧魚 又名蠡魚本經黑鱧圖經玄鱧埤雅烏鱧綱目鮦魚本經文魚俗名烏魚七星魚

集解 弘景曰言是公蠣蛇所化亦有相生者性至難死猶有蛇性也時珍曰形長體圓頭尾相等細鱗玄色有斑點花紋頗類蝮蛇有舌有齒背腹有鬣連尾〻無歧狀可憎氣息腥惡首戴七星夜朝北斗道家指為水厭齊錄所忌

甘寒無毒 源曰有小毒無益不宜食 療五痔治濕痺面目浮腫下

大水（本經〔弘景曰〕合赤小豆煮食治腫滿甚效）下大小便壅氣作膾治脚氣風氣（孟詵）主妊娠有水氣（蘇頌○〔別錄曰〕有瘡者不可食令人瘢白〔宗奭曰〕能發痼疾治病亦取其一端）

方 十種水氣（垂死｜｜一斤重者煮汁和冬瓜葱白作羹食 心鏡）下一切氣（孟詵曰大｜｜一頭開肚入胡椒末半兩蒜三頭縫合同赤小豆一升煮熟下蘿蔔三五顆葱一握俱切碎煮熟空腹食之至飽并飲汁至夜洩惡氣無限五日更一作）一切風瘡（疥癩年久不愈者不過二三服必愈｜｜一箇去腸肚以蒼耳葉塡滿外以蒼耳安鍋底置魚於上少少着水慢火煨熟淡食功效甚大 醫林集要）浴兒稀痘（除夕黃昏時取大｜｜一箇小者二三箇煮湯浴兒遍身都到不可嫌腥洗去此方極神驗如不信洗時留一手或留一足出痘時未洗處必多 醫方摘要）

赤小豆合滿草煮名脫氣丸

鱧魚 鯇魚

胆 甘平〔日華曰〕諸魚胆皆苦獨此胆甘可食為異臘月収取陰乾 治喉痺將死者點入少許即瘥病深者水調灌之 靈苑方

鱖魚 音貴 又名鯚魚 音罽 石桂魚 開寶 水豚

集解〔時珍曰〕｜｜扁形濶腹大口細鱗有黑斑采斑色明者為雄稍晦者為雌皆有鬐鬣刺人厚皮緊肉肉中無細刺夏月居石穴冬月偎泥魚之沈下者也小者味佳至三五斤者則不美

甘平 治腹内惡血去腹内小虫 開寶 治腸風瀉血 日華 補虚勞益脾胃 孟詵

發明〔時珍曰〕醫説曰一女子年十八病癆瘵累年偶食｜｜羹遂愈觀此正與補勞殺虫之説相符

鱓魚 音善 又名黄䱉〔時珍曰〕蛇變者名蛇鱓害人以缸貯畜數百頭夜以灯照之蛇化者項下有白

鳴皋曰余夏月友人邀飲食｜｜歸而吐瀉交作徹夜德甚二日後始愈同食者三人一人與余同病一人無恙想必所食較少或脾胃較强也余以前常食此獨中此一次所謂蛇變者歟

點通身浮水上有毒害人

甘大溫治濕痹藏器補五臟逐風邪除濕風惡氣孟詵專

貼一切冷漏痔漏臁瘡引蟲時珍○孫真人曰黑者有毒弘景曰時行病後食之多復宗奭曰動風多食令人霍亂時珍曰多食發諸瘡不可合犬肉食

方

臁瘡蛀爛｜｜數條打死香油抹腹纏瘡上紮定頃則痒不可忍然後取下看腹有針眼皆出也未盡更作後以人脛骨灰油調搽奇效方

尾血塗癬及瘻藏器療口眼喎斜和少射香左喎塗右右喎塗左正即洗去

滴耳治耳痛滴鼻治鼻衄點目治疹後生翳同蒜汁墨汁塗赤疵又塗赤遊風時珍

〔昂〕曰千金方鱉血鴿冠血和伏龍肝並治口喎

發明〔時珍曰鱓善穿穴無足而竄與蛇同性故能走經脈療十二風邪及口喎耳目諸竅之病風中血脈則口眼喎邪用血主之從其類也

頭 同蛇頭地龍頭燒灰酒服治小腸癰有效 集成

鰻鱺魚 又名白鱓綱目蛇魚同上乾者名風鰻

甘平有毒治五痔瘡瘻殺諸虫〔詵曰〕痔瘻有虫燒熏之即死諸虫燒炙為末空腹食三五度即愈 治惡瘡女人陰瘡陰蝕虫瘡治傳尸疰氣補勞損暖腰膝起陽 日華 療濕脚氣腰腎間濕風痺常如水洗煮食甚補益患諸瘡瘻癧瘍風人宜長食之 孟詵 治小兒疳勞及虫心痛 時珍 治婦人帶下及一切

風瘙如虫行 張鼎○〔吳瑞曰〕腹下有黑斑者毒甚與
銀杏同食患軟風〔機曰〕大重四五斤及
水行昂頭者不可食夷堅志曰四
目者殺人無腮背有白點不可食

發明〔頌曰〕雖有毒却能補人虛損及久勞瘵〔時珍曰〕
｜｜｜所主諸病其功專在殺虫去風耳與蛇
同類故主治近之昔有人病瘵傳死數人乃取病者
寘棺中棄於江以絕後害為漁人所得開視乃一女
子也每以｜｜｜食之遂愈因為漁人妻張鼎云燒
烟熏蚊令化為水熏氊及屋舍竹木斷蛀虫置骨於
衣箱斷諸蠹觀此則別
錄殺虫之說益可證矣

方 諸虫心痛 多吐清水冷氣上攻滿悶｜｜｜淡煮飽食三五度瘥 外臺
骨蒸勞瘦 ｜｜｜二斤酒二椀煮入鹽醋食之 聖惠方 腸風下虫 方同上

膏 治諸瘻瘡 弘景 耳中虫痛 蘇恭 曝乾微炙取油塗白

駮風即時轉色五七度便愈宗奭

骨 炙研入藥治疳痢腸風崩帶燒灰傅惡瘡燒烟熏痔瘻殺諸蟲時珍

方 一切惡瘡用鰻魚骨炙為末入膏藥中貼之經驗方

石首魚 又名黃花魚臨海志鮸音免魚拾遺乾者名鯗音想魚 亦作鮝

甘平 合蓴菜作羹開胃益氣開寶

鯗 治暴下痢及腹脹開寶

發明 時珍曰陸文量云痢疾忌油膩惟白鯗宜食此說與本草主下痢之文相合

頭中石 治石淋水磨服亦燒灰飲服開寶研末或燒

寓菴曰食黃花魚小便必作黃花魚氣可見此物走水道甚速宜乎首中石能治石淋也既走水道甚速必補腎故其鰾合故紙等藥名魚鰾丸又能煖精種子也

研水服主淋瀝小便不通煮汁服解砒霜野菌毒蠱毒 時珍

方 石淋諸淋 石首魚頭中石十四枚當歸等分為末水二升煮一升頓服立愈 外臺

烏賊魚 又名烏鰂 素問 墨魚 綱目 纜魚 日華 骨名海螵蛸

集解 頌曰丨丨丨形若革囊口在腹下八足聚生於口旁背上只有一骨厚三四分狀如小舟形輕虛而白又有兩鬚如帶甚長腹中血及膽正如墨可書字但逾年則迹滅惟存空紙耳 時珍曰丨丨丨無鱗有鬚黑皮白肉大者如蒲扇味脆美背骨名海螵蛸色白脆如通草重、有紋以指甲可刮為末

肉 益人通月經 大明 動風 吳瑞

時珍曰厥陰肝血分藥帝曰入肝腎血分帝曰通血脉袪寒濕性能燥膿收水故瘡家侍之

希雍曰——入足厥陰肝經少陰腎經厥陰為藏血之臟女子以血為主虛則漏下赤白或經汁血閉寒熱癥瘕少陰為藏精之臟主隱曲之地虛而有濕則陰蝕腫痛虛而寒客之則陰中寒腫男子腎虛則精竭無子女子肝傷則血枯無孕鹹溫入肝腎通血脉而袪寒濕則諸症除精血足令人有子也

不賓曰——善補益精氣益精固精又曰治痰瘧

子接曰得生地治血淋得乾薑治血瘕得鹿茸阿膠治崩中帶下

通血脉 袪寒濕 益肝腎 燥濕 去痰 殺虫 磨陰腫 為血枯經閉之要藥

海螵蛸 即烏鰂骨 鹹微溫 普曰冷 治女子赤白漏下經閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子 本經 驚氣入腹腹痛環臍丈夫陰中腫痛又止瘡多膿汁不燥 別錄 療血崩殺虫 日華 炙研飲服治婦人血瘕大人小兒下痢殺小虫 藏器 ○藏器曰投骨於井水虫皆死 治眼熱淚及一切浮翳研末和蜜點之久服益精有子 孟詵 主女子血枯病傷肝唾血下血治瘧消瘦研末傅小兒疳瘡痘瘡臭爛丈夫陰瘡湯火傷跌傷出血燒存性酒服治婦人水户嫁痛同雞子黄塗小兒重舌鵝口 同蒲黃末傅舌腫血出如線同

槐花末吹鼻止衄同銀朱吹鼻治喉痺同白礬吹鼻
治蝎螫疼痛同射香吹耳治聤耳出膿及耳聾時珍

〔之才曰〕惡白及白斂附子能淡鹽伏硇縮銀〔弘景曰〕炙黄用〔斆曰〕沙魚骨形相似但以上紋順者是真横者是假以魚滷浸并煮一伏時入藥

〔寫本曰〕用魚滷浸炙黄便可用矣何必如雷氏言

發明

〔時珍曰〕｜｜｜厥陰血分藥其味鹹而走血也故血枯血瘕經閉崩帶下痢疳疾厥陰本病也寒熱瘧疾聾癭少腹痛陰痛厥陰經病也目翳流淚厥陰竅病也厥陰屬肝肝主血故諸血病皆治之素問云有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脱血或醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以四烏鰂骨一藘茹為末丸以雀卵大如小豆每服五丸飲以鮑魚汁所以利腸中及傷肝也觀此則其入厥陰血分無疑矣○〔時珍曰〕

張昂云久服絕嗣無子按本經云主癥瘕無子別錄令人有子孟詵云久服益精昂說獨背戾必誤矣若云血病無多食鹹｜｜｜亦主血閉故有此說然經閉有ㄟ餘不足二症有餘者血滯不足者肝傷烏賊所主者肝傷血閉不足之症正與素問相合豈有令人絕嗣之理當以本經別錄為正

方　女子血枯 見發明

赤白目翳 聖惠治傷寒熱毒攻眼生赤白翳用｜｜｜一兩去皮為末入龍腦少許點之日三○治諸目翳｜｜｜五靈脂等分為末熟猪肝蘸食之日二

赤翳攀睛 照水丹治目翳厚者尤效及赤翳攀睛貫瞳用｜｜｜一錢辰沙半錢研細水飛以黃蠟少許化和成劑收之臨卧時火上旋丸如黍米大揉入眥中睡至天明溫水洗去未退再用一次即效 海上

血風赤眼 女人多有用｜｜｜二錢銅綠一錢研為末每用一錢熱湯泡洗 楊氏家藏

小兒疳眼流淚 ｜｜｜牡蠣等分研為丸皂子大每用一丸同猪肝煮食 經驗

臍瘡出血及膿｜｜｜臙脂｜｜｜白及為末油調塗　聖惠

鼻瘡疳䘌各一錢輕粉二字為末搽之　錢乙小兒方

小兒痰齁多年｜｜｜末米飲服一錢　葉氏摘玄

血淋｜｜｜末一錢生地汁調服○又方｜｜｜生地赤苓等分為末每服一錢柏葉車前湯下　經驗

大腸下血不拘大人小兒臟毒腸風及內痔下血日久多食易飢先用｜｜｜炙黃研末每服一錢木賊湯下三日後服臟連丸　直指

舌腫出血如線｜｜｜蒲黃等分炒為末傅之　簡便單方

卒然吐血｜｜｜末米飲下二錢　聖惠

陰囊濕痒｜｜｜蒲黃為粉撲之　醫宗

三方

腹中墨　治血刺心痛醋磨服之　藏器○炒研醋服亦可

膃肭臍音兀諾又名海狗腎

〔寫本曰〕今出關東關東人每持爲土物相〔寫本曰〕
餽遺者問之係魚類故移入魚部本草綱陳氏所言是獸恐非膃肭
目汲入獸部
〔希雍曰〕鹹溫入腎

集解〔藏器曰〕骨肭獸西番有之狀似狐而大長尾
臍似麝〔李珣曰〕臨海志膃肭出東海水中狀
若鹿形頭似狗長尾每日出即浮水面以弓矢射
取之取外腎陰乾〔頌曰〕今東海亦有之舊說似狐
今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色
有紫斑點醫家多用之異魚圖云試其臍於臘月
盂水中不凍者爲真〔斅曰〕｜｜｜多僞者真者有
一對則兩重薄皮裹丸核其皮上自有肉黃毛一
穴三莖汲之器中經年濕潤或置睡犬頭上犬忽
驚跳者爲真〔宗奭曰〕今出登萊其狀非犬非獸亦
非魚但前腳似獸而尾即魚身有短密淡青白毛
毛上有深青黑點久則亦淡腹脇下全白色皮厚
靭可以飾鞍韉似狐長尾之說今人多不識之〔時
珍曰〕唐書云骨貀獸出遼西營州一統志云｜｜
｜出女直及三佛齊國獸似狐腳如犬走如飛取
其腎漬油名｜｜｜觀此則似狐之說非無因也
又異物志豽獸出朝鮮似貍蒼黑色無前兩足能
捕鼠據此則膃肭有水陸二種陳氏所謂似狐者

裕雖曰——得水中之陽氣大溫其味與獺肝相似第其氣熱耳所主鬼氣尸疰鬼交狐魅心腹痛中惡邪氣者蓋因眞陽虛則神明不振幽暗易侵故諸邪惡纏疰爲病此藥補陽氣則陰邪自辟故能治以上諸症也鹹能入血軟堅溫能通行消散故又主宿血結塊及痃癖羸瘦也

象曰此藥血肉之品非比草木之燥烈既能補肝腎之陽亦能補肝腎之陰

鳴皋曰時珍謂——即乾魚魚之可包者故字從包可謂繁而不通矣若是則與鰲鱗介魚矣

補腎助陽爲腎氣衰竭精寒痿弱之要藥

其陸類歟

鹹熱治鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡宿血結塊痃癖羸瘦（藏器）治男子宿癥氣塊積冷勞氣腎精衰損多色成勞瘦悴（藥性）補中益腎氣暖腰膝助陽氣（日華）治五勞七傷陰痿少力腎虛背膊勞悶面黑精冷最良（海藥）○斅曰酒浸一日紙裹炙香入藥

發明 時珍曰和劑局方治諸虛損有——丸今之滋補丸藥中多用之精不足者補之以味也大抵與蓯蓉瑣陽之功相近亦可同糯米法麴釀酒服之

鮑魚 辛臭溫治墜踠折瘀血血痺在四肢不散者

魚勒鮝何異既列鮝於石首列勒鮝於勒
魚又有——不重出乎今所用之——形
圓似無頭足尾之黿有肉無骨塊然一物
名曰——不知是古人所謂——否然以
入血分補陰頗有效近代高手如葉天士
輩往往用之取其味鹹入血分而為補陰
之良品也若如時珍言即今之淡乾魚則
是雜魚果能利腸而治肝傷血枯歟故李
氏集解正誤俱不録仍俟博物君子正之

[王子接曰]入足厥陰經肝

[時珍曰]——入厥陰肝陽明胃經

[希雍曰]佐補藥行經發痘瘡

[昂曰]瘡家用以消腫潰癰排膿止痛痘疹
家用以發痘疹以能出入陰陽貫穿經絡
達於營分以破邪結也元氣虚者慎用癰
瘍已潰忌之○一婦人項下忽腫一塊漸
延至頸偶刺破出水一椀瘡久不合有道
士曰此蟻瘻也因飯中偶食蟻得之用——
——燒存性傅之立愈

女子崩中血不止 別録 煮汁治女子血枯病傷肝利腸 見海螵蛸

同麻仁葱豉煮羹通乳汁 時珍

穿山甲

又名鯪鯉 別録 龍鯉 郭璞 石鯪魚

集解 [時珍曰]——狀如鼉而小背如鯉而濶首
如鼠而無牙腹無鱗而有毛長舌尖喙尾與
身等尾鱗尖厚有三角腹内臓腑俱全而胃獨
大常吐舌誘蟻食之曽剖其胃約蟻升許也

鹹微寒有毒治五邪驚啼悲傷燒灰酒服方寸匕 別録
小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及疥癬痔漏 大明 治蟻瘻瘡
癩及諸疰疾 仲景 燒灰傅惡瘡又治山嵐瘴瘧 甄權 除痰
瘧寒熱風痺强直疼痛通經脉下乳汁消癰腫排膿

〔鴻朶曰〕瘧屬少陽胆邪伏半表半裏胆與肝為表裏｜｜｜入肝通經絡則胆亦在所不遺矣且瘧繫陰陽不通是以爭戰而為寒熱性來陰陽通斯寒熱和故｜｜｜治瘧與用威靈用例

鱗介魚蟲

血涌竅殺蟲 時珍○〔時珍曰〕或炮或燒或酥炙醋炙童便炙或油煎土炒蛤粉炒各隨本方未有生用者仍以尾甲乃力勝

發明〔弘景曰〕此物食蟻故治蟻瘻〔時珍曰〕｜｜｜入厥陰陽明經古方鮮用近世風瘧瘡科通經下乳用為要藥蓋此物穴山而居寓水而食出陰入陽能竄經絡達於病所故也劉伯温多能鄙事云油蔓滲漏刮｜｜｜裏面肉靨投入自至漏處補住又永州記云此物不可於隄岸上殺之恐血入土則隄岸滲漏觀此二說其性之走竄可知矣諺曰｜｜｜王不留婦人服之乳常流亦言其迅速也李仲南言其性專行散中病即止不可過服又德生堂經驗方云凡風濕冷痺之症因水濕所致渾身上下強直不能屈伸痛不可忍者於五積散加｜｜｜七片看病在左右手足或臂脇疼痛處即於｜｜｜身上取甲炮熟同全蝎炒十一箇葱薑同水煎入無灰酒一匙熱服取汗避風甚良

方
中風癱瘓手足不舉用｜｜｜左癱用右甲右瘓用左甲炮熟大川烏頭炮熟紅海
蛤如碁子大者各二兩為末每用半兩搗葱白汁和
成厚餅徑寸半隨左右貼足心縛定浸熱湯中待身
汗出急去藥宜密室行之避風為要半月再
行一次忌口遠色調養神效 衛生寶鑑 熱瘧不
寒｜｜｜一兩乾棗十箇同燒存性為末每
服二錢發日五更井華水下 楊氏家藏 下痢後
重裏急｜｜｜蛤粉等分同炒研酒服一錢 普濟 腸痔氣痔出膿血用｜｜｜燒存性
一兩肉豆蔻三枚為末每米飲服二錢
甚者加蝟皮灰一兩中病即止 衍義 鼠痔成瘡腫痛
用｜｜｜尾尖甲一兩炙存性鱉甲酥炙
一兩射香半錢每服一錢茶服 直指 婦人陰㿗
硬如卵狀隨病之左右五錢沙
炒焦為末酒下二錢 摘玄 乳汁不通湧泉散用｜｜｜炙
研酒下方寸匕以油梳梳
乳即通日二 單驤方 乳岩乳癰方同上 瘡腫疔毒

時珍曰龜甲補心益腎昂曰能通心益腎
故貧智○痎瘧老瘧也或經數年中有瘧
塊名瘧母
昂曰龜版益陰最能清熱
昂曰本草有鹿膠而不及龜膠然版不如
膠誠良藥也合鹿膠一陰一陽名龜鹿二
仙膠
鱗介魚虫

｜｜｜燒存性貝母等分為末酒服三
四次乃用下藥利去惡物即愈 鮑氏 瘰癧潰壞
｜燒研傅 ｜｜｜一大片以蛤粉炒蝎梢
之 集驗 耳鳴耳聾 ｜｜｜七箇射香少許為末麻油化蠟
和挺子綿裹塞 耳內疼痛 穿山甲二片夾土狗二箇
之 攝生方 同炒焦黃為末每吹一字
入耳內亦治 ｜｜｜前膊炙焦為末清
聾 普濟 眉鍊癬瘡 油和輕粉調塗 直指 腫
毒初起 ｜｜｜炮焦為末入射香少許
每服二錢半酒下 直指方
龜 又名玄衣督郵 甲名神屋 本經 敗龜板 日華 敗
將 同上
龜甲甘平有毒 甄權曰 無毒 治漏下赤白破癥瘕結治痎瘧
五痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顖不合 本經 驚恚氣心
腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲

穿山甲 龜 廿九

〔鳴皋曰〕治瘧母癥瘕積滯痢疾等症宜用上甲其性帶攻也補陰用下甲其性專于滋補也

〔希雍曰〕經云勿令中濕中濕即有毒以其性神靈能變化中濕則遂其變化之性而成癥瘕于腹中

〔又曰〕氣味俱陰入足少陰經方家多入補心藥用以心藏神借其氣以相通且得水火既濟之義實非補心之正藥也其主骨中寒熱及傷寒勞復肌體寒熱欲死痎瘧者皆陰虛而邪熱為病也此藥補腎家真陰則火氣自降而寒熱邪氣俱除益陰除熱軟堅故主漏下赤白癥瘕五痔陰蝕及小兒頭瘡也經曰邪熱不殺穀熱去故令人能食

〔又曰〕鱉甲走肝益腎以除熱龜甲通心入腎以滋陰但鱉甲無毒可多用龜甲非自死者則不虛然有毒不宜頻使孕婦不宜用病人虛而無熱者不宜用入藥須研極細不爾留滯腸胃成癥瘕

〔常曰〕惡人參

死久服益氣資智使人能食燒灰治小兒頭瘡難燥女子陰瘡別錄殼主久嗽斷瘧弘景殼炙末酒服主風腳弱蕭炳版治血麻痺日華燒灰治脫肛甄權下甲補陰主陰血不足去瘀血止血痢續筋骨治勞倦四肢無力丹溪治腰腳酸痛補心腎益大腸止久痢久瀉主產難消癰腫燒灰傅臁瘡時珍○〔之才曰〕惡沙參○龜甲鋸去四邊石上磨淨灰水泡過酥炙黃或酒炙醋炙豬脂炙或燒用

發明〔震亨曰〕敗龜版屬金水大有補陰之功而本草不言惜哉蓋龜乃至陰之物稟北方之氣而生故能補陰治血治勞也〔時珍曰〕龜鹿皆靈而有壽龜首常向腹能通任脈故取其甲以補心補腎補血皆

介賓曰龜膠功用亦同龜板而性味濃厚尤屬純陰能退孤陽陰虛勞熱陰火上炎吐血衄血肺熱咳欬消渴煩擾熱汗驚悸譫妄狂躁之要藥然性稟陰寒善消陽氣凡陽虛假熱及脾胃命門虛寒者忌之

中梓曰龜甲稟北方純陰之氣大有補水以制火之功又曰大凡滋陰降火之藥多是寒涼損脾胃惟龜甲益大腸止瀉痢使人進食真良品也

杲曰凡骨蒸勞熱揔是腎病以腎主骨也龜板入腎滋陰故治骨蒸

以養陰也鹿鼻常向尾能通督脉故取其角以補命補精補氣皆以養陽也乃物理之玄微神工之能事觀龜甲所主諸病皆屬陰虛血弱自可心解矣

方 補陰丸 丹溪方龜板酒炙熟地九蒸九晒各六兩黃柏鹽水浸知母酒炒各四兩猪脊髓和丸梧子大空心酒下百丸

瘧不止 龜板燒存性研酒服方寸匕 海上名方

胎產下痢 用龜甲一箇醋炙為末米飲服一錢日二 經驗

催生 秘錄用龜甲燒研酒服〇摘玄治產難三五日不下垂死及交骨不開用龜甲一箇酥炙婦人頭髮一握煆灰川芎當歸各一兩每服七錢水煎如人行五里再服七錢生胞死胎俱下

肉 釀酒治大風四肢拘攣癱瘓 藏器 治筋骨痛及二十年寒嗽止瀉血血痢 時珍

時珍曰｜｜色赤入心

方 十年欬嗽 用生龜三箇去腸以水五升煮取三升浸麴釀秫米四升酒成如常飲之令盡二十年嗽皆可愈 勞瘵失血 蔥椒醬煮食甚效 吳球

尿 以猪鬃刺其鼻即尿出 滴耳治聾 藏器 點舌下治大人中風不語 時珍

瑇瑁 又名玳瑁 音代昧又音毒目

集解 藏器曰｜｜生嶺南大如扇似龜甲中有文 士良曰身似龜嘴如鸚鵡 時珍曰范成大虞衡志云｜｜狀如龜黿而殼稍長背有甲十二片黑白斑文相錯而成其裙邊缺如鋸齒無足而有四鬣前長後短皆有鱗斑文如甲海人養以鹽水飼以小魚又嶺珍海槎錄云大者難得小者時時有之老者甲厚而色明小者甲薄而色暗取時倒懸以滚醋潑之則甲逐片應手落下 頌曰入藥須

希雍曰丨丨亀類也解一切熱毒其性最靈凡遇飲食有毒則必自動搖然須生者乃靈死者則不能矣人中蠱毒則昏憒悶亂九孔流血而死惟用活丨丨刺其血飲或生者磨汁服可解又能解痘毒神效

用生者今人多用雜色龜筒作器皿皆殺取之又經煮拍故生者難得

甘寒解嶺南百藥毒 藏器 破癥結消癰毒止驚癇 日華 療心風解煩熱行氣血利大小腸 士良 磨汁服解蠱毒佩之辟蠱毒 蘇頌 解痘毒鎮心神急驚客忤傷寒熱結狂言 時珍○宗奭曰入藥生用經湯火即不堪用與生熟犀角同義

發明 時珍曰丨丨解毒清熱之功同於犀角古方不用至宋時至寶丹始用之

方 解蠱毒 生磨濃汁服一盞即消 楊氏産乳

預解痘毒 遇行時服此未發可內消已發可稀少生丨丨生犀角磨汁和勻服半合日三 靈苑

痘黑陷 乃心血凝也用生丨丨生犀角同磨汁一合入猪心血少許紫草湯五匙和勻溫服 痘疹論

介賓曰肝脾腎血分藥
時珍曰厥陰肝經血分藥
昂曰瘧必兼暑邪類多陰虛之人瘧久不愈元氣虛羸邪陷中焦則結為瘧母——能益陰除熱而散結故為治瘧要藥
鳴皋曰亦治瘧後痢性近龜上甲補中帶攻
鳴皋曰味鹹故能軟堅性破瘀活血故能散結其治癥瘕堅積痞疾者軟堅之功也其治血瘕經脈不通產難症者破瘀活血之功也至於瘧邪必兼暑濕暑濕之氣乘人陰虛而中之混處氣血之中不能分解補陰之藥多滯補氣之藥不能達瘀所故用——既能補陰又能活血而散結所以為治瘧之要藥
中梓曰——能行瘀血補新血
希雍曰仲景——煎丸治瘧母之要藥得牛膝當歸佐以橘皮首烏知母麥冬治久瘧 同知母石膏麥冬貝母竹葉治溫瘧熱甚渴甚若瘧熱甚渴甚又寒甚汗多

鱉甲亦忌莧菜或服鱉甲藥犯

鱉魚 又名神守 淮南子 河伯從事 古今注 俗名團魚腳魚

鱉甲 鹹平治心腹癥瘕堅積寒熱去痞疾瘜肉陰蝕痔核惡肉 鹹能軟堅 本經 治溫瘧血瘕腰痛小兒脇下堅 肝家症 別錄 宿食癥塊痃癖冷瘕勞瘦除骨熱骨節間勞熱結實壅 以骨治骨 塞下氣婦人漏下五色下瘀血 日華 補陰補氣 震亨 除老瘧々母陰毒腹痛勞復食復斑痘煩欬小兒驚癇婦人經脈不通難產々後陰脫丈夫陰瘡石淋斂潰癰 時珍

○之才曰惡礬理 頌曰入藥以醋炙黃用 斅曰要綠色九肋重七兩者為上若治癥塊定心藥用頭醋大火煎盡三升乃去裙取骨炙乾用若治勞去熱用童便煎盡一斗二升乃去裙留骨擣粉用 時珍曰

發時指甲色黯黑狀若欲死并加桂枝有神效　得青蒿麥冬五味地黄枸杞牛膝治骨蒸勞熱甚則加銀柴胡地骨皮胡黄連

［中梓曰］龜鼈皆主養陰滌熱｜｜色青故入東方而理肝家諸症龜甲色黑故走北方而理腎經諸症

［希雍曰］孕婦忌之胃弱及嘔惡等症不宜用

［介賓曰］取活鼈大者去肉用醋煮乾炙用若煮熟骨露者不堪用

之送戒　鼈瘕

衛生寶鑑云凡｜｜以煆竈灰一斗酒五升浸一夜煮令爛如膠用更佳桑柴灰尤妙

發明［宗奭曰］經不言治勞惟藥性言治勞瘦骨蒸故虛勞用之然甚有據但不可過劑耳［時珍曰］｜｜乃厥陰肝經血分之藥肝主血也嘗思之鼈色青入肝故所主者瘧勞寒熱痃癖癥瘕驚癇經水癰腫陰瘡皆厥陰血分病也璩瑁色赤入心故所主者心風驚熱傷寒狂亂痘毒腫毒皆少陰血分之症也秦龜色黄入脾故所主者頑風濕痹身重蠱毒皆太陰血分之症也水龜色黑入腎故所主者陰虛精弱腰脚酸痿陰冷泄痢皆少陰血分之病也介蟲陰類故並主陰經血分之病從其類也

方　**老瘧勞瘧**　｜｜醋炙研末酒服方寸匕隔夜一服清早一服臨時一服無不斷者入雄黄少許更（此方治血瘕亦妙）妙　**奔豚氣痛**　上衝心腹｜｜醋炙三兩三棱煨二兩桃仁四兩湯浸研汁三升煎二升入各藥末煎良久下醋一升煎如餳以餅收之每酒服半匙　聖濟　**血瘕**　甄權曰用

丨丨琥珀大黃研末等分酒服二錢少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服也

產難丨丨燒存性研末酒服方寸匕立出　梅師

勞復食復篤病初起受勞傷食致復者欲死丨丨燒研水服　肘後

小兒癇疾丨丨炙研乳服一錢　子母錄

卒腰痛丨丨炙研酒服　肘後方

沙石淋痛丨丨醋炙研末酒服方寸匕日三石出瘥　同上

吐血不止丨丨蛤蚧各一兩同炒色黃熟地焙一兩共為末每服二錢　聖濟

斑痘煩歉小便不利者丨二兩灯心一把水一升煎六合分二服　龐安時

瘡疽不斂丨丨燒存性研摻之甚妙　李樓怪症奇方

腸癰內痛丨丨燒存性研末水服一二錢　傳信方

陰頭生瘡人不能治者丨丨燒存性研雞子白和傳　千金翼

鱉肉　甘平治熱氣濕痹腹中激熱煮食當微泄　藏器

治婦人漏下羸瘦 孟詵 治帶下腰痛血瘕 日華 補虛久食

性冷 藏頌 補陰 震亨 治久痢作丸服治虛勞痃癖脚氣 時珍

鳴泉曰 鼎一毅

口藏器曰禮記食鱉去醜謂項下有軟骨如龜形食

之令人患水病凡鱉三足者赤足者獨目者頭足不

者殺人

縮者其目四陷者腹下有王字卜字文者腹有蛇文

以雉荒

者並不可食殺人弘景曰忌莧菜同食令人生鱉瘕

林泉曰

不可合雞子食思邈曰不可合豬兔鴨食損人合芥

雞卵變

子食生惡瘡孕婦食之令子短項時珍曰三元參贊

為蛇

云||性冷發水病有冷勞氣癥瘕人不宜食生〻

編言鱉性熱戴原礼言鱉之陽聚于上甲久食令人

李九華

生發背似與性冷之說相反蓋||性本不熱食之

言薄荷

者和以椒薑熱物太多失其本性耳李九華云||

煮鱉能害人

主聚鱉

甲主散

方 骨蒸咳嗽 潮熱團魚丸用團魚一箇柴胡前胡

貝母知母杏仁各五錢同煮熟去骨

甲裙再煮食肉飲汁將藥焙末仍以骨甲裙煮汁和丸梧子大黃芪湯下三十丸日二 奇效

寒濕腳氣 團魚三箇水二斗煮一斗去魚取汁加蒼耳子蒼术尋風藤各半斤煎至七升去渣熏蒸浸洗 神效 乾坤生意

疙瘩氣塊 用大鱉一枚以蚕沙一斗桑柴灰一斗淋汁五度同煮如泥去骨再煮成膏擣丸梧子大每服十九日三 聖惠

蠏 又名螃蠏 蟹譜 郭索 揚雄方言 橫行介士 蟹譜 無腸公子 抱朴子

鹹寒有小毒治胸中邪熱結痛喎僻面腫能敗漆燒之致鼠 本經 ○[弘景曰]以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢集 解結散血愈漆瘡養筋 別錄 產後腹痛血不下者以酒食之筋骨折傷者生擣炒署之 日華 能繼絕筋骨去殼同黃擣爛微炒納

入瘡中筋即連也〔藏器〕小兒解顱不合同白及末擣塗以合為度〔宗奭〕解鱓魚毒治瘧及黃疸擣膏塗疥瘡癬瘡擣汁滴耳聾〔時珍〕ロ〔弘景曰〕未被霜云食水莨所致人中之不療獨螯獨目六足四足腹下有毛腹中有骨背有星點足斑目赤者並有毒害人冬瓜汁紫蘇汁蒜汁蘆根汁皆可解之鶚曰孕婦食之令子橫生〔宗奭曰〕此物極動風〻疾人不可食屢驗〔時珍曰〕不可同柿及荊芥食發霍亂動風木香汁可解生于陂池田港中故有毒令人吐下生沙穴中見人便走者沙狗也不可食兩螯極小如石者蚪江也不可食生溪澗石穴中小而殼堅赤者石蟹也野人食之

發明〔愼微曰〕食鱓中毒者食丨即解性相畏也沈括筆談云關中無丨収乾者懸門上辟瘧〔時珍曰〕諸丨亦無甚毒饕餮嗜者無節兼以葷膻雜之自傷腸胃以至吐利於丨何尤乎

【集曰】蟹性鹹寒足少陰腎經兼入足厥陰肝經性能散血故能治折傷而續筋骨其性銳利尤能破血而入下焦其性帶攻故治血閉墮胎尤效

方　濕熱黃疸　丨燒存性研末酒糊丸梧子大每服五十丸白湯下日二　集簡

骨節離脫　生丨搗爛以熱酒傾入連飲數椀其渣塗之半日骨內各：有聲即愈　唐瑤經驗

蟹爪　破胞墮胎　別錄　破宿血治產後血閉酒及醋湯煎服良　日華　能安胎　張鼎　墮生胎下死胎辟邪魅　時珍

方丨千金神造湯　治子死腹中并雙胎一死一生服之令死者出生者安此神方也用丨丨一升甘草二尺東流水一斗以葦薪煮至二升濾去渣入真阿膠三兩令烊頓服或分二服若困不能服者灌入即活

胎上搶心　胡洽有丨丨湯

下胎蟹爪散　治孕婦有病欲去胎用丨丨二合桂心瞿麥各一兩牛膝二兩為末空心溫酒服一錢　千金方

石蟹　生溪澗石穴中小而殼堅赤者　搗傅久疽瘡無不瘥者　藏器

[案曰]||鹹能軟堅故能祛痰消積頗近
海帶海藻同等膾煮食名雪羹能消痰積
而治肝氣

發明[時珍曰]夷堅志云一盜被生漆塗兩目不能覩
物有村叟令尋||擣碎濾汁點之則漆隨汁
出而瘡愈也用之果明如
初漆之畏蟹莫究其義

海蛇 音宅作二音 又名水母 拾遺 樗蒲魚 同上 石鏡 異苑 [時珍曰]
今訛為海折或作蜡鮓者並非

集解[藏器曰]||狀如血衉大者如床小者如斗
無眼目腹胃以蝦為目蝦動蛇沉故曰水母
目蝦[時珍曰]水母形渾然凝結其色紅紫下有物
如懸絮羣蝦附之咂其涎沫浮汎如飛為潮所擁
則蝦去而蛇不得歸人因割取之浸以石
灰礬水去其血汁其色遂白生熟皆可食

鹹溫治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷
藏器 療河魚之疾[時珍曰] 出異苑

鰕

甘温有小毒治赤白遊腫搗傳之孟詵托痘瘡下乳汁

壯陽道煮汁吐風痰搗膏傳虫疽時珍口〔弘景曰〕無鬚及腹下通黑并煮之色白者並不可食〔禹錫曰〕動風發瘡疥冷積〔源曰〕動風熱有病人勿食

方 鱉瘕類編云陳拱病鱉瘕隱〻見於皮內痛不可忍外醫洪氏曰可以鮮｜作羹食之久久痛止明年又作再如前治法而愈遂除根

補腎興陽｜米一斤蛤蚧二枚茴香蜀椒各四兩並以青鹽化酒炙炒以木香粗末一兩和勻乘熱收新瓶中密封每服一匙空心鹽酒下甚妙 宣

吐風痰用連殼｜半斤入薑醬煮汁先吃｜後吃汁以鵞翎探吐痰涎良

臁瘡生虫小｜三十箇去頭足殼同糯米飯研爛隔紗貼瘡別以紗罩之一夜鮮下掛看皆是小赤虫即以葱椒湯洗淨用舊茶篓內白竹葉隨大小剪貼一日二換待汁出盡逐日煎苦楝根湯洗之以好膏藥貼之將生

〔好古曰〕｜｜入足少陰腎經血分〔昂曰〕肝腎血分藥

化痰軟堅清熱除濕斂汗固精固大小腸

好肉勿換膏藥 生｜黃丹搗和貼
忌發物 直指 血風臁瘡之日一換、集簡

牡蠣 又名牡蛤 別錄 蠣蛤 本經 古賁 異物志 蠔
〔時珍曰〕海氣化成純雄無雌故名牡

集解 〔弘景曰〕以大者為好其生著石皆以口在上舉以腹向南視之口斜向東則是左顧但多右顧不堪用也〔頌曰〕海旁皆有而通泰及南海閩中尤多皆附石而生磈礧相連如房呼為蠣房初生止如拳石四面漸長至一二丈者嶄巖如山俗呼蠔山每一房內有肉一塊大房如馬蹄小房如人指面每潮來諸房皆開有小虫則合之以充腹海人取者皆鑿房以烈火逼之挑取其肉味美好更有益也

鹹平微寒治傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白殺邪鬼 本經 除留熱在關節營衛

昂曰貝母為使能消積結
介賓曰同白术燥脾利濕同大茴消癧腫
同熟地固精氣止遺洩

虚熱去來不定煩滿心痛氣結止汗止渴除老血瘀
泄精澀大小腸止大小便治喉痺欬嗽心脇下痞熱
别錄 粉身止盜汗同麻黄根蛇床子乾薑為粉去陰汗
藏器 治崩中止痛除風熱風瘧鬼交精出 孟詵 男子虚勞
補腎安神去煩熱小兒驚癎 李恂 去脇下堅滿瘰癧一
切瘡 好古 化痰耎堅清熱除濕止心脾氣痛痢下赤白
濁消瘕癥積塊瘿痰結核 時珍 ○之才曰貝母為使
得甘草牛膝遠志蛇床子
良惡麻黄辛夷吳茱萸 斅曰 塩水煮一伏時再煆研
粉用 時珍曰 亦有以童便浸四十九日五日一換取
出以黄泥固濟煆過用
宗奭曰 亦有生用者

希雍曰同黄柏五味地黄山茰杞子車前子沙苑蒺藜蓮須杜仲治夢遺加牛膝則兼治赤白濁　同地黄〻柏阿膠木耳炒黑香附白芍地榆川断青蒿鼈甲蒲黄止崩中下血及赤白帶　仲景方同龍骨入柴胡桂枝各湯内取其收斂浮越之陽氣固脱而鎮驚更能除胸脇中痞硬

杲曰丨丨雖為澀可去脱之劑若末服又有重鎮之義

發明 權曰病虚而多熱者宜同地黄小草用之　好古曰丨丨入足少陰為軟堅之劑以柴胡引之能去脇下硬以茶引之能消項上結核以大黄引之能消股間腫以地黄為使能益精收濇止小便腎經血分之藥也　成無已曰丨丨之鹹以消胸膈之滿以洩水氣使痞者消硬者軟也　元素曰壯水之主以制陽光故渴飲不思盖蛤蠣之屬能止渴也

方

心脾氣痛 氣實有痰者丨丨煅粉酒服二錢　丹溪心法

瘧疾寒熱 丨丨粉杜仲等分為末蜜丸梧子大每服五十丸温水下　普濟

氣虚盗汗 同上方為末酒下方寸匕　千金方

虚勞盗汗 丨丨粉麻黄根黄芪等分為末每用二錢水煎服　本事

産後盗汗 丨丨粉麥麩炒黄等分每服一錢猪肉汁調下　經驗

消渴飲水 丨丨黄泥固濟煅研末每服錢許活鯽魚湯下二三服即愈　經驗

百合變渴 傷寒傳成百合病如寒無寒如

熱無熱欲卧不卧欲行不行欲食不食口苦小便赤
得藥則吐利變成渴疾久不瘥者用丨丨炒二兩枯
楼根二兩為末每服方寸匕

病後常衂

小勞即作丨
日三米飲下　金匱玉函方　丨十分石膏
五分為末酒下方寸匕　服血藥不效者丨
亦可丸服日三　肘後

小便淋閉

丨黃柏等分為末
每服一錢小茴香
湯下　醫學集成

小便多数

丨丨五兩焼研小便三
升煎二升分服神效
乾坤
生意

夢遺便糖

丨丨粉醋丸梧子大米飲
下三十九日二　丹溪

水病囊腫

丨丨粉三兩乾薑炮一兩研末冷水調塗須臾囊熱
如火乾則再上小便利即愈一方用葱汁白麪同調
小兒不用乾薑

月水不止

丨丨粉醋和團再煅研末
以米醋調艾葉末煎膏丸
初虞世方
醋湯下四五
十丸　普濟

金瘡出血

丨丨粉傳之　肘後

瘡腫未成

用此扳
毒水調
丨丨粉塗頻換　姚氏集驗方

瘰癧

經驗用丨丨煅研四兩元參末
三兩麪糊丸梧子大每服三十

好古曰｜｜腎經血分藥杲曰亦肝腎血
分藥與牡蠣同功嗚皋曰牡蠣能滑小便
｜｜能利小便為異耳

丸酒下日三〇初虞世云瘰癧不問已破未破｜｜
四兩甘草一兩為末食後臘茶調下一錢其效如神

蛤粉時珍曰長者曰蚌圓者曰蛤大抵海中蚌蛤性
味鹹寒功能軟堅江湖蚌蛤無鹹水浸漬但能
清熱利
濕而已

鹹寒治熱痰濕痰老痰頑痰疝氣白濁帶下同香附
末薑汁調服主心痛丹溪清熱利濕化痰飲定欬嗽止
嘔逆消浮腫利小便止遺精白濁心脾疼痛化積塊
解結氣消癭核散腫毒治婦人血病油調塗湯火傷

時珍〇震亨曰燒煆或粉用不入煎劑時珍曰吳球
云凡用｜｜取紫口蛤蜊殼炭火煅研粉用熟瓜蔞
連子同擣和成
團風乾用最妙

子接曰得滑石甘草芒消治傷寒血結

發明 震亨曰｜｜能降能消能軟能燥 時珍曰 寒制
火而鹹潤下故能降馬寒散熱而鹹走血故能
消馬堅者軟之以鹹取其屬水而性潤也濕者燥之
以滲取其經火化而利小便好古曰｜｜乃腎經血
分之藥故所主
濕散腎滑之疾

方 氣虛水腫 一人患腫垂死諸醫不效或以大蒜
十枚搗如泥入｜｜丸梧子大食前
白湯下二十丸服盡小 心氣痛 真｜｜炒過佐以香
便下數桶而愈 普濟 附末等分白湯淬服
聖 遺精 潔古曰陽盛陰虛故精洩也真珠粉丸主
惠方 之｜｜煅一斤黃柏炒一斤為細末丸梧
子大每服百丸空心溫酒下日二｜｜ 雀目 ｜｜炒
味鹹能補腎黃柏苦而能降心火也 黃為末
油蠟化和丸皂子大納豬腰子 白蜆殼研
內紮定蒸熟食之 儒門事親 咳嗽不止 粉米飲調
服甚效 宋徽宗妃痰嗽面腫不寐李防禦
聖惠 嗽不得臥 治之不效當誅李技窮聞市人賣

嗽藥一文一貼色淡碧吃了得睡李市之恐藥猛先自試無害併三帖為一以進妃嗽止得卧面腫消帝悅賜萬金李求其方乃此｜肝腎二經藥｜少加青黛也淡虀水加麻油數滴調服

文蛤 又名花蛤○〔弘景曰〕大小皆有紫斑

鹹平治惡瘡蝕五痔本經 治欬逆胸痺腰痛脇急鼠瘻出血女人崩漏別錄 止煩渴利小便化痰軟堅治口鼻

疳蝕時珍○修治同蛤粉

發明〔時珍曰〕戓無已云｜｜之鹹走腎以勝水氣

方 傷寒文蛤散 仲景云病在陽當以汗解反以冷水之或灌之更益煩熱欲水不渴者此散主之｜｜五兩為末每服方寸匕沸湯下甚效 疳蝕口鼻數日欲盡｜｜燒灰以臘

猪脂和塗之 千金翼

海蛤

集解 時珍曰沈存中筆談云——即海邊沙泥中得之大者如碁子小者如脂麻粒黄白色或黄赤相雜乃諸蛤之殼為海水磨礲日久光瑩都無舊質不能分別其為何蛤故通謂之——也

苦鹹平 治欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱 本經 療陰痿 別錄 主十二水滿急痛利膀胱大小腸 唐本 治浮腫下小便消癭 甄權 治嘔逆胸脇脹急腰痛崩帶 日華 去濕之效 清熱利濕化痰飲消積聚除血痢婦人血結胸傷寒反汗搐搦中風癱瘓 時珍 ○〔之〕才曰蜀漆為使畏狗胆甘遂芫花 保昇曰取得以半天河水煮一日以枸

杞汁拌匀入董竹筒
内蒸一伏時搗用

方

水癊腫滿 蔵器曰用丨丨粉杏仁漢防己棗肉
各二兩葶藶子六兩為末丸梧子大
服十丸服至
利下水為妙

水腫發熱 小便不通者丨丨湯主之丨
丨木通猪苓澤瀉滑石黄葵
子桒白皮各一錢燈
心湯煎服　聖惠

石水肢瘦 腹獨大者丨丨丸主
之丨丨煅防己各七
錢半葶藶子赤茯苓桒白皮各一兩橘
皮郁李仁各半兩蜜丸服　聖濟捴錄

氣腫水腫 丨丨
（旧方可消癭）海帶海藻昆布海螵蛸鳧茈
荔枝殼等分煎　何氏方

血痢內熱 丨丨末蜜服
二錢　傳信

傷寒血結胸 脹痛不可近仲景無方宜丨丨散主之
并剌期門丨丨滑石甘草各一兩芒消
半兩為末每服二錢雞子清調服更服桂枝紅花湯
發汗則愈蓋膻中血聚則小腸壅血不行服此則小
腸通血行而胸膈利
矣　朱肱活人書

中風癱瘓 方見穿山甲

衂不止 粉丨丨
一

昂曰能清肝肺○又曰古方多用治瘡疽
希雍曰足厥陰肝經藥

希雍曰鹹寒入肝除血熱入腎滋陰

兩羅七遍槐花半兩炒焦研勻每
服一錢新汲水調下 楊氏家藏

石决明

又名九孔螺 日華 殼名千里光

集解 宗奭曰登萊海邊甚多殼大如手小者如三
兩指大可以浸水洗眼七孔九孔者良十孔
者不佳海人亦啖其肉 時珍曰｜｜｜形長如小
蚌而扁外皮甚粗細孔雜雜內則光耀背側一行
有孔如穿成者生於石崖上海人泅水
乘其不意取之否則緊粘石上難脫也

鹹平 保昇曰寒 治障翳目痛青盲久服益精 別錄 治肝肺風
熱青盲內障骨蒸勞極 李珣 水飛點障翳 寇氏 通五淋 時珍

斅曰服至十兩永不得食山龜內犯之喪目

○惡旋覆花以鹽同東流水
煮一伏時研細水飛入藥

方 羞明怕日 ｜｜｜黃菊花甘草各一
錢水煎冷服 明目集驗 痘後目翳

一一一蝦研穀精草等分為末猪肝煮熟蘸食 鴻飛集

五淋 一一一去粗皮為末飛過熟水服二錢日二服如淋中有軟硬物即加朽木末五分 勝金方

青盲 一一一蝦存性一兩蒼朮三兩去皮為末以猪肝披開入藥紮定瓦器煮熟以氣熏目待冷食肝飲汁 龍木論

解酒酸 一一燒研末投熱酒中盞定少頃即不酸

今俗名瓦楞子

魁蛤

又名蚶 郭璞 魁陸 別錄 瓦屋子 嶺表錄 瓦壟子

集解 別錄曰一一生東海正圓兩頭空表有文 保昇曰今出萊州形圓長似大腹檳榔兩頭有孔 藏器曰殼如瓦屋 時珍曰郭璞云魁陸即今之蚶也狀如小蛤而圓厚臨海異物志云蚶之大者徑四寸背上溝文似瓦屋之壟

殼 甘酸平燒醋淬醋丸服治一切血氣冷氣癥癖

〔時珍曰〕入厥陰肝〔鳴臬曰〕亦入心鎮心

〔日華〕消血塊化痰積〔丹溪〕連肉燒存性研傳小兒走馬牙疳有效

時珍○〔日華曰〕燒醋淬三次出火毒研粉用

發明〔時珍曰〕丨丨鹹走血而軟堅故能消血塊散痰積

今六品官以作帽頂

車渠

又名海扇

集解〔時珍曰〕丨丨大蛤也大者長二三尺厚二三寸殼外溝壟如蚶殼而深大皆縱文如瓦溝無橫文殼內白皙如玉番人以飾器物類玉石楊慎丹鉛錄云丨丨作盃注酒滿過一分不溢果然

殼 甘鹹大寒解諸毒藥及虫螫同玳瑁等分磨人乳服之極驗〔李珣〕○〔時珍曰〕丨丨即瓦壟之大者故其功用亦彷彿

珍珠

〔希雍曰〕心虛有熱則神氣浮越肝虛有熱則目生浮翳膜障除二經之熱故能鎮心除目翳也

鹹甘寒鎮心點目去翳〔開寶〕磨翳墜痰〔甄權〕合知母治煩熱消渴〔李珣〕除小兒驚熱〔宗奭〕安魂定魄止遺精白濁解痘疔主產難下死胎胞衣〔時珍〕○〔時珍曰〕入藥不用首飾及見尸氣者以人乳浸三日煮過研極細用又法以絹袋盛入豆腐腹中煮一炷香研用〔珣曰〕研不細則傷人臟腑

發明〔時珍曰〕∣∣入厥陰肝故能安魂定魄明目治聾

方 安魂定魄∣∣末豆大一粒蜜和服〔肘後〕 卒忤不言∣∣末鷄冠血和丸小豆大以三四粒納口中〔同上〕 婦人產難∣∣末一兩酒服立出〔千金〕 胞衣不下∣∣末一兩醋服〔同上〕 子死腹中∣∣末二兩酒服立出〔外臺〕 痘疔 方見豌豆下 肝虛目暗∣∣末一兩白蜜二合鯉魚胆二枚和勻銅器煎至一半綿濾過瓶盛頻

點取瘥見聖惠方青盲不見同上

田螺別錄作田蠃

肉 甘大寒治目熱赤痛止渴別錄煮汁療熱醒酒用珍珠黃連末內入取汁注目止目痛弘景煮食利小便大便去腹中結熱目下黃脚氣衝上小腹急硬小便赤澀手足浮腫生浸取汁飲之止消渴擣肉傅熱瘡藏器壓丹石毒孟詵利濕熱治黃疸擣爛貼臍引熱下行止禁口痢下水氣淋閟取水搽痔瘡及胡臭燒治瘰癧癬瘡時珍

方　消渴小便數者｜｜五升水一斗浸一夜渴即飲汁每日換螺及水煮汁飲亦妙　心鏡

點目赤見大註

肝熱目赤｜｜水養去泥纖着少盐花於殼内取汁點之　藥性論

爛弦風眼入銅綠取汁點之

小便不通腹脹如鼓大｜｜一枚盐半匕擣敷臍下一寸三分效熊彦誠曾患此得此方書然暴下而愈　類編

禁口痢大｜｜二枚擣入射香三分作餅烘熱貼臍間半日熱氣下行即思食矣　丹溪方

反胃嘔噎｜｜洗淨水養侍出泥澄取晒半乾丸梧子大每服三十丸藿香湯下　經驗

水氣浮腫大｜｜大蒜車前子等分擣膏攤貼臍上水從便旋而下衆山民病此得方即愈　稗史

酒疸諸疸｜｜水養吐去泥擣爛入好酒濾汁飲之日三服極效　壽域

脚氣攻注擣大｜｜傅兩股便覺冷趍至足而安又可傅丹田利小便極效　稗史

痔漏疼痛冬瓜湯洗淨用大｜｜一箇入冰片一分取水搽之亦有

用白礬末者
乾坤生意

殼　甘平燒研主尸疰心腹痛失精止瀉 別錄 爛者燒研水服止反胃卒心痛 藏器 爛殼研細末服止下血小兒驚風有痰瘡瘍膿水 時珍

方　心脾痛不止者水甲散主之用田螺殼溪間者亦可以松柴層層疊上燒過火吹去松灰取殼研末以烏沈湯寬中散之類調服二錢不傳之妙 集要　小兒急驚 遠年白田螺殼燒灰入射香少許水調灌之 普濟

揚雄方言蜘蛛亦謂之蜣蝓音移循

蝸牛　又名蠡牛 音螺 藥性 蚹蠃 爾雅 蜣蝓 同上 山蝸 弘景 蝸蠃 山海經作倮累 土牛兒 俗名 大明曰此即負殼蜒蚰也

「希雍曰」其氣大寒非真有風熱者不宜用
「畢曰」經云治賊風喎僻古人必有用法惜
無所考希雍經疏所解殊為勉强故不錄

鹹寒治賊風喎僻跳跌大腸脫肛筋急及驚癇別錄生研汁飲止消渴甄權小兒臍風撮口利小便消喉痺止衂通耳聾治諸腫毒痔漏塗蜈蚣蝎毒李時珍○頌曰久雨乍晴林治間墻陰處多有以大而圓者為勝小者無力

發明「頌曰」入小兒藥最勝「時珍曰」||所主大抵解熱消毒之功多

方 小便不通 ||加射香少許搗貼臍下妙 簡易

太腸脫肛 ||一兩燒灰猪脂調傅立縮○又治上症及痢後脫肛乾||百枚炒研每用一錢以飛過慈石末五錢水煎調||末服日二

痔瘡腫痛 丹溪用||浸油搽之○濟生用射香納||內化水取塗之效

發背初起 ||二百箇新汲水一盞瓶封一夜取涎水入真蛤粉調塗日數度熱痛止則痊

集驗

瘰癧已潰｜｜燒研輕粉少許猪脊髓調塗 危氏

喉痺腫塞｜｜七枚白梅肉三枚研爛含嚥汁立效驗

又方｜｜入鹽花化水取點之 唐氏方

喉痺口噤｜｜炙二七枚白梅肉炒二七枚白礬半生半燒二錢為細末水調服一錢得吐立通 聖惠

赤白膜翳｜｜一箇搗入朱砂末火上炙之取汁點之日二 同上

撮口臍風｜｜乃胎熱也｜｜搗研取汁塗口中效乃止

消渴引飲｜｜十四箇大者水三合浸一夜取水飲一劑即愈 崔元亮 海上方

耳聾｜｜一兩石胆鍾乳乳粉各二錢半為末固濟大煆研末入冰片少許油調滴入即愈 聖惠方

蜂蜜 生巖石者名石蜜本經 石飴同上

甘平 時珍曰生涼熟溫 益氣補中解毒止痛和百藥本經 養脾

氣除心煩止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目（別録）治牙疳

齒䘌脣口瘡點目中赤翳殺虫（藏器）治卒心痛及赤白

痢作漿頓服一椀止渴或以薑汁同水和頓服（甄權）治

心腹血刺痛及赤白痢同生地黄汁各一匙服血即

下（孟詵）同薤白擣塗湯火傷即時痛止（宗奭○肘後用白蜜塗之竹膜貼之日三）

和營衛潤臟腑通三焦調脾胃（時珍○思邈曰不可與生葱萵苣同食令人利下食蜜飽後不可食鮓令人暴亡〔宗奭曰多食亦生諸風〔震亨曰蜜入脾西北高燥宜食之東南卑濕多食則害生于脾〔時珍曰〔昂曰腸滑及中滿者忌之〕多食亦生濕熱虫䘌小兒尤當戒之）

發明〔時珍曰〕——入藥之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也生性凉故能清熱熟性温

故能補中甘而和平故能解毒柔而潤澤故能潤燥甘緩可以去急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛甘緩可以和中故能調和百藥與甘草同功仲景治陽明結燥大便不通蜜導煎誠千古神方也孟詵曰但凡覺有熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良與薑汁熬膏治癩甚效

方

大便不通 傷寒論云陽明病自汗小便反利大便硬者津液內竭也蜜煎導之用蜜銅器熬令可丸乘熱捻作挺子令頭銳長寸許冷即硬納穀道中少頃即通○或加皂角細辛末少許效尤速

產後口渴 錬蜜不拘多少水調服良 產寶

難產橫生 ｜｜麻油各半椀煎減半服即下 海上

天行虜瘡 有病天行斑瘡頭面及身須臾週匝皆帶白漿隨決隨生不即療數日即死世人云建武中南陽擊虜所得呼為虜瘡以好蜜摩瘡上再以蜜煎升麻數匕拭之 肘後

痘痂作癢 抓成瘡百花膏用好｜｜湯和時以鵝翎刷之其痂易落 全幼心鑑

口瘡 ｜｜

〔嗚皋曰〕｜｜淡而無味綱目云補中心頗疑之及見古方威喜丸云治元陽虛憊而為遺濁帶下者更不喻其理久乃悟曰此所謂天道好濇也｜｜性味緩濇能久留於中威喜丸以茯苓猪苓之滲引｜｜之濇入於下焦濇故能補久留即是補功能續絕傷所以能補下焦之元陽虛憊而止濁帶也大抵濁帶總係下焦虛滑下焦虛滑則精華走洩而元精愈傷若以草木血肉之品補之不過假其無形之性味耳每難久留故難奏功｜｜能濇而久留以補

鱗介魚虫

浸大青葉含之良　藥性論

五色丹毒｜｜和乾薑末傳之　肘後

湯火傷白｜｜塗之　梅師

疔瘡惡腫生｜｜與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五里則疔出後以醋湯溫洗去　濟急仙方

大瘋癩瘡白｜｜一斤生薑二斤搗汁同入銅鐺中微火煎之薑汁共蜜煎至一斤則藥成矣患三十年者平旦服棗大一丸日三服酒下忌生冷滑臭物　食療

黃蠟

本經名蜜蠟

甘微溫主下痢膿血補中續絕傷金瘡本經〇〔權曰〕和松脂杏仁棗肉茯苓等分為丸服五十丸便不飢〔頌曰〕古人歲荒食蠟度飢合大棗嚼即易爛　治孕婦胎動下血不絕欲死以鷄子大煎沸投美酒半升服立瘥甄權〇〔之才曰〕惡芫花齊蛤

黃蠟

之所謂以有形補有形也且其濇亦非若粟殼木瓜之歛滯

〔王子接曰〕——功專調氣

〔鳴皋曰〕再觀治胎動下血及瀉痢亦是甘濇之功本經云續絶傷其治胎動下血是續帶脉之絶傷也其治瀉痢是續腸胃之絶傷也其治帶濁是續腎經之絶傷也同蛤粉治肺虛咳嗽是續肺經之絶傷也治金瘡及歛瘡生肌是續皮膚之絶傷也然則續絶傷三字内外同一理也然以上諸病初起而未甚傷者不宜驟用

〔鳴皋曰〕古人用巴豆硇沙等藥惧其速下用蠟匱之用香牒等藥惧其上僭傷肺以蠟匱之皆妙法也

〔皋曰〕調氣二字頗不得其解——留滯之物何能調氣嘗思之患痢過重大腸已虛氣隨下陷氣不能舉愈不能運故小腹痛不可忍此時欲補氣則邪錮參术毫不能投惟用——濇以止脱阿膠補陰黴蠟補氣使入腸胃留住下陷之氣故云調氣也

發明〔時珍曰〕味莫甘於蜜莫淡於蠟蜜之氣味俱厚屬陰故養脾蠟之氣味俱薄屬秋故養胃厚者味甘而性緩質柔故潤臓腑薄者味淡而性濇質堅故止洩痢仲景治痢有調氣飲千金治痢有膠蠟湯其效甚速蓋有見於此歟又華佗治老少下痢食入即吐用白蜜蠟方寸匕鷄子黄一箇石蜜苦酒髮灰黄連末各半鷄子殼先煎蜜蠟鷄子苦酒四味令匀乃納髮灰熬至可丸二日服盡神效無比也此方用之屢驗乃知本經主下痢膿血之言深當服膺也

方

金匱調氣飲治赤白痢小腹痛不可忍下重或面青手足俱變者用——三錢阿膠三錢同溶化入川連末五錢攪匀分三次熱服神妙　金匱

千金膠蠟湯治熱痢及産後下痢用——二碁子大阿膠二錢當歸二錢半川連三錢黄柏一錢陳倉米半升水三升煮至一升去米入藥煎至一鍾温服神效　千金

急心痛——燈上燒化丸芡子大百草霜為衣井水下三丸

王子接遂謂功專調氣似不然

鱗介魚虫

肺虛咳嗽 立效丸治肺虛膈熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出｜｜溶濾令淨八兩化作一百二十丸以蛤粉四兩為衣養藥每服一丸胡桃半箇細嚼溫水下即卧閉口不語 普濟

肝虛雀目｜｜不拘多少溶化入蛤粉和勻每用二錢以猪肝二兩批開入藥在內扎定水一椀煮熟乘熱蒸眼溫則食之日二其效如神 集驗

頭風掣痛｜｜二斤鹽半斤和溶作一帽合頭大小至額痛立止 經驗

破傷風濕 如瘧者｜｜一塊熱酒化開服立效與玉真散對用尤妙 瑞竹堂方

妊娠胎漏｜｜一兩老酒一椀溶化熱服即止

呃逆不止｜｜燒烟熏二三次效 醫方摘要

霍亂吐利｜｜一彈丸熱酒一鍾化服即止

諸般瘡毒 臘瘡金瘡湯火傷｜｜一兩香油二兩黃丹半兩同化冷攤貼見肘後方

湯火傷 焮赤疼痛成膿用此拔毒止痛生肌斂瘡口香油四兩當歸一兩煎焦去 王仲勉經驗

黃蠟 蜜蜂子

九七

渣入蠟一兩溶化放冷攤

帛貼神效　醫林摘要

蜜蜂子　即蜂蛹也

甘平微寒有毒治心腹痛面目黄大人小兒腹中五虫從口吐出者　別錄　主腹內留熱利大小便澀下乳汁女婦人帶下　藏器　治大風癘疾　時珍　○之才曰畏黄芩芍藥牡蠣白前　大明曰　冬瓜苦蕒生薑紫蘇制其毒

發明　時珍曰　蜂子古人以充饌品故本經別錄著其功而聖濟錄治大風疾兼用諸蜂子蓋亦足陽明足太陰之藥也

方　大風癘疾　鬚毛脫落皮肉已爛成瘡者用丨丨丨胡蜂子黄蜂子並炒各一分白花

胡蜂子　即大黄蜂之黑色者

蛇烏梢蛇并酒浸去皮骨炙乾全蝎去勾白僵蚕炒
各一兩地龍去土炒半兩蝎虎全用炒赤足蜈蚣全
者炒各十五枚丹沙一兩雄黃一兩龍腦半錢共為
末每服一錢溫蜜湯下日三五服 見聖濟摠錄

土蜂 又名蜚零 本經 郭璞註爾雅云今江東呼大蜂
在地中作房者為||

子甘平有毒治癰腫 本經 嗌痛 別錄 功同蜜蜂子 蔵器○畏惡亦
同蜜
蜂子

土蜂房 治癰腫不消為末醋塗之乾即易 藥性 療疔
腫瘡毒 時珍

方 疔腫瘡毒 已篤者二服即愈輕者一服即效||
||一箇蛇蛻一條黃泥固濟煆存
性為末每服一錢空心好酒下少頃腹中
大痛止其瘡已化為黃水矣 普濟

時珍曰｜｜｜陽明藥胃大腸
鳴皋曰｜｜｜功能去風以毒攻毒也時
珍定為陽明藥然觀其能出鬼精治牙疼
主陰痿則不止陽明兼為少陰腎經藥也
如附骨疽骨屬腎〻經毒鬱不外宣附骨
成膿｜｜｜治之後方陰痿服二錢可御
十女若然非入腎經乎他如漱牙止痛最
效牙齒屬腎也崩中漏下五色服三指撮
大神效崩漏亦下焦病也蓋此物主下焦
而能以通為用者
昂曰附骨疽不破附骨成膿不知者誤作

即今屋上及棘林竹林中之馬蜂

大黄蜂 黑色者名胡蜂廣雅 壺蜂方言 𧕌音勾婁蜂

子甘涼有小毒治心腹脹滿痛乾嘔別録 餘功同蜜蜂

子 時珍○畏 惡亦同

方 面上雀斑七月七日取露蜂子於漆椀中水酒浸過濾汁調胡粉塗之普濟

露蜂房 又名蜂腸本經 蜂𦛨與窠同 百穿並別録 保昇曰此樹上大黄蜂窠也大者如甕小者如桶十一二月取之 恭曰樹上得風露者良

甘平有毒別録 甄曰鹹 治驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾出鬼精蠱毒腸痔火熬之良本經 療毒腫合亂髮蛇皮燒灰以酒日服二方寸匕治惡疽附骨癰根在臟腑瘰節腫

賊風治按附骨疽痛處發熱四體乍熱乍
寒小便赤大便秘而無汗瀉熱發散則消
賊風痛處不熱亦不發寒熱覺身冷欲得
熱熨則小寬時有汗宜風藥治之

出丁腫惡脉諸毒皆瘥別録療上氣赤白痢遺尿失禁燒灰酒服主陰痿水煮洗狐尿刺瘡服汁下乳石毒蘇恭煎水洗熱病後毒氣衝目炙研和猪脂塗瘰癧成漏蘇頌煎水漱牙止風虫疼痛又洗乳癰惡瘡疔毒大明

○之才曰惡乾薑丹參黄芩芍藥牡蠣 大明曰入藥並炙用

發明 時珍曰｜｜｜陽明藥也外科齒科及他病用之者皆取其以毒攻毒及殺虫之功耳

方 臍風濕腫久不瘥者｜｜｜燒末傳之子母秘録 手足風痺｜｜｜大者一箇小者三四箇燒灰獨頭蒜一盌百草霜一錢半同研傳上一時取下埋在陰處忌生冷葷腥乾坤秘蘊 又方 ｜｜｜煎濃汁洗之 風熱牙腫連及頭面用｜｜｜燒存性研末以酒調

露蜂房

九十九

噙漱之　丨丨丨醋煎熱漱之○袖珍用
十便良方
風虫牙痛　丨丨丨一枚盐實孔内燒存性
研末搽之盐湯漱去此秘方也○普濟同細辛煎喉
漱○又同乳香煎漱○又丨丨丨全蝎研末搽之
痺腫痛　丨丨丨灰白僵蚕等分為末乳香湯下半錢
○心鏡用丨丨丨燒灰以一錢吹入喉内
重舌腫痛　丨丨丨炙研酒和傳之日三四次　聖惠
舌上出血　竅如針孔　丨丨丨頂
上實處一兩貝母四錢蘆薈三錢為末蜜丸彈子大
每以一丸水煎半小盞温服吐血酒服　雲臺方
吐血衄血　方同上
崩中漏下　五色使人無子丨丨丨末三指撮温酒服之大神效
張文仲方
小兒下痢　赤白丨丨丨燒末飲服五分　子母秘錄
小兒咳嗽　丨丨丨每服一字米飲下　千金
寸白蚘虫　丨丨丨燒存性酒服一匙虫即死出　生生編
乳石熱毒　壅悶頭痛口乾便漩赤少者丨丨丨煮汁五合服之乳石末當從小便中下大效

毒上攻 如聖散用｜｜｜甘草等分麸炒黄色去麸為細末水二椀煎八分臨卧頓服取下惡物 經驗方

頭上瘡癬 ｜｜｜末猪脂和塗 聖惠

女人妬乳 乳汁不出内結成癰名妬乳｜｜｜燒灰研每用二錢水煎去渣服 濟衆

痔漏 大｜｜｜燒存性搽之乾則以真菜子油搽之 見唐氏經驗

蜂螫痛疼 猪脂調末搽之或煎洗 千金方

陰痿 ｜｜｜燒研新汲水下二錢可御十女 峋嵝神書

陰寒痿弱 ｜｜｜灰夜傅陰上即熱起 千金

白蠟 會編名蟲白蠟

集解 時珍曰唐宋以前無之自元以後人始知之今為日用物矣川湖滇廣吳越諸郡皆有之蠟樹枝葉狀類冬青其虫大如蟣虱芒種後則延緣樹枝食汁吐涎化為｜｜處暑後剥取若過白露即粘住難刮矣其嫩時白色作蠟老則赤黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如鷄頭

子紫赤色纍纍抱枝蓋虫將遺卵作房正如雀甕
螵蛸之類次年立夏日摘下箬包分繫各樹芒種
後苞折虫復上樹作蠟也樹
下要潔淨防蟻上樹食其虫

甘溫生肌止血定痛補虛續筋接骨震亨入丸散服殺
瘵虫時珍

發明震亨曰｜｜屬金稟受收斂堅强之氣為外科
要藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之神效但
未試其可服否也時珍曰蠟樹葉亦治瘡腫故｜
｜為外科要藥正如桑螵蛸與桑木之氣相通也